

Lista 2

Weronika Jakimowicz

07.03.2024

Zadanie 1.

Rozważmy relację $R(A, B, C)$. Napisz zapytanie algebry relacji oraz zapytanie rrd/rrk, które zwróci pusty wynik wtedy i tylko wtedy gdy para atrybutów A, B jest kluczem relacji R .

Rozwiązanie.

ALGEBRA RELACJI

Pytamy, kiedy to co jest w kolumnach A i B nie jest unikalne dla danej krotki (nie jest kluczem). Ilość krotek mających daną parę w kolumnach A i B liczymy zapytaniem `gamma A, B; count C -> nr (R)`. Chcemy zwracać pusty wynik, kiedy w kolumnie nr widzimy 1, czyli wystarczy zrobić `sigma nr > 1 (...)` i mamy gotowy wynik. W całości zapytanie algebry relacji prezentuje się następująco:

```
sigma nr > 1 (  
  gamma A, B; count C -> nr (R)  
)
```

RRK

W tym przypadku mamy troszkę szybsze rozwiązanie, bo od razu możemy spytać, czy istnieje inny element który spełnia pewne warunki:

$$\{x \in R : (\exists y \in R \setminus \{x\}) y.A = x.A \wedge y.B = x.B \wedge y.C \neq x.C\}$$

RRD

Tutaj jest jeszcze szybciej, ale wolałam RRK

$$\{a, b, c : R(a, b, c) \wedge (\exists c') c \neq c' \wedge R(a, b, c')\}$$

Zadanie 2.

Rozważmy relację $R(A, B, C)$ oraz $S(X, Z)$, przy czym atrybut A jest kluczem w R . Napisz zapytanie algebry relacji oraz zapytanie rrk/rrd, które zwróci pusty wynik wtedy i tylko wtedy, gdy atrybut Z relacji S jest kluczem obcym wskazującym na atrybut A relacji R .

Rozwiązanie.

ALGEBRA RELACJI

Klucz obcy, to np. indeks studenta w tabeli ocen - wskazuje on wtedy na osobę w tabeli

aktywnych studentów uniwersytetu, ale może się powtarzać w tabeli ocen.

Możemy zacząć od znalezienia krotek, które mają ten sam element w kolumnie A i kolumnie S przy pomocy joina: $R \text{ join } A=Z \text{ } S$. Nas interesują wszystkie te wpisy z relacji S, w których ta równość nie zachodzi. Rzutujemy więc wynik join na kolumny X i Z i odejmujemy wynik od S: $S - (\pi_{X, Z} (\dots))$. W całości dostajemy

```
S - (
  pi X, Z (
    R join A=Z S
  )
)
```

RRK

Wystarczy sprawdzić, czy nie istnieje element w R, który zgadza się z aktualnym elementem na kolumnie Z. Można skorzystać z praw de Morgana

$$\{x \in S : \neg(\exists y \in R) x.Z = y.A\} = \{x \in S : (\forall y \in R) x.Z \neq y.A\}$$

RRD

Tutaj nieco mniej elegancko jest zapisać przy pomocy \forall moim zdaniem:

$$\begin{aligned} \{x, z : S(x, z) \wedge \neg[(\exists a, b, c) R(a, b, c) \wedge a = z]\} = \\ = \{x, z : S(x, z) \wedge (\forall a, b, c) \neg R(a, b, c) \vee a \neq z\} \end{aligned}$$