

Zad 1. Znalezc wzor na $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} r^k$ i $\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} 10^k$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} r^k = (1+r)^n$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-10)^k = (1-10)^n = (-9)^n$$

Zad 2. Uzywajac argumentacji kombinatorycznej udowodnic tozsamosc dla $n \geq 3$ (w podanej formie)

$$\binom{n}{k} - \binom{n-3}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-2}{k-1} + \binom{n-3}{k-1}$$

Lewa strona tozsamosci mowi nas, na ile sposobow mozemy wybrac zbior k -elementowy z n elementow bez zbiorow niezawierajacych 3 wyroznionych elementy.

Prawa strona najpierw zaznacza jeden z tych elementow i sprawdza na ile sposobow mozemy wybrac zbiory zawierajace ten element (dokladany $k-1$ do pierwszego). Potniej mowi nam, na ile sposobow mozemy wybrac zbiory zawierajace drugi element, a na koncu trzeci i sumuje te ilosc. Ostatecznie, otrzymujemy ilosc zbiorow zawierajacych co najmniej jeden z wyroznionych elementow.

Zad 3. Wyprowadz wzor

$$1\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \dots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}$$

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + x\binom{n}{1} + x^2\binom{n}{2} + \dots + x^n\binom{n}{n}$$

$$n(1+x)2^{n-1} = \binom{n}{1} + 2x\binom{n}{2} + \dots + nx^{n-1}\binom{n}{n}$$

Dla $x = 1$:

$$n2^{n-1} = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \dots + n\binom{n}{n}$$

Zad 4. Przyjmijmy, ze dla $x \in \mathbb{R}$ i liczby naturalnej $k \geq 1$ definiujemy:

$$\binom{x}{k} = \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{k!}$$

Dodatkowo, $\binom{x}{0} = 1$ i $\binom{x}{-k} = 0$. Udowodnic, ze dla wszystkich liczb rzeczywistych x i wszystkich liczb calkowitych k i m zachodza wzory

$$\binom{x}{k} + \binom{x}{k+1} = \binom{x+1}{k+1}$$

$$\begin{aligned} L &= \binom{x}{k} + \binom{x}{k+1} = \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)}{k!} + \frac{x(x-1)\dots(x-k)}{(k+1)!} = \\ &= \frac{x(x-1)\dots(x-k+1)(k+1) + x(x-1)\dots(x-k)}{(k+1)!} = \\ &= \frac{x(x-1)\dots(x-k)((k+1)(x-k+1) + 1)}{(k+1)!} = \\ &= \frac{(x+1)x(x-1)\dots(x-k+1)}{(k+1)!} \end{aligned}$$

$$\binom{-x}{k} = (-1)^k \binom{x+k-1}{k}$$

$$\binom{x}{m} \binom{m}{k} = \binom{x}{k} \binom{x-k}{m-k}$$

Zad 5. Uzywajac argumentacji kombinatorycznej pokazac, ze dla wszystkich dodatnich liczb calkowitych m_1, m_2 zachodza wzory

$$\sum_{k=0}^n \binom{m_1}{k} \binom{m_2}{n-k} = \binom{m_1+m_2}{n}$$

Prawa strona rownosci mowi nam, na ile sposobow mozna wybrac n elementow ze zbioru zawierajacego $m_1 + m_2$ elementow.

Prawa strona sumuje sposoby na jakie najpierw ze zbioru m_1 elementow mozna wybrac $0, 1, 2 \dots$ elementow, a potem dobrać do tego $n, n-1, n-2 \dots$ elementow ze zbioru m_2 . Czyli obie strony daja ten sam wynik.

Zad 6. Znalzc wzor na KUWRA NIE

Zad 7. Udowodnic za pomoca wzoru Taylora, ze dla $|x| < 1$ i dowolnej liczby α zachodzi wzor

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^\infty \binom{\alpha}{n} x^n$$

$$\begin{aligned} L &= (1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{(\alpha-1)\alpha}{2}x^2 + \frac{(\alpha-2)(\alpha-1)\alpha}{3!}x^3 + \dots = \\ &= \sum_{k=0}^\infty \binom{\alpha}{k} x^k = P \end{aligned}$$