

Wprowadzenie do teorii zbiorów

Lista zadań nr 1.

1. Sprawdź, że $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \Rightarrow a = c \wedge b = d$.
2. Udowodnij, że $\bigcup \mathcal{P}(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$.
3. Niech A będzie zbiorem niepustym. Które z poniższych twierdzeń są prawdziwe?
 - (a) Jeśli $A = \bigcup A$, to $\emptyset \in A$.
 - (b) Jeśli $\emptyset \in A$, to $A = \bigcup A$.
 - (c) Jeśli $\bigcup A = \bigcap A$, to $A = \{x\}$ dla pewnego x .
4. Która z poniższych równości zachodzi dla dowolnego zbioru A ?
 - (a) $\bigcap \{\mathcal{P}(B) : B \subseteq A\} = \{\bigcap \mathcal{P}(B) : B \subseteq A\}$.
 - (b) $\bigcup \{\mathcal{P}(B) : B \subseteq A\} = \{\bigcup \mathcal{P}(B) : B \subseteq A\}$.
- 4,5. Sprawdzić, że para nieuporządkowana, suma i zbiór potęgowy są zdefiniowane jednoznacznie.
5. Udowodnij, że aksjomat pary wynika z pozostałych aksjomatów teorii \mathbf{ZF}_0 .
6. Udowodnij, że aksjomat wyróżniania wynika z pozostałych aksjomatów teorii \mathbf{ZF}_0 .
7. Udowodnij (w teorii \mathbf{ZF}), że $\neg(\exists x_1, \dots, x_n) x_1 \in x_2 \in \dots \in x_n \in x_1$.
8. Udowodnij (w teorii \mathbf{ZF}), że
$$\neg(\exists f)(\text{fnc}(f) \wedge \text{dom}(f) = \omega \wedge (\forall n \in \omega) f(n+1) \in f(n)).$$
9. Udowodnij, że aksjomat wyboru jest równoważny zdaniu
$$(\forall x)((\forall y \in x)y \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists f)(\text{fnc}(f) \wedge \text{dom}(f) = x \wedge (\forall y \in x)f(y) \in y).$$
10. Udowodnij, że aksjomat wyboru jest równoważny faktowi, że jeśli $\langle X_i : i \in I \rangle$ jest niepustą rodziną zbiorów niepustych, to iloczyn kartezyjski $\prod_{i \in I} X_i$ też jest niepusty. Sformułuj powyższy fakt bez użycia pojęcia rodziny indeksowanej.
11. Rozważmy indeksowaną rodzinę zbiorów niepustych $\langle A_i : i \in I \rangle$, taką że $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$. Czy do niepustości produktu $\prod_{i \in I} A_i$ potrzebujemy aksjomatu wyboru?

Zadania dodatkowe

12. Niech $\langle X, \leq \rangle$ będzie zbiorem częściowo uporządkowanym. Czy jeśli każdy łańcuch i każdy antyłańcuch w X jest skończony, to X jest skończony?
13. Dla dowolnego zbioru X i dowolnej relacji $R \subseteq X \times X$, czy prawdą jest że:
 - (a) jeżeli istnieje taka rodzina $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, że $R = \bigcup \{A \times A : A \in \mathcal{A}\}$, to R jest relacją równoważności na X ;
 - (b) jeżeli R jest relacją równoważności na X , to istnieje taka rodzina $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, że $R = \bigcup \{A \times A : A \in \mathcal{A}\}$.