

## ZAD 1.

$$\lfloor an \rfloor + \lfloor (1-a)n \rfloor = n - 1$$

Niech  $\mathbb{Z} \ni m = \lfloor an \rfloor$ , wtedy

$$\begin{aligned} m &\leq an < m+1 \\ m-n &\leq an-n < m-n+1 \\ n-m &\geq n-an > n-m-1 \end{aligned}$$

Ponieważ  $n \notin \mathbb{Q}$ , to  $n-an \notin \mathbb{Z}$ , więc

$$\lfloor n-an \rfloor = n - \lfloor an \rfloor - 1$$

a z tego

$$\lfloor an \rfloor + \lfloor n(1-a) \rfloor = n - 1$$

$$\lceil an \rceil + \lceil n-an \rceil = n + 1$$

## ZAD 2.

$$\left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{m} \right\rfloor + \dots + \left\lfloor \frac{x+m-1}{m} \right\rfloor = \sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{x+i}{m} \right\rfloor \quad (\text{👉})$$

Po pierwsze pokazemy, że dla dowolnych  $n, m \in \mathbb{Z}$  oraz  $x \in \mathbb{R}$  zachodzi

$$\left\lfloor \frac{x+n}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor + n}{m} \right\rfloor \quad (\text{☕})$$

Niech  $p = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor + n}{m} \right\rfloor$ , wtedy

$$\begin{aligned} p &\leq \frac{\lfloor x \rfloor + n}{m} < p+1 \\ p &\leq \frac{\lfloor x \rfloor + n}{m} < p+1 \\ \mathbb{Z} \ni m \cdot p - n &\leq \lfloor x \rfloor < m \cdot (p+1) - n \in \mathbb{Z} \\ m \cdot p - n &\leq x < m \cdot (p+1) - n \\ p &\leq \frac{x-n}{m} < p+1 \\ p &\leq \left\lfloor \frac{x+n}{m} \right\rfloor < p+1 \\ p &= \left\lfloor \frac{x+n}{m} \right\rfloor \end{aligned}$$

Czyli pokazaliśmy (☕).

Po drugie, zauważmy, że dla dowolnego  $n$  i dla każdego  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \geq m > 1$  zachodzi

$$n = \sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{n+i}{m} \right\rfloor$$

Zauważmy, że jest to ilość elementów w każdej grupie przy podziale  $n$  elementów na  $m$  grup. We wszystkich kolumnach umiemy co najmniej  $\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor$  obiektów, ale w ostatnich  $n \bmod m$  kolumnach będzie ich o 1 więcej, co jest uzyskiwane przez zwiększanie o 1 licznika po każdej kolumnie.

Wracając do (👉), możemy powiedzieć, że

$$\sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{x+i}{m} \right\rfloor = \sum_{i=0}^{m-1} \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor + i}{m} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor$$

### ZAD 3.

- a) potrzebujemy  $a_0$ ,  $a_1$ , natomiast  $a_2$  możemy już obliczyć za pomocą  $a_0$
- b) potrzebne jest  $a_0$ ,  $a_1$  oraz  $a_2$ , bo wyraz  $a_3$  to już suma wyrazów poprzednich
- c) potrzebny jest tylko wyraz  $a_0$  – jest on potrzebny dla  $a_1$ , dla  $a_2$  potrzebne jest  $a_1$  i tak dalej – zawsze przy odpowiedniej ilości podzielen na 2 otrzymujemy  $a_0$

### ZAD 4.

- a)  $f_n = f_{n-1} + 3^n$  dla  $n > 1$  i  $f_1 = 3$ .

To jest suma geometric sequence:

$$f_n = \sum_{i=1}^n 3^i = 3 \cdot \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3^{n+1} - 3}{2}$$

- b)  $h_n = h_{n-1} + (-1)^{n+1}n$  dla  $n > 1$  i  $h_1 = 1$

$$h_n = -\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + (n - 2\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor)n$$

- c)  $l_n = l_{n-1}l_{n-2}$  dla  $n > 2$  i  $l_1 = l_2 = 2$

$$l_3 = 4 = 2^2$$

$$l_4 = 8 = 2^3$$

$$l_5 = 32 = 2^5$$

$$l_6 = 256 = 2^8$$

$l_n$  wyraz to  $2^k$ , gdzie  $k$  to  $n$ -ty wyraz ciągu fibonacciego. Także zostaje mi nic innego jak znaleźć jawny wzór na ciąg fibonacciego :)