

Zadania z ★★ LISTA 7

Weronika Jakimowicz

32 października 2022

ZAD 1.

1. RÓŻNICZKOWALNOŚĆ:

Aby funkcja wieloargumentowa o wartościach wektorowych była różniczkowalna w punkcie (x_0, y_0) , granica

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\|F(x,y) - F(x_0,y_0) - T(x-x_0, y-y_0)\|}{\|(x-x_0, y-y_0)\|}$$

musi zmieścić do 0. To znaczy, że funkcję F możemy bardzo dobrze przybliżyć za pomocą przekształcenia liniowego T w okolicy punktu (x_0, y_0) . Ponieważ operujemy na przekształceniu $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, to T będzie miało macierz 2×2

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

i po wymnożeniu z dowolnym (x, y) będzie dawało wynik

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

Aby taka operacja dawała wynik zbliżający się do (x_0, y_0) dla punktów w jego pobliżu, to a musi być małą zmianą w pierwszej współrzędnej względem x , a b małą zmianą w pierwszej współrzędnej względem y , analogicznie dla c i d . Czyli T jest Jakobianem. W takim razie, żeby sprawdzić czy badana przez nas funkcja jest zbieżna, wystarczy sprawdzić, czy dla dowolnego punktu poniższa granica jest równa 0:

$$\begin{aligned} & \frac{\|F(x,y) - F(x_0,y_0) - T(x-x_0, y-y_0)\|}{\|(x-x_0, y-y_0)\|} = \\ &= \frac{\left\| \begin{pmatrix} x+f(y) \\ y+f(x) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_0+f(y_0) \\ y_0+f(x_0) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x-x_0+(y-y_0)f'(y_0) \\ (x-x_0)f'(x_0)+y-y_0 \end{pmatrix} \right\|}{\|(x-x_0, y-y_0)\|} = \\ &= \frac{\left\| \begin{pmatrix} f(y)-f(y_0)-(y-y_0)f'(y_0) \\ f(x)-f(x_0)-(x-x_0)f'(x_0) \end{pmatrix} \right\|}{\|(x-x_0, y-y_0)\|} = \\ &= \left[\frac{(f(y)-f(y_0)-(y-y_0)f'(y_0))^2 + (f(x)-f(x_0)-(x-x_0)f'(x_0))^2}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \right]^{\frac{1}{2}} = \\ & \left[\frac{(f(y)-f(y_0))^2}{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} \right] \end{aligned}$$

2. RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ:

Żeby funkcja była różnowartościowa, musi być odwracalna w każdym punkcie swojej dziedziny. To znaczy, że pierwsza pochodna nie może nigdy się zerować. Przyjmy się Jakobianowi funkcji F

$$\begin{bmatrix} 1 & f'(y) \\ f'(x) & 1 \end{bmatrix}$$

Jego wyznacznik to

$$1 - f'(x)f'(y)$$

a ponieważ

$$(\forall a \in \mathbb{R}) |f'(a)| < 1,$$

to również

$$|f'(x)f'(y)| < 1,$$

co daje nam

$$1 - f'(x)f'(y) > 0,$$

a więc badana funkcja jest odwracalna w każdym punkcie dziedziny. To znaczy, że jest różnowartościowa.

3. NA:

Jeśli funkcja jest "na", to nie może być ściśle wklęsła ani ściśle wypukła. Czyli wyznacznik jej Hesyjana musi być 0.

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dx}1 & \frac{d}{dy}f'(x) \\ \frac{d}{dx}f'(y) & \frac{d}{dy}1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

wyznacznik jest stale równy zero, więc mamy funkcję która nie jest ani wypukła ani wklęsła, więc przechodzi całą przeciwdziedzinę.