

ZAD 1.

Mamy zadany wielomian

$$p(z) = a_0 + z(a_1 + z(a_1 + \dots + z(a_{n-1} + za_n)))$$

który możemy zapisać jako

$$p(z) = (z - z_0)q(z) + p(z_0), \quad (\text{☕})$$

gdzie $p(z_0)$ to reszta z dzielenia przez $(z - z_0)$, a $q(z)$ to iloraz:

$$q(z) = b_0 + zb_1 + z^2b_2 + \dots + z^{n-1}b_{n-1}.$$

Mamy więc równość

$$a_0 + za_1 + z^2a_2 + \dots + z^na_n = (z - z_0)(b_0 + zb_1 + \dots + z^{n-1}b_{n-1}) + p(z_0)$$

i współczynniki przy zmiennych muszą być sobie równe, więc

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} \\ a_{n-1} &= b_{n-2} - z_0b_{n-1} \\ a_{k+1} &= b_k - z_0b_{k+1} \quad \text{dla } k = 0, \dots, n-2 \\ a_0 &= -z_0b_0 + p(z_0) \end{aligned}$$

W takim razie

$$p(z_0) = a_0 + z_0b_0.$$

Schemat Hornera do znalezienia $p(z_0)$ wygląda wtedy następująco:

$$\begin{aligned} b_{n-1} &:= a_n \\ b_k &:= a_{k+1} + z_0b_{k+1} \quad \text{dla } k = n-2, \dots, -1 \end{aligned}$$

i szukana wartość to b_{-1}

Analogicznie, dla pochodnej $p'(z)$ mamy

$$\begin{aligned} a_1 + 2a_2z + \dots + na_nz^{n-1} &= (z - z_0)q'(z) + q(z) \\ a_1 + 2a_2z + \dots + na_nz^{n-1} &= (z - z_0)(b_1 + 2zb_2 + 3z^2b_3 + \dots + (n-1)z^{n-2}b_{n-1}) + \\ &\quad + (b_0 + zb_1 + \dots + z^{n-1}b_{n-1}) \end{aligned}$$

i aby wyraży po obu stronach się zgadzały:

$$\begin{aligned} na_n &= b_{n-1} + (n-1)b_{n-1} \\ (n-1)a_{n-1} &= (n-2)b_{n-2} + b_{n-2} - z_0b_{n-1} \\ a_{k+1} &= b_k - z_0b_{k+1} \\ a_1 &= b_0 - z_0b_1 \end{aligned}$$

W trakcie różniczkowania $p(z_0)$ się uprościło, ale możemy zapisać, że

$$p'(z_0) = b_0 = a_1 + z_0b_1.$$

Schemat Hornera dla znalezienia $p'(z_0)$ to w takim razie

$$\begin{aligned} b_{n-1} &:= a_n \\ b_k &:= a_{k+1} + z_0b_{k+1} \quad \text{dla } k = n-2, \dots, 0 \end{aligned}$$

i wyraz b_0 to szukane $p'(z_0)$

To teraz dla $p''(z_0)$

$$2a_2 + 6za_3 + \dots + n(n-1)a_n z^{n-2} = (z - z_0)q''(z) + 2q'(z)$$

$$2a_2 + 6za_3 + \dots + n(n-1)a_n z^{n-2} = (z - z_0)(2b_2 + 6zb_3 + \dots + (n-1)(n-2)z^{n-3}b_{n-1}) + 2(b_1 + 2zb_2 + 3z^2b_3 + \dots + (n-1)z^{n-2}b_{n-1})$$

$$n(n-1)a_n = (n-1)(n-2)b_{n-1} + 2(n-1)b_{n-1}$$

$$a_{n-1} = b_{n-2} - z_0 b_{n-1}$$

$$a_{k+1} = b_k - z_0 b_{k+1}$$

$$2a_2 = 2b_1 - 2z_0 b_2$$

Schemat Hornera dla $p''(z_0)$:

$$b_{n-1} := a_n$$

$$b_k := \frac{k+1}{2}(a_{k+1} + z_0 b_{k+1}) \quad \text{dla } k = n-2, \dots, 1$$

ZAD 2.

Mamy dana funkcje

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y).$$

$$\begin{aligned} z_1 &= x_0 + iy_0 + \frac{u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0)}{u'(x_0, y_0) + iv'(x_0, y_0)} \\ &= x_0 + iy_0 + \frac{(u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))(u'(x_0, y_0) - iv'(x_0, y_0))}{u'(x_0, y_0)^2 - v'(x_0, y_0)^2} \end{aligned}$$

Niech $u_k = u(x_k, y_k)$, $v_k = v(x_k, y_k)$.

$$x_1 = x_0 + \frac{u_0(u')_0 - v_0(v')_0}{(u')_0^2 - (v')_0^2}$$

$$y_1 = y_0 + \frac{v_0(u')_0 - u_0(v')_0}{(u')_0^2 - (v')_0^2}$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{u_k(u')_k - v_k(v')_k}{(u')_k^2 - (v')_k^2}$$

$$y_{k+1} = y_k + \frac{v_k(u')_k - u_k(v')_k}{(u')_k^2 - (v')_k^2}$$

ZAD 4.

Metoda ϕ oblicza pierwiastek jakiejś funkcji f , który wypada w α . Błąd dla n -tego kroku wynosi

$$E_n = x_n - \alpha$$

a jeżeli metoda jest rzędu $p+1$, to

$$\left| \frac{E_{n+1}}{(E_n)^{p+1}} \right| < \infty$$

$$\begin{aligned}
 x_{k+1} &= \phi(x_k) = \\
 &= \phi(\alpha) + (x_k - \alpha)\phi'(\alpha) + (x_k - \alpha)^2 \frac{\phi''(\alpha)}{2!} + \dots + (x_k - \alpha)^p \frac{\phi^{(p)}(\alpha)}{p!} + (x_k - \alpha)^{p+1} \frac{\phi^{(p+1)}(\xi_k)}{(p+1)!}
 \end{aligned}$$

dla pewnego $\xi_k \in [x_k, \alpha]$.

Ale wszystko poza ostatnim wyrazem sie zeruje, wiec mamy

$$x_{k+1} = \phi(x_k) = \alpha + (x_k - \alpha)^{p+1} \frac{\phi^{(p+1)}(\xi_k)}{(p+1)!}$$

i to do α bedzie zbiegac w potedze $p+1$.

$$\begin{aligned}
 \frac{x_{k+1} - \alpha}{(x_k - \alpha)^{p+1}} &= \frac{\phi(x_k) - \alpha}{(x_k - \alpha)^{p+1}} = \\
 &= \frac{(x_k - \alpha)^{p+1} \frac{\phi^{(p+1)}(\xi_k)}{(p+1)!}}{(x_k - \alpha)^{p+1}} = \\
 &= \frac{\phi^{(p+1)}(\xi_k)}{(p+1)!} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{\phi^{(p+1)}(\alpha)}{(p+1)!}
 \end{aligned}$$

ZAD 5.

ZAD 6.

Jejku chce umrzyc.