

MDM Lista 7

Weronika Jakimowicz

ZAD. 1.

Niech k będzie liczbą pionków do rozłożenia. Jeśli $k > n$, to wtedy co najmniej dwa muszą być w jednej kolumnie, a więc jeden nie będzie na lewo od drugiego. W takim razie musi być $k \leq n$.

Ułóżmy najpierw k pionków na planszy $k \times k$ tak, żeby w każdej parze jeden był na lewo i niżej niż drugi. Takie ułożenie jest jedno, to znaczy pionki muszą stać na przekątnej od lewego dolnego rogu do prawego górnego.

Jeśli ustawimy najpierw k pionków na planszy $k \times k$. Utożsamimy kolumny zawierające pionki z liczbą 1, natomiast kolumny puste z liczbą 0. Wtedy sposobów żeby ustawić $n - k$ jedynek w ciąg n elementowy mamy $\binom{n}{n-k}$. Analogiczna sytuacja zachodzi dla wierszy, a ogólna ilość rozwiązań to

$$\binom{n}{n-k}^2,$$

gdyż łączymy każde ustawienie kolumn z każdym ustawieniem wierszy.

ZAD. 2.

Liczba Fibonaciego F_n odpowiada na pytanie, ile jest ciągów składających się tylko z 1 i 2 sumujących się do $(n - 1)$. Popatrzymy teraz na sumę z zadania:

$$F_n = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1-i}{i}.$$

Pierwszy wyraz, $\binom{n-1}{0}$ to liczba ciągów składających się tylko z 1 sumujących się do $(n - 1)$. Drugi wyraz, $\binom{n-2}{1}$ skraca ciąg $(n - 1)$ jedynek o jeden i wybiera jedną z pozostałych $(n - 2)$ jedynek która zostanie zamieniona na 2. W ten sposób dostajemy ilość ciągów sumujących się do $(n - 1)$ zawierających tylko jedną liczbę 2. Tak więc dla k -tego wyrazu sumy usuwamy k jedynek, a z pozostałych na k sposobów wybieramy te, które zostaną zastąpione przez 2 $\binom{n-1-k}{k}$.

Teza:

$$F_{m+2n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} F_{m+i}$$

Niech $x_n = \begin{pmatrix} F_{m+1+n} \\ F_{n+m} \end{pmatrix}$ oraz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Zauważmy, że

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A + I$$

czyli

$$A^{2n} = (A^2)^n = (A + I)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} A^i$$

Mnożąc obie strony przez $x_0 = \begin{pmatrix} F_{m+1} \\ F_m \end{pmatrix}$ otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} F_{m+2n+1} \\ F_{m+2n} \end{pmatrix} = x_{2n} = A^{2n} x_0 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} A^i x_0 = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \begin{pmatrix} F_{m+i+1} \\ F_{m+i} \end{pmatrix}$$

i przyrównując drugie współrzędne otrzymujemy:

$$F_{m+2} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} F_{m+i}$$

ZAD. 3.

Sposobów na ułożenie $2n$ skarpet (czyli n par) jest $(2n)!$. Jednak zazwyczaj skarpety z jednej pary są nierozróżnialne, więc nie ma znaczenia które będzie pierwsza. W każdej parze mamy 2 sposoby na wybranie która skarpeta jest pierwsza, mamy n par więc ogółem tych sposobów jest 2^n . Czyli ogółem sposobów na ułożenie n par skarpet jest

$$\frac{(2n)!}{2^n}.$$

Zastanówmy się teraz, ile jest sposobów na ułożenie n par skarpet tak, żeby określone k par było obok siebie. Zwijając k par skarpet razem zmniejszamy liczbę elementów o k , czyli teraz mamy $(2n - k)$ rozróżnialnych skarpet. Rozłożyć niezwiązane $(2n - 2k)$ skarpet tak, żeby skarpety z jednej pary nie były obok siebie można na $\frac{(2n-2k)!}{2^{n-2k}}$ sposobów. Mamy teraz ciąg $(2n - 2k)$ ustawionych skarpet w który chcemy włożyć k dodatkowych elementów. Całość będzie się sumować do $(2n - k)$, więc z $(2n - k)$ możemy wybrać które k miejsc wybierzemy na $\binom{2n-k}{k}$ sposobów. Czyli k par skarpet zmuszamy do bycia razem podczas gdy pozostałe są rozdzielone na

$$\frac{(2n - 2k)!}{2^{n-2k}} \binom{2n - k}{k}$$

sposobów.

Teraz, z zasady włączeń i wyłączeń, dostajemy szukaną odpowiedź w postaci:

$$A_n = \frac{(2n)!}{2^n} - \sum_{i=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{(2n - 2k)!}{2^{n-2k}} \binom{2n - k}{k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2n - k}{k} \frac{(2n - 2k)!}{2^{n-k}}$$

ZAD. 4.

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_1 = 0 \\ a_n = \frac{1}{2}(a_{n-1} + a_{n-2}) \end{cases}$$

Rozważmy ciąg geometryczny: $x_n = q^n$, wtedy

$$\begin{aligned} q^n &= \frac{1}{2}(q^{n-1} + q^{n-2}) \\ q^2 &= \frac{1}{2}(q + 1) \end{aligned}$$

Czyli $x_n = q^n$ dla q będących zerami wielomianu

$$\begin{aligned} w(x) &= x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = (x - \frac{1}{4})^2 - \frac{9}{16} \\ x - \frac{1}{4} &= \pm \frac{3}{4} \\ x &= 1 \vee x = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Czyli ciąg x_n rozwiązuje

$$x_n = c_1 1^n + c_2 \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

Dla dwóch pierwszych wyrazów daje to

$$\begin{cases} x_0 = 1 = c_1 + c_2 \\ x_1 = 0 = c_1 - \frac{c_2}{2} \end{cases}$$

czyli $c_2 = \frac{2}{3}$ oraz $c_1 = \frac{1}{3}$ a postać jawna ciągu to

$$x_n = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}(-2)^{-n}$$

ZAD. 5.

jakis losowy stackexchange

(c) $a_{n+2} = 2^{n+1} - a_{n+1} - a_n$

Wprowadźmy nowy ciąg, b_n taki, że

$$b_n = \frac{a_n}{2^{n-1}}$$

wtedy

$$b_{n+2}2^{n+1} = 2^{n+1} - b_{n+1}2^n - b_n2^{n-1}$$

$$b_{n+2} = 1 - b_{n+1}2^{-1} - b_n2^{-2}$$

$$q^{n+2} = 1 - \frac{1}{2}q^{n+1} - \frac{1}{4}q^n$$