



Boletim 1239

Elaborado:
1/3/2020



Comportamento e Análise da Precipitação

Segundo dados do Cptec, a precipitação observada dos últimos dias no Estado de Roraima, mostra que o acumulado de chuva no Estado foi próximo de 25mm. Já os dados registrados pela estação automática A135 do Inmet, mostrou que durante 1 dia de chuva em fevereiro de 2020, o acumulado de precipitação foi de 3,4mm com temperatura média de 28,1°C. Em março ainda não choveu em Boa Vista. Conforme a *Figura 1*, o prognóstico das tendências climáticas para o **trimestre**, MAR-ABR-MAI, mostra que **70% dos modelos climáticos indicam condição de neutralidade**, 30% indicam El Niño e 0% indicam La Niña. A previsão para os próximos meses é de chuva dentro normal climatológica em Roraima. **A referência histórica de precipitação em Boa Vista é de 1678,6mm de chuva. De janeiro a fevereiro de 2020, o acumulado de precipitação foi de 8,6mm, com a maior precipitação no mês de Janeiro (5,2mm) e a menor precipitação em Fevereiro (3,4mm)**




Figura 1

Previsão de Precipitação

As atuais condições oceânicas e atmosféricas no oceano Pacífico Tropical indicam transição do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) para condições de neutralidade nos próximos meses, porém com 30% de previsão de ocorrer El Niño. De acordo com o Sipam, a previsão de chuva para os próximos dias em Boa Vista é de tempo **claro a parcialmente nublado**; com temperaturas estáveis variando entre 25°C e 36°C, umidade entre 30% e 75% e ventos direção NE (intensidade fraca/moderada) com possíveis rajadas isoladas. Conforme o modelo de previsão da *Figura 2*, o oeste do Estado será atingido com média próxima de 5mm de chuva. Já a previsão sazonal para o **trimestre** MAR-ABR-MAI é de que as chuvas tenham valores próximos da normal climatológica no Estado de Roraima.




Figura 2 - Modelo COSMO (7 x 7km) - INMET. Modelo de precipitação acumulada

Monitoramento Níveis Fluviométricos e Focos de Queima

Segundo dados obtidos da RNH (Rede Hidrometeorológica Nacional), hoje, o nível do Rio Branco em Boa Vista se encontra em **0,22m** e em Caracaraí **0,72m**. Comparando com 2019 os níveis foram, respectivamente 0,24m e 0,72m. Em março de 2020, foram registrados 92 focos de queima, totalizando 872 focos no ano. Já março de 2019 registrou-se 2433 focos de um total anual de 4784 focos. A previsão de risco de fogo para três dias é de alto a crítico no nordeste de Roraima.




A segunda quinzena do mês de setembro marca o final do período chuvoso no Estado, o que terá como consequência a diminuição dos principais rios da Sub Bacia Rio Branco (Rio Tacutu, Uiramutã e Uricacoera) que já tiveram registros muito abaixo da média nos últimos anos. Tendo em vista que as frequentes chuvas devem diminuir do mês de setembro em diante, recomenda-se que o Comitê de Queimadas do Estado de Roraima intensifique o monitoramento nas áreas de risco consideradas vulneráveis à estiagem, queimadas e incêndios florestais.

Boletim elaborado com dados fornecidos pela ANA, CAER, CPRM, FEMARRH, INMET, INPE, SIPAM e SUDAM. O uso das informações contidas neste boletim é de completa responsabilidade do usuário



Precipitação, em milímetros, do mês de Janeiro a Fevereiro de 2020 das Estações Telemétricas da ANA/CPRM/FEMARH



Precipitação, em milímetros, do mês de Janeiro a Fevereiro de 2020 das Estações Telemétricas da ANA/CPRM/FEMARH

