



Boletim 1278

Elaborado: 9/4/2020

















Segundo dados do Cptec, a precipitação observada dos últimos dias em Roraima, mostra que o acumulado de chuva no sudoeste Estado foi próximo de 125mm. Já os dados registrados pela estação automática A135 do Inmet, mostrou que durante 1 dia de chuva em março de 2020, o acumulado de precipitação foi de 2,4mm com temperatura média de 30,9°C. Em abril já choveu 30mm em Boa Vista. Conforme a Figura 1, o prognóstico das tendências climáticas para o trimestre, ABR-MAI-JUN, mostra que 81% dos modelos climáticos indicam con-



Figura 1

condição de neutralidade, 18% indicam El Niño e 1% indicam La Niña. A previsão para os próximos meses é de chuva dentro normal climatológica em Roraima. A referência histórica de precipitação em Boa Vista é de 1678,6mm de chuva. De janeiro a março de 2020, o acumulado de precipitação foi de 11mm, com a maior precipitação no mês de Janeiro (5,2mm) e a menor precipitação em Março (2,4mm)

Previsão de Precipitação

As atuais condições oceânicas e atmosféricas no oceano Pacífico Tropical indicam transição do fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS) para condições de neutralidade nos próximos meses, porém com 18% de previsão de ocorrer El Niño. De acordo com o Sipam, a previsão de chuva para os próximos dias em Boa Vista é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas entre o final da tarde e o início da noite; com temperaturas estáveis variando entre 24°C e 33°C, umidade entre 55% e 85% e ventos direção NE (intensidade fraca/moderada) com possíveis rajadas isoladas. Conforme o modelo de previsão da Figura 2, o sul do Estado será atingido com 7mm de chuva. A previsão sazonal para o trimestre ABR-MAI-JUN é de chuvas próximas da normal climatológica no Estado de Roraima.




Figura 2 - Modelo COSMO (7 x 7km) -INMET. Modelo precipitação de

Monitoramento Níveis Fluviométricos e Focos de Queima

Segundo dados obtidos da RNH (Rede Hidrometeorológica Nacional), hoje, o nível do Rio Branco em Boa Vista se encontra em 0,54m e em Caracaraí 0,95m. Comparando com 2019 os níveis foram, respectivamente -0,21m e 0,45m. Em abril de 2020, já foram registrados 32 focos de queima, totalizando 1507 focos no ano. Já abril de 2019 registrou-se 1134 focos de um total anual de 4784 focos. A previsão de risco de fogo para três dias é de alto a crítico no nordeste de Roraima.




A segunda quinzena do mês de abril marca o início do período chuvoso no Estado; o que terá como consequência a elevação de nível dos principais rios da Sub Bacia Rio Branco (Rio Tacutu, Uiramutã e Uraricoera), que tiveram baixos registros nos últimos anos. Tendo em vista que o período chuvoso deve se estender até o mês de setembro, recomenda-se que a defesa civil dos municípios e do Estado intensifiquem o monitoramento nas eas de risco consideradas vulneráveis a alagamento, inundações e enxurradas

Boletim elaborado com dados fornecidos pela ANA, CAER, CPRM, FEMARH, INMET, INPE, SIPAM e SUDAM. O uso das informações contidas neste boletim é de completa responsabilidade do usuário




Acompanhe nosso Boletim Diário no site da Femarh: http://servicos.femarh.rr.gov.br/boletim.php

Precipitação, em milímetros, do mês de Janeiro a Março de 2020 das Estações Telemétricas da ANA/CPRM/FEMARH



Precipitação, em milímetros, do mês de Janeiro a Março de 2020 das Estações Telemétricas da ANA/CPRM/FEMARH





FEMARH Avenida Ville Roy, 4935 São Pedro - Boa Vista - RR CEP 69.306-040 TELEFAX: 095 2121-9190