



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

— ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ —

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑΣ

— Ασκήσεις • Πρόληψη • Καθημερινές Συμβουλές —



Οι κατάλληλες διατάσεις και η σταδιακή φόρτιση μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη **μείωση του πόνου** και στη **βελτίωση της λειτουργικότητας του ποδιού**.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ;

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες πόνου στη φτέρνα.

Η πάθηση αφορά τον ερεθισμό ή τη μικροτραυματική καταπόνηση της πελματιαίας απονεύρωσης, μιας ισχυρής ταινίας συνδετικού ιστού που εκτείνεται από τη φτέρνα έως τα δάκτυλα.

Ο πόνος εμφανίζεται συνήθως:

- ✓ στα πρώτα βήματα το πρωί
- ✓ μετά από παρατεταμένη ορθοστασία
- ✓ μετά από έντονη δραστηριότητα
- ✓ μετά από πολύωρη ανάπαυση

Στις περισσότερες περιπτώσεις η σωστή ενημέρωση, οι διατάσεις και η σταδιακή φόρτιση συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση των συμπτωμάτων.



4 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ



ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

Κινητοποιήστε απαλά το πέλμα πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι.



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Χρησιμοποιήστε παπούτσια με καλή απορρόφηση κραδασμών.



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

Οι συστηματικές διατάσεις αποτελούν βασικό μέρος της θεραπείας.



ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Η πλήρης ακινησία συνήθως δεν βοηθά την αποκατάσταση.

“

Η συνέπεια στις διατάσεις και η σωστή επιλογή υποδημάτων μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ποδιού.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ

Οι παρακάτω ασκήσεις βοηθούν στη μείωση του πόνου, στην αύξηση της ευλυγισίας και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του ποδιού.



Εκτελέστε τις ασκήσεις καθημερινά.
Η συνέπεια είναι το κλειδί της αποκατάστασης.

01

ΔΙΑΤΑΣΗ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΣΕΤΑ



Καθίστε με το πόδι τεντωμένο.
Περάστε μια πετσέτα γύρω από
μπροστινό μέρος του πέλματος και τραβήξτε
απαλά προς το μέρος σας.
Διατηρήστε για 30 δευτερόλεπτα.
Επαναλάβετε 3 φορές.



02

ΔΙΑΤΑΣΗ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟΥ (ΙΣΙΟ ΓΟΝΑΤΟ)



Σταθείτε απέναντι από έναν τοίχο.
Τοποθετήστε το ένα πόδι πίσω,
κρατώντας το γόνατο τεντωμένο
και τη φτέρνα στο έδαφος.
Λυγίστε ελαφρώς το μπροστινό πόδι
και νιώστε διάταση στη γάμπα.
Διατηρήστε για 30 δευτερόλεπτα.
Επαναλάβετε 3 φορές σε κάθε πόδι.



03

ΔΙΑΤΑΣΗ ΥΠΟΚΝΗΜΙΔΙΟΥ (ΛΥΓΙΣΜΕΝΟ ΓΟΝΑΤΟ)



Επαναλάβετε την ίδια άσκηση,
αλλά αυτή τη φορά λυγίστε ελαφρώς
το πίσω γόνατο. Θα νιώσετε διάταση
πιο χαμηλά, στον υποκνημίδιο μυ.
Διατηρήστε για 30 δευτερόλεπτα.
Επαναλάβετε 3 φορές σε κάθε πόδι.



Οι ασκήσεις πρέπει να εκτελούνται χωρίς πόνο.
Ήπια ενόχληση είναι φυσιολογική, έντονος πόνος όχι.
Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΠΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



ΠΟΙΟΣ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΠΕΛΜΑΤΙΑΙΑ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΤΙΔΑ;

Είναι συχνή σε άτομα που περπατούν ή στέκονται πολύ, σε αθλητές, αλλά και σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος ή ακατάλληλα υποδήματα.



ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ;

Η βελτίωση εξαρτάται από τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και τη συνέπεια στο πρόγραμμα ασκήσεων. Συνήθως απαιτούνται 6-12 εβδομάδες.



ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ;

Όχι. Η πλήρης ακινησία δεν βοηθά. Η σταδιακή φόρτιση και οι κατάλληλες ασκήσεις είναι πιο αποτελεσματικές.



ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΩ ΠΑΤΟΤΗΤΕΣ;

Σε πολλές περιπτώσεις βοηθούν στον έλεγχο του πόνου, ειδικά όταν συνδυάζονται με ασκήσεις και κατάλληλα υποδήματα.



ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ;

Αν ο πόνος επιμένει πάνω από 6-8 εβδομάδες, δεν βελτιώνεται ή επηρεάζει τις καθημερινές σας δραστηριότητες.



ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ



Έντονος πόνος που επιμένει ή αυξάνεται παρά την εφαρμογή του προγράμματος.



Πόνος που επηρεάζει τον ύπνο σας ή τις καθημερινές σας δραστηριότητες.



Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή πόνος που ακτινοβολεί.



Οποιαδήποτε συμπτώματα σας ανησυχούν.

“

Η σωστή αξιολόγηση, οι στοχευμένες διατάξεις και η σταδιακή ενδυνάμωση είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση της πελματιαίας απονευρωσίτιδας και την επιστροφή στις καθημερινές σας δραστηριότητες χωρίς πόνο.

