



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Οδηγίες • Αποκατάσταση • Συχνές Ερωτήσεις



“ Το υαλουρονικό οξύ συμβάλλει στη βελτίωση της λίπανσης της άρθρωσης και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του πόνου και στη βελτίωση της κινητικότητας.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr



ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ;

Η έγχυση υαλουρονικού οξέος αποτελεί μία από τις συχνότερες συντηρητικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Το υαλουρονικό οξύ είναι φυσικό συστατικό του αρθρικού υγρού και συμβάλλει:

- ✓ στη λίπανση της άρθρωσης
- ✓ στη μείωση των τριβών
- ✓ στην απορρόφηση κραδασμών
- ✓ στη βελτίωση της κινητικότητας

Με την πάροδο του χρόνου η ποιότητα και η ποσότητα του φυσικού υαλουρονικού μειώνονται, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση συμπτωμάτων.

Η θεραπεία στοχεύει στη βελτίωση του αρθρικού περιβάλλοντος και της λειτουργικότητας της άρθρωσης.



4 ΧΡΗΣΙΜΑ ΟΦΕΛΗ



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Διευκολύνει την ομαλή κίνηση της άρθρωσης και μειώνει τις τριβές.



ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΝΟΥ

Μπορεί να συμβάλει στη μείωση του πόνου και της δυσκαμψίας.



ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Βοηθά στη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας.



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Η διαδικασία είναι γρήγορη, ασφαλής και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.

“

Το υαλουρονικό οξύ δεν θεραπεύει την αρθρίτιδα, αλλά μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινής λειτουργικότητας των ασθενών.



Φαβιέρου 13,
Χαλκίδα



22210 21010



georgiosrontogiannis.gr




ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ
για να επισκεφθείτε
το Mini App



ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ

Η σωστή φροντίδα μετά την έγχυση υαλουρονικού οξέος συμβάλλει στη βέλτιστη δράση της θεραπείας και στη μείωση πιθανής ενόχλησης.



ΠΡΩΤΕΣ 24 ΩΡΕΣ



ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΝΤΟΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Αποφύγετε έντονη σωματική καταπόνηση, τρέξιμο, άλματα, βαριά γυμναστική και αθλήματα για 24-48 ώρες.



ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ

Μην σηκώνετε βαριά αντικείμενα και αποφύγετε δραστηριότητες που επιβαρύνουν την άρθρωση.



ΗΠΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κάνετε ήπιες κινήσεις και περπατήστε ελεύθερα στο σπίτι. Αποφύγετε την παρατεταμένη ακινησία.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΓΟΥ (ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ)

Σε περίπτωση ήπιας ενόχλησης ή οιδήματος, εφαρμόστε πάγο για 10-15 λεπτά, 2-3 φορές μέσα στην ημέρα.



ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ



ΒΑΣΙΣΗ / ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

Επιτρέπεται η βάδιση και οι καθημερινές μετακινήσεις.



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορείτε να εκτελείτε ελαφριές καθημερινές δραστηριότητες (δουλειές σπιτιού, γραφείο κ.λπ.).



ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ



ΤΡΕΞΙΜΟ

Αποφύγετε το τρέξιμο και τις απότομες κινήσεις για 24-48 ώρες.



ΑΛΜΑΤΑ & ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αποφύγετε άλματα, αθλήματα και δραστηριότητες που επιβαρύνουν την άρθρωση.



ΕΝΤΟΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Μην πραγματοποιείτε έντονη γυμναστική, βάρη ή ομαδικά προγράμματα για 24-48 ώρες.



ΠΟΤΕ ΕΠΑΝΕΡΧΕΣΤΕ;

Μπορείτε να επιστρέψετε σταδιακά στις συνήθεις δραστηριότητές σας, ανάλογα με την ενόχληση και τις οδηγίες του ιατρού σας.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του ιατρού σας για το καλύτερο αποτέλεσμα.



Η φροντίδα μετά την έγχυση είναι σημαντικό βήμα για τη βέλτιστη δράση της θεραπείας και τη μείωση της ενόχλησης.





ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

04

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ;

Τα αποτελέσματα ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Συνήθως παρατηρείται βελτίωση μέσα σε λίγες ημέρες έως μερικές εβδομάδες.



ΠΟΣΟ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ;

Η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με την πάθηση, τη βαρύτητα της αρθρίτιδας, τον τύπο του σκευάσματος και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Συνήθως διαρκεί 6-12 μήνες.



ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ;

Ναι. Η βάδιση επιτρέπεται άμεσα. Σας ενθαρρύνουμε να κινείστε ήπια μέσα στην ημέρα.



ΠΟΣΕΣ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ;

Εξαρτάται από το σκεύασμα και την εκτίμηση του ιατρού σας. Συνήθως απαιτούνται 1 έως 3 εγχύσεις σε εβδομαδιαία βάση.



ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ;

Ναι. Το υαλουρονικό οξύ είναι καλά ανεκτό και έχει υψηλό προφίλ ασφαλείας. Οι επιπλοκές είναι σπάνιες και συνήθως ήπιες και παροδικές.



ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Επικοινωνήστε άμεσα με τον ιατρό σας αν εμφανίσετε:



Έντονο οίδημα ή πρήξιμο που επιμένει ή επιδεινώνεται.



Έντονη ερυθρότητα ή θερμότητα στην περιοχή της έγχυσης.



Πόνο που επιδεινώνεται σημαντικά μετά την έγχυση.



Πυρετό ή ρίγη.



Οποιοδήποτε σύμπτωμα σας ανησυχεί.



Η θεραπεία με υαλουρονικό οξύ αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στη διαχείριση της αρθρίτιδας και στη βελτίωση της καθημερινότητας. Η σωστή καθοδήγηση και η συνέπεια στο πρόγραμμα του ιατρού οδηγούν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

