

Exerciții de seminar

1 Teoria mulțimilor

1. Să se dea exemple de x și y , astfel încât să se întâmple, pe rând:

- (a) $x \in y$ și $x \subseteq y$;
- (b) $x \in y$ și $x \not\subseteq y$;
- (c) $x \notin y$ și $x \subseteq y$;
- (d) $x \notin y$ și $x \not\subseteq y$.

Soluție:

- (a) Luăm $x = \emptyset$, $y = \{\emptyset\}$.
- (b) Luăm $x = \{\emptyset\}$, $y = \{\{\emptyset\}\}$.
- (c) Luăm $x = \emptyset$, $y = \emptyset$.
- (d) Luăm $x = \{\emptyset\}$, $y = \emptyset$.

□

2. Reamintim din curs că, pentru orice F și z ,

$$z \in \bigcup F \Leftrightarrow \text{există } x \text{ cu } x \in F \text{ și } z \in x$$

și că, pentru orice F nevidă,

$$\bigcap F = \left\{ z \in \bigcup F \mid \text{pentru orice } x \text{ cu } x \in F, \text{ avem } z \in x \right\}.$$

Arătați că definiția de mai sus pentru intersecții arbitrare este corectă. Mai exact, arătați că pentru orice F nevidă, avem că pentru orice z ,

$$z \in \bigcap F \Leftrightarrow \text{pentru orice } x \text{ cu } x \in F, \text{ avem } z \in x.$$

Unde se folosește în demonstrație faptul că F este nevidă?

Soluție: Fie F și z ca în enunț.

„ \Rightarrow ” Evident.

„ \Leftarrow ” Presupunem că z este astfel încât pentru orice x cu $x \in F$, avem $z \in x$ și vrem să arătăm că $z \in \bigcap F$.

Rămâne de arătat doar că $z \in \bigcup F$. Fiindcă F este nevidă, există $x \in F$. Avem deci $z \in x$. De aici deducem $z \in \bigcup F$. □

3. Definim, pentru orice x, y , $\langle x, y \rangle := \{x, \{y\}\}$. Arătați că aceasta nu este o definiție adecvată a perechii ordonate.

Soluție: Vrem să găsim exemple de x, y, u, v astfel încât $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$, dar nu este adevărat că $x = u$ și $y = v$, adică $x \neq u$ sau $y \neq v$.

Idea este următoarea. Ne uităm la egalitatea $\{x, \{y\}\} = \{u, \{v\}\}$ și căutăm să o satisfacem „invers”, adică via $x = \{v\}$ și $u = \{y\}$. Prin urmare, u și x sunt atunci determinate de y și v , și deci este suficient să găsim y și v cu $y \neq v$. Dar noi știm două mulțimi diferite, de pildă \emptyset și $\{\emptyset\}$.

Raționăm acum riguros. Alegem $x := \{\{\emptyset\}\}$, $y := \emptyset$, $u := \{\emptyset\}$, $v := \{\emptyset\}$. Se observă că $y \neq v$ (și, mai mult, deși nu mai este nevoie, $x \neq u$). Atunci

$$\langle x, y \rangle = \{x, \{y\}\} = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset\}\},$$

iar

$$\langle u, v \rangle = \{u, \{v\}\} = \{\{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\},$$

deci $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$. □

4. Arătați (folosind doar primele cinci axiome ZFC din curs) că nu există mulțimea tuturor mulțimilor singleton.

Soluție: Presupunem că ar exista și o notăm cu S .

Notăm $V := \bigcup S$. Atunci, pentru orice x , avem $x \in \{x\}$ și $\{x\} \in S$, deci $x \in \bigcup S = V$. Ca urmare, V este mulțimea tuturor mulțimilor. Contradicție! □

5. Fie R o relație binară. Să se arate că:

(a) Următoarele afirmații sunt echivalente:

- există A și B astfel încât R este grafic între A și B ;
- pentru orice x, y, z cu $(x, y), (x, z) \in R$, avem $y = z$.

(b) Dacă A, B, C, D sunt astfel încât R este grafic atât între A și B , cât și între C și D , atunci $A = C$.

Soluție:

(a) „ \Rightarrow ” Evident.

„ \Leftarrow ” Cum R este relație binară, există C, B astfel încât R este relație între C și B . Notăm:

$$A := \{a \in C \mid \text{există } b \in B \text{ cu } (a, b) \in R\}.$$

Fie $p \in R$. Atunci există $a \in C$ și $b \in B$ cu $(a, b) = p \in R$. Deci $a \in A$ și deci $p \in A \times B$. Prin urmare, $R \subseteq A \times B$, deci R este relație între A și B .

Demonstrăm acum că R este chiar grafic între A și B . Fie acum $a \in A$. Atunci, din definiția lui A , există $b \in B$ cu $(a, b) \in R$. Mai trebuie să arătăm că este unic. Dacă avem $z \in B$ cu $(a, z) \in R$, atunci, folosind condiția din ipoteză, $b = z$.

(b) Fie $a \in A$. Cum R este grafic între A și B , există $b \in B$ cu $(a, b) \in R$. Cum $R \subseteq C \times D$, există $c \in C$ și $d \in D$ cu $(a, b) = (c, d)$. Rezultă $a = c \in C$. Am demonstrat că $A \subseteq C$.

Analog se arată $C \subseteq A$, deci avem $A = C$. □

6. Fie A o mulțime. Să se arate că:

(a) Dacă \leq este o relație de ordine parțială pe A și dacă definim $<\subseteq A \times A$ ca fiind mulțimea tuturor perechilor (a, b) cu proprietatea că $a \leq b$ și $a \neq b$, atunci $<$ este o relație de ordine strictă pe A .

- (b) Dacă $<$ este o relație de ordine strictă pe A și dacă definim $\leq \subseteq A \times A$ ca fiind mulțimea tuturor perechilor (a, b) cu proprietatea că $a < b$ sau $a = b$, atunci \leq este o relație de ordine parțială pe A .

Soluție: Fie $x, y, z \in A$.

- (a) Dacă avem $x < x$, atunci $x \neq x$, o contradicție. Deci $<$ este ireflexivă.
Presupunem $x < y$ și $y < z$. Atunci $x \leq z$. Dacă am avea $x = z$, atunci am avea $x \leq y \leq x$, deci $x = y$, contradicție. Deci $x < z$. Am arătat că $<$ este tranzitivă.
Prin urmare, $<$ este o relație de ordine strictă.
- (b) Cum $x = x$, avem $x \leq x$. Deci \leq este reflexivă.
Presupunem prin absurd că $x \leq y$ și $y \leq x$, dar $x \neq y$. Atunci $x < y$ și $y < x$, contradicție cu faptul că $<$ este asimetrică. Deci \leq este antisimetrică.
Presupunem $x \leq y$ și $y \leq z$. Dacă $x = y$, atunci clar $x \leq z$. Analog pentru $y = z$. Rămâne cazul când $x < y$ și $y < z$, iar atunci $x < z$, deci $x \leq z$. Am arătat că \leq este tranzitivă.
Prin urmare, \leq este o relație de ordine parțială.

□

7. Fie $n \in \mathbb{N}$. Arătați că:

- (a) Ori $n = 0$, ori există $m \in \mathbb{N}$ cu $n = m^+$.
(b) Pentru orice $m \in n$, $m \in \mathbb{N}$.
(c) Avem $n = \{m \in \mathbb{N} \mid m < n\}$.

Soluție:

- (a) Demonstrăm prin inducție după n . Pentru $n = 0$, enunțul este trivial.
Fie n . Vrem acum să arătăm că dacă există $m \in \mathbb{N}$ cu $n = m^+$, atunci există $p \in \mathbb{N}$ cu $n^+ = p^+$. E suficient să luăm $p := n$.
(Deși inducția este trivială, am scris acest enunț în mod explicit, fiindcă va fi folosit în exercițiul următor.)
- (b) Demonstrăm prin inducție după n . Pentru $n = 0$, enunțul este trivial.
Presupunem adevărat că pentru orice $m \in n$, $m \in \mathbb{N}$ și arătăm că pentru orice $m \in n^+$, $m \in \mathbb{N}$.
Fie $m \in n^+ = n \cup \{n\}$. Atunci $m \in n$, deci $m \in \mathbb{N}$ din ipoteza de inducție, sau $m = n \in \mathbb{N}$.
- (c) Incluziunea „ \supseteq ” este imediată. Pentru incluziunea „ \subseteq ”, luăm $m \in n$, iar din punctul anterior știm că $m \in \mathbb{N}$. Cum $m < n$ este doar o reformulare a lui $m \in n$, rezultă că m aparține mulțimii din dreapta.

□

8. Fie $A \subseteq \mathbb{N}$ nevidă ce admite majorant. Arătați că A admite maxim.

Soluție: Fie $B := \{k \in \mathbb{N} \mid k \text{ majorant pentru } A\}$. Cum $B \neq \emptyset$, există minimul lui B (deci supremumul lui A), pe care îl notăm cu n . E suficient să arătăm că $n \in A$.

Presupunem că $n \notin A$. Atunci pentru orice $l \in A$, $l < n$. Cum $A \neq \emptyset$, rezultă $n \neq 0$, deci (din primul punct al exercițiului anterior) există $m \in \mathbb{N}$ cu $n = m^+$, și deci $m < n$. Avem că pentru orice $l \in A$, $l < m^+$, deci $l \leq m$. Prin urmare, m este majorant pentru A , contradicție cu faptul că n este cel mai mic majorant.

□

9. Fie X, Y mulțimi cu $X \neq \emptyset$ și $f : X \rightarrow Y$ injectivă. Să se arate că există $g : Y \rightarrow X$ cu $g \circ f = \text{id}_X$.

Soluție: Cum $X \neq \emptyset$, există $a \in X$. Definim $g : Y \rightarrow X$, pentru orice $y \in Y$, astfel: dacă există $x \in X$ (necesar unic) cu $f(x) = y$, punem $g(y) := x$, altfel punem $g(y) := a$.

Fie $x \in X$. Notând $y := f(x)$, avem $g(y) = x$, deci $g(f(x)) = x$. Am demonstrat că $g \circ f = \text{id}_X$. \square

10. Arătați că o submulțime A a unei mulțimi finite B este finită.

Soluție: Demonstrăm prin inducție după numărul de elemente n al lui B .

Dacă $n = 0$, $B = \emptyset$ și deci $A = \emptyset$ și are și ea 0 elemente.

Presupunem adevărat pentru un n și demonstrăm pentru n^+ . Presupunem, deci, că B are n^+ elemente, deci există o bijecție $f : n^+ \rightarrow B$. Notăm $C := B \setminus \{f(n)\}$. Atunci C are n elemente și distingem două cazuri.

Dacă $f(n) \notin A$, atunci $A \subseteq C$ și este deci finită din ipoteza de inducție.

Dacă $f(n) \in A$, atunci notând $D := A \setminus \{f(n)\} = A \cap C$ avem că $D \subseteq C$, deci este finită din ipoteza de inducție și așadar există m astfel încât D are m elemente. Rezultă că $A = D \cup \{f(n)\}$ are m^+ elemente și este deci finită. \square

11. Dacă f este un șir \mathbb{N} -valuat infinit, spunem că f este **finalmente constant** dacă există $k \in \mathbb{N}$ astfel încât pentru orice $m \in \mathbb{N}$, $f_{k+m} = f_k$. Arătați că mulțimea C a șirurilor finalmente constante este numărabilă.

Soluție: Clar, pentru orice $n \in \mathbb{N}$ putem considera șirul ce ia numai valoarea n . Prin urmare $\aleph_0 \leq |C|$.

Definim acum $\phi : C \rightarrow \mathbb{N}$, pentru orice $f \in C$, prin

$$\phi(f) := \min\{k \in \mathbb{N} \mid \text{pentru orice } m \in \mathbb{N}, f_{k+m} = f_k\}$$

și $\psi : C \rightarrow \text{Seq}(\mathbb{N})$, pentru orice $f \in C$, prin

$$\psi(f) := (f_i)_{i < \phi(f)^+} = f \cap (\phi(f)^+ \times \mathbb{N}).$$

Atunci ψ este injectivă și, cum am demonstrat la curs că $\text{Seq}(\mathbb{N})$ este numărabilă, rezultă că $|C| \leq \aleph_0$, deci $|C| = \aleph_0$. \square

12. Arătați că mulțimea \mathcal{O} a tuturor mulțimilor deschise ale lui \mathbb{R} (în topologia canonică) are cardinalul \mathfrak{c} .

Soluție: În această soluție, vom folosi notația (a, b) și pentru pereche ordonată, și pentru interval deschis, dezambiguizându-le la fiecare folosire.

Clar, oricărui număr real r îi putem asocia intervalul deschis $(r - 1, r)$, deci avem cel puțin \mathfrak{c} deschiși. Rămâne de arătat că avem cel mult pe atât.

Definim acum $\phi : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})$, pentru orice mulțime deschisă D , prin

$$\phi(D) := \{(a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid \text{intervalul } (a, b) \text{ este inclus în } D\}.$$

Demonstrăm că ϕ este injectivă, ceea ce ne încheie demonstrația, dat fiind că $|\mathcal{P}(\mathbb{Q} \times \mathbb{Q})| = \mathfrak{c}$.

Fie D, E mulțimi deschise cu $\phi(D) = \phi(E)$ și vrem $D = E$. Este suficient să arătăm că $D \subseteq E$, cealaltă incluziune rezultând din simetria problemei. Fie $r \in D$. Cum D este deschisă, există $\varepsilon > 0$ astfel încât intervalul $(r - \varepsilon, r + \varepsilon)$ este inclus în D . Cum \mathbb{Q} este densă în \mathbb{R} , există $a, b \in \mathbb{Q}$ cu

$$r - \varepsilon < a < r < b < r + \varepsilon.$$

Atunci intervalul (a, b) este inclus în D , deci perechea (a, b) aparține lui $\phi(D)$ și deci și lui $\phi(E)$. Prin urmare, intervalul (a, b) este inclus în E și deci, cum r aparține intervalului, avem $r \in E$. \square

13. Fie α un ordinal. Arătați că α^+ este ordinal.

Soluție: Reamintim că $\alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$.

Demonstrăm că α^+ este tranzitivă. Fie x, y cu $x \in \alpha^+$ și $y \in x$. Vrem $y \in \alpha^+$. Vom arăta chiar $y \in \alpha$. Cum $x \in \alpha^+$, avem $x \in \alpha$ sau $x = \alpha$. Dacă $x \in \alpha$, avem $y \in \alpha$ fiindcă α este tranzitivă. Dacă $x = \alpha$, cum $y \in x$, avem $y \in \alpha$.

Demonstrăm că \in_{α^+} este ireflexivă. Fie $x \in \alpha^+$ și vrem $x \notin x$. Dacă $x \in \alpha$, atunci nu putem avea $x \in x$ din faptul că \in_α este ireflexivă. Dacă $x = \alpha$, atunci $x \in x$ ar însemna $x \in \alpha$ și putem aplica raționamentul de la primul caz.

Demonstrăm că \in_{α^+} este tranzitivă. Fie $x, y, z \in \alpha^+$ cu $x \in y$ și $y \in z$. Vrem $x \in z$. Dacă $z \in \alpha$, atunci, din tranzitivitatea lui α , rezultă, pe rând, $y \in \alpha$ și $x \in \alpha$. Cum \in_α este tranzitivă, rezultă $x \in z$. Dacă $z = \alpha$, atunci avem $x \in y$ și $y \in \alpha$, iar cum α este tranzitivă, avem $x \in \alpha = z$.

Demonstrăm acum că \in_{α^+} este o bună ordine. Fie o mulțime nevidă $A \subseteq \alpha^+ = \alpha \cup \{\alpha\}$. Notăm $B := A \cap \alpha$. Dacă B este nevidă, există un minim al ei relativ la \in . Cum $B \subseteq \alpha$, acel minim aparține lui α , deci este mai mic și ca α . Prin urmare, el este minimul lui A în ansamblu. Dacă B este vidă, atunci avem $A = \{\alpha\}$ ce îl are pe α ca minim. \square

14. Fie α un ordinal. Arătați că $\alpha \notin \alpha$.

Soluție: Dacă am avea $\alpha \in \alpha$, atunci s-ar contrazice ireflexivitatea lui \in_α . \square

15. Fie α un ordinal și $\beta \in \alpha$. Arătați că β este ordinal.

Soluție: Demonstrăm că β este tranzitivă. Fie u, v cu $u \in v$ și $v \in \beta$. Vrem $u \in \beta$. Cum α este tranzitivă și $\beta \in \alpha$, avem $v \in \alpha$, iar apoi $u \in \alpha$. Deci $u, v, \beta \in \alpha$, iar concluzia rezultă din tranzitivitatea lui \in_α .

Cum $\beta \in \alpha$ și α este tranzitivă, avem $\beta \subseteq \alpha$, deci \in_β este restricția la β (i.e. intersecția cu $\beta \times \beta$) a lui \in_α , deci este și ea o relație de bună ordine. \square

16. Fie α și β ordinali astfel încât $\alpha \subsetneq \beta$. Arătați că $\alpha \in \beta$.

Soluție: Cum $\beta \setminus \alpha \neq \emptyset$, există un minim al său, pe care îl notăm cu γ . Vom arăta $\gamma = \alpha$, de unde va rezulta $\alpha \in \beta$.

Pentru implicația „ \subseteq ”, presupunem că există $\delta \in \gamma$ cu $\delta \notin \alpha$. Atunci, cum β este tranzitivă, avem $\delta \in \beta$, deci avem $\delta \in \beta \setminus \alpha$, ceea ce contrazice minimalitatea lui γ .

Pentru implicația „ \supseteq ”, presupunem că există $\delta \in \alpha$ cu $\delta \notin \gamma$. Cum $\delta, \gamma \in \beta$, avem că $\gamma \in \delta$ sau $\gamma = \delta$. Din tranzitivitatea lui α , rezultă $\gamma \in \alpha$, contrazicând faptul că $\gamma \in \beta \setminus \alpha$. \square

17. Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și $a \in \mathbb{R}$. Există două moduri de a exprima faptul că f este continuă în a :

- pentru orice $\varepsilon > 0$ există $\delta > 0$ astfel încât pentru orice x cu $|x - a| < \delta$, avem $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$;
- pentru orice șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ce are ca limită pe a , avem că șirul $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ are ca limită pe $f(a)$.

Folosind Axioma alegerii, arătați că ele sunt echivalente.

Observație: Se știe că echivalența nu rezultă fără Axioma alegerii, dar și că este strict mai slabă decât ea.

Soluție: Pentru „ \Rightarrow ”, fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un șir cu limita a . Vrem să arătăm că șirul $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ are ca limită pe $f(a)$. Fie $\varepsilon > 0$. Atunci există $\delta > 0$ astfel încât pentru orice x cu $|x - a| < \delta$, avem $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. Cum $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge la a , avem că există N astfel încât pentru orice $n \geq N$, $|x_n - a| < \delta$. Așadar, pentru orice $n \geq N$, $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$. Am arătat că $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ are ca limită pe $f(a)$.

Pentru „ \Leftarrow ”, presupunem prin absurd că există un $\varepsilon > 0$ astfel încât pentru orice $\delta > 0$ există x cu $|x - a| < \delta$ și $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$. Deci pentru orice $n \in \mathbb{N}$,

$$X_n := \left\{ x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \frac{1}{n+1} \text{ și } |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon \right\} \neq \emptyset.$$

Ca urmare, putem aplica Axioma alegerii pentru familia $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ și obținem un șir $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ astfel încât pentru orice $n \in \mathbb{N}$, $x_n \in X_n$, i.e. $|x_n - a| < \frac{1}{n+1}$ și $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon$. Așadar, limita lui $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este a , dar $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ nu converge la $f(a)$. Contradicție! \square

18. Fie X, Y mulțimi și $g : Y \rightarrow X$ surjectivă. Să se arate, folosind Axioma alegerii, că există $f : X \rightarrow Y$ cu $g \circ f = \text{id}_X$.

Soluție: Cum g este surjectivă, avem că pentru orice $x \in X$, $g^*(\{x\})$ este nevidă, deci, aplicând Axioma alegerii pentru familia $(g^*(\{x\}))_{x \in X}$, obținem că există o familie $a = (a_x)_{x \in X}$ astfel încât pentru orice $x \in X$, $a_x \in g^*(\{x\})$, deci $a_x \in Y$ și $g(a_x) = x$.

Definim $f : X \rightarrow Y$, punând, pentru orice $x \in X$, $f(x) := a_x$. (Altfel spus, $f = (X, Y, a)$.) Atunci, pentru orice $x \in X$, avem $g(f(x)) = g(a_x) = x$. Prin urmare, $g \circ f = \text{id}_X$. \square

19. Demonstrați că faptul că „pentru orice X, Y mulțimi și $g : Y \rightarrow X$ surjectivă, avem că există $f : X \rightarrow Y$ cu $g \circ f = \text{id}_X$ ” implică Axioma alegerii.

Soluție: Fie $(D_i)_{i \in I}$ o familie de mulțimi nevide, disjuncte două câte două. Vrem să arătăm că există $(d_i)_{i \in I}$ astfel încât pentru orice $i \in I$, $d_i \in D_i$.

Notăm

$$C := \bigcup_{i \in I} D_i.$$

Fie $g : C \rightarrow I$, definită punând, pentru orice $x \in C$, $g(x)$ ca fiind acel unic i cu $x \in D_i$. Cum g este surjectivă, există $f : I \rightarrow C$ cu $g \circ f = \text{id}_I$.

Pentru orice $i \in I$, punem $d_i := f(i)$ și atunci, cum $g(d_i) = g(f(i)) = i$, avem că $d_i \in D_i$. Așadar, familia $(d_i)_{i \in I}$ este cea căutată. \square

20. Demonstrați că faptul că „pentru orice X, Y mulțimi, există o injecție de la X la Y sau există o injecție de la Y la X ” implică Axioma alegerii. **Indiciu:** Folosiți ordinalul Hartogs.

Soluție: Fie A o mulțime. Atunci, fie există o injecție de la $h(A)$ la A , fie există o injecție de la A la $h(A)$. Primul caz contrazice definiția ordinalului Hartogs. Avem așadar că există o injecție $g : A \rightarrow h(A)$. Cum $(h(A), \in_{h(A)})$ este bine-ordonată, există o bună ordine pe imaginea lui g , imagine care este echipotentă cu A , deci există o bună ordine pe A .

Am arătat că orice mulțime este bine-ordonabilă, iar la curs am demonstrat că aceasta implică Axioma alegerii. \square

21. Fie α un ordinal. Arătați:

- (a) Pentru orice $x \in V_\alpha$, $x \notin x$.
- (b) Avem că $V_\alpha \in V_{\alpha^+} \setminus V_\alpha$. Prin urmare, $\text{rg}(V_\alpha) = \alpha$.
- (c) Pentru orice $\beta < \alpha$, $V_\beta \subsetneq V_\alpha$.

Soluție:

- (a) Firește, enunțul rezultă din Axioma regularității, dar este interesant de văzut că este adevărat și fără a o postula.

Demonstrăm prin inducție după α .

Dacă $\alpha = 0$, atunci, cum $V_\alpha = V_0 = \emptyset$, nu avem ce demonstra.

Presupunem că există β cu $\alpha = \beta^+$. Atunci $x \in V_\alpha = V_{\beta^+} = \mathcal{P}(V_\beta)$, deci $x \subseteq V_\beta$. Dacă am avea $x \in x$, atunci $x \in V_\beta$, iar din ipoteza de inducție rezultă $x \notin x$.

Presupunem acum că α este ordinal limită. Atunci există $\gamma < \alpha$ cu $x \in V_\gamma$ și, din ipoteza de inducție, rezultă $x \notin x$.

- (b) Avem că $V_\alpha \subseteq V_\alpha$, deci $V_\alpha \in \mathcal{P}(V_\alpha) = V_{\alpha^+}$, iar din primul punct avem că $V_\alpha \notin V_\alpha$.

- (c) Fie $\beta < \alpha$. Știm că $V_\beta \subseteq V_\alpha$, rămâne de arătat doar că incluziunea este strictă. Avem că $\beta^+ \leq \alpha$ (exercițiu!) și deci $V_{\beta^+} \subseteq V_\alpha$. Știm, din punctul anterior, că $V_\beta \in V_{\beta^+} \setminus V_\beta$, deci $V_\beta \in V_\alpha \setminus V_\beta$.

□

22. Fie α un ordinal. Arătați:

- (a) Avem că $\alpha \in V_{\alpha^+}$.
(b) Avem că $\alpha \notin V_\alpha$. Prin urmare, $\text{rg}(\alpha) = \alpha$.

Soluție:

- (a) Demonstrăm prin inducție completă după α . Cum $V_{\alpha^+} = \mathcal{P}(V_\alpha)$, trebuie să demonstrăm că $\alpha \subseteq V_\alpha$.
Fie $\beta \in \alpha$. Atunci β este un ordinal mai mic ca α , iar din ipoteza de inducție, avem $\beta \in V_{\beta^+}$. Cum $\beta < \alpha$, avem $\beta^+ \leq \alpha$ (exercițiu!), deci $V_{\beta^+} \subseteq V_\alpha$, așadar $\beta \in V_\alpha$.
(b) Demonstrăm prin inducție după α .
Dacă $\alpha = 0$, atunci $\alpha \notin \emptyset = V_0 = V_\alpha$.
Presupunem că există β cu $\alpha = \beta^+$. Presupunem prin absurd că $\alpha \in V_\alpha$, i.e. $\beta^+ \in V_{\beta^+} = \mathcal{P}(V_\beta)$, deci $\beta^+ \subseteq V_\beta$. Dar $\beta \in \beta^+$, deci $\beta \in V_\beta$, ceea ce contrazice ipoteza de inducție.
Presupunem acum că α este ordinal limită. Presupunem prin absurd că $\alpha \in V_\alpha$. Atunci există $\gamma < \alpha$ cu $\alpha \in V_\gamma$. Cum $\gamma \in \alpha$, există $\delta < \gamma$ cu $\gamma \in V_\delta \subseteq V_\gamma$, ceea ce, din nou, contrazice ipoteza de inducție.

□

23. Fie I o mulțime nevidă și A, B două submulțimi diferite ale sale. Arătați că există un ultrafiltru pe I care conține exact una dintre submulțimi.

Soluție: Avem $A \neq B$, deci $A \not\subseteq B$ sau $B \not\subseteq A$. Presupunem w.l.o.g. $A \not\subseteq B$, deci există $x \in A$ cu $x \notin B$.

Știm că $\{\{x\}\}$ este un ultrafiltru. Cum $\{x\} \subseteq A$, avem $A \in \{\{x\}\}$, iar cum $\{x\} \subseteq I \setminus B$, avem $I \setminus B \in \{\{x\}\}$, deci $B \notin \{\{x\}\}$. □

24. Fie I o mulțime nevidă, F un filtru pe I și $X \subseteq I$ cu $X \notin F$. Arătați că există un ultrafiltru pe I care include pe F și nu conține pe X (omite pe X).

Soluție: Cum $X \notin F$, $X \neq I$, deci $I \setminus X \neq \emptyset$.

Fie $G := F \cup \{I \setminus X\}$. Vom arăta că G are proprietatea intersecțiilor finite, de unde va rezulta că se poate prelungea la un ultrafiltru. Acel ultrafiltru va include pe F și, deoarece va conține pe $I \setminus X$, nu va putea conține pe X .

Fie $A \subseteq G$ finită nevidă și vrem $\bigcap A \neq \emptyset$. Dacă $A \subseteq F$, suntem OK. Dacă $A \not\subseteq F$, există $B \subseteq F$ cu $A = B \cup \{I \setminus X\}$. Dacă $B = \emptyset$, atunci $A = \{I \setminus X\}$ și din nou suntem OK. Dacă $B \neq \emptyset$, atunci $\bigcap B \in F$, și, presupunând prin absurd că $\bigcap A = (\bigcap B) \cap (I \setminus X) = \emptyset$, obținem $\bigcap B \subseteq X$, deci $X \in F$, ceea ce este o contradicție. □

2 Logica propozițională

1. Fie $\varphi, \psi, \chi \in E(Q)$. Arătați că avem:

- (a) $\psi \models \varphi \rightarrow \psi$;
- (b) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \chi$.

Soluție: Vom folosi în demonstrații următoarele: pentru orice $a \in 2$,

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow a &= a, & a \rightarrow 1 &= 1, \\ 0 \rightarrow a &= 1, & a \rightarrow 0 &= \neg a, \\ 1 \wedge a &= a, & 0 \wedge a &= 0. \end{aligned}$$

(a) Fie $e : Q \rightarrow 2$ cu $e^+(\psi) = 1$. Vrem să arătăm că $e^+(\varphi \rightarrow \psi) = 1$. Dar:

$$e^+(\varphi \rightarrow \psi) = e^+(\varphi) \rightarrow e^+(\psi) = e^+(\varphi) \rightarrow 1 = 1.$$

(b) Fie $e : Q \rightarrow 2$ o evaluare arbitrară. Trebuie să demonstrăm că

$$e^+(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) = e^+(\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi).$$

Observăm că

$$\begin{aligned} e^+(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) &= e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)), \\ e^+(\varphi \wedge \psi \rightarrow \chi) &= (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi), \end{aligned}$$

deci trebuie arătat că

$$e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi).$$

Avem cazurile:

i. $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= 0 \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = 1, \\ (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) &= (0 \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) = 0 \rightarrow e^+(\chi) = 1. \end{aligned}$$

ii. $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$\begin{aligned} e^+(\varphi) \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) &= 1 \rightarrow (e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi)) = e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi), \\ (e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) &= (1 \wedge e^+(\psi)) \rightarrow e^+(\chi) = e^+(\psi) \rightarrow e^+(\chi). \end{aligned}$$

□

2. Considerăm Q numărabilă, i.e. $Q = \{v_0, v_1, v_2, \dots\}$. Să se găsească câte un model pentru fiecare dintre formulele:

- (a) $v_0 \rightarrow v_2$;
- (b) $v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4$.

Soluție:

(a) Fie funcția $e : Q \rightarrow 2$, definită, pentru orice $x \in Q$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 1, & \text{dacă } x = v_2, \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$e^+(v_0 \rightarrow v_2) = e^+(v_0) \rightarrow e^+(v_2) = e(v_0) \rightarrow e(v_2) = 0 \rightarrow 1 = 1,$$

deci $e \models v_0 \rightarrow v_2$.

(b) Fie funcția $e : Q \rightarrow 2$, definită, pentru orice $x \in Q$, prin:

$$e(x) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } x = v_4, \\ 1, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci:

$$\begin{aligned} e^+(v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4) &= e^+(v_0) \wedge e^+(v_3) \wedge \neg e^+(v_4) \\ &= e(v_0) \wedge e(v_3) \wedge \neg e(v_4) \\ &= 1 \wedge 1 \wedge \neg 0 \\ &= 1 \wedge 1 \wedge 1 \\ &= 1, \end{aligned}$$

deci $e \models v_0 \wedge v_3 \wedge \neg v_4$.

□

3. Să se demonstreze că, pentru orice formulă φ , $\neg\varphi$ este nesatisfiabilă dacă și numai dacă φ este tautologie.

Soluție:

Avem:

$$\begin{aligned} \neg\varphi \text{ e nesatisfiabilă} &\iff \neg\varphi \text{ nu e satisfiabilă} \\ &\iff \text{nu avem că } \neg\varphi \text{ e satisfiabilă} \\ &\iff \text{nu avem că există } e : Q \rightarrow 2 \text{ cu } e^+(\neg\varphi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\neg\varphi) \neq 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\neg\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, \neg e^+(\varphi) = 0 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\varphi) = 1 \\ &\iff \varphi \text{ este tautologie.} \end{aligned}$$

□

4. Confirmați sau infirmați:

- (a) pentru orice $\varphi, \psi \in E(Q)$, $\models \varphi \wedge \psi$ dacă și numai dacă $\models \varphi$ și $\models \psi$;
(b) pentru orice $\varphi, \psi \in E(Q)$, $\models \varphi \vee \psi$ dacă și numai dacă $\models \varphi$ sau $\models \psi$.

Soluție:

- (a) Este adevărat. Fie $\varphi, \psi \in E(Q)$. Avem:

$$\begin{aligned} \models \varphi \wedge \psi &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\varphi \wedge \psi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\varphi) \wedge e^+(\psi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\varphi) = 1 \text{ și } e^+(\psi) = 1 \\ &\iff \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\varphi) = 1 \text{ și} \\ &\quad \text{pentru orice } e : Q \rightarrow 2, e^+(\psi) = 1 \\ &\iff \models \varphi \text{ și } \models \psi. \end{aligned}$$

- (b) Nu este adevărat! Fie $v \in Q$ arbitrar. Vom lua $\varphi := v$ și $\psi := \neg v$.

Luăm $e_0 : Q \rightarrow 2$ ca fiind funcția constantă 0. Atunci $e_0^+(\varphi) = e_0^+(\psi) = e_0(v) = 0$. Deci $e_0 \not\models \varphi$. Prin urmare, $\not\models \varphi$.

Luăm $e_1 : Q \rightarrow 2$ ca fiind funcția constantă 1. Atunci $e_1^+(\psi) = e_1^+(\neg v) = \neg e_1^+(v) = \neg e_1(v) = \neg 1 = 0$. Deci $e_1 \not\models \psi$. Prin urmare, $\not\models \psi$.

Fie acum $e : Q \rightarrow 2$ arbitrară. Atunci

$$e^+(\varphi \vee \psi) = e^+(v \vee \neg v) = e^+(v) \vee e^+(\neg v) = e^+(v) \vee \neg e^+(v) = e(v) \vee \neg e(v) = 1,$$

deci $e \models \varphi \vee \psi$. Prin urmare, avem că $\models \varphi \vee \psi$.

□

5. Considerăm Q numărabilă, i.e. $Q = \{v_0, v_1, v_2, \dots\}$. Aflați mulțimea modelelor pentru fiecare dintre mulțimile de formule:

- (a) $\Gamma = \{v_n \rightarrow v_{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\}$;
- (b) $\Gamma = \{v_0\} \cup \{v_n \rightarrow v_{n+1} \mid 0 \leq n \leq 7\}$.

Soluție:

- (a) Fie $e : Q \rightarrow 2$ și $n \in \mathbb{N}$. Atunci $e \models v_n \rightarrow v_{n+1}$ dacă și numai dacă $e^+(v_n \rightarrow v_{n+1}) = 1$ dacă și numai dacă $e^+(v_n) \rightarrow e^+(v_{n+1}) = 1$ dacă și numai dacă $e(v_n) \rightarrow e(v_{n+1}) = 1$ dacă și numai dacă $e(v_n) \leq e(v_{n+1})$. Prin urmare,

$$\begin{aligned} e \models \Gamma & \quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, e \models v_n \rightarrow v_{n+1} \\ & \quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \\ & \quad \text{dacă și numai dacă} \quad (\text{pentru orice } v \in Q, e(v) = 0) \\ & \quad \text{sau (există } k \in \mathbb{N} \text{ astfel încât pentru orice } i < k, e(v_i) = 0 \text{ și} \\ & \quad \text{pentru orice } i \geq k, e(v_i) = 1). \end{aligned}$$

Definim $e^0 : Q \rightarrow 2$ ca fiind funcția constantă 0. Definim și, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, $e_k : Q \rightarrow 2$, punând, pentru orice $i \in \mathbb{N}$,

$$e_k(v_i) := \begin{cases} 0, & \text{dacă } i < k, \\ 1, & \text{dacă } i \geq k. \end{cases}$$

Atunci

$$Mod(\Gamma) = \{e_k \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{e^0\}.$$

- (b) Fie $e : Q \rightarrow 2$. Atunci

$$\begin{aligned} e \models \Gamma & \quad \text{dacă și numai dacă} \quad e \models v_0 \text{ și, pentru orice } n \in \{0, 1, \dots, 7\}, e \models v_n \rightarrow v_{n+1} \\ & \quad \text{dacă și numai dacă} \quad e(v_0) = 1 \text{ și, pentru orice } n \in \{0, 1, \dots, 7\}, e(v_n) \leq e(v_{n+1}) \\ & \quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{pentru orice } n \in \{0, 1, \dots, 8\}, e(v_n) = 1. \end{aligned}$$

Așadar,

$$Mod(\Gamma) = \{e : Q \rightarrow 2 \mid \text{pentru orice } n \in \{0, 1, \dots, 8\}, e(v_n) = 1\}.$$

□

6. Fie $f : Q \rightarrow 2$. Găsiți $\Gamma \subseteq E(Q)$ astfel încât $Mod(\Gamma) = \{f\}$.

Soluție: Luăm $\Gamma := Q^f = \{v^f \mid v \in Q\}$.

Fie $e : Q \rightarrow 2$. Avem $e \in Mod(\Gamma)$ dacă și numai dacă pentru orice $v \in Q$, $e \models v^f$ dacă și numai dacă pentru orice $v \in Q$, $e^+(v^f) = 1$. Vom arăta că ultima afirmație este echivalentă cu $e = f$.

Presupunem că pentru orice $v \in Q$, $e^+(v^f) = 1$. Fie $v \in Q$. Vrem $e(v) = f(v)$. Dacă $f(v) = 1$, atunci $v^f = v$ și deci $e(v) = e^+(v) = e^+(v^f) = 1 = f(v)$. Dacă $f(v) = 0$, atunci $v^f = \neg v$ și deci

$$e(v) = e^+(v) = \neg \neg e^+(v) = \neg e^+(\neg v) = \neg e^+(v^f) = \neg 1 = 0 = f(v).$$

Invers, presupunem că $e = f$ și vrem să arătăm că pentru orice $v \in Q$, $e^+(v^f) = 1$. Fie $v \in Q$. Atunci $e^+(v^f) = f^+(v^f) = 1$. □

7. Considerăm Q numărabilă, i.e. $Q = \{v_0, v_1, v_2, \dots\}$. Să se arate că mulțimea modelelor unei mulțimi satisfiabile și finite de formule este infinită.

Soluție: Fie Γ o mulțime de formule ca în enunț. Dat fiind că Γ este satisfiabilă, admite un model și fie acesta e . Pe de altă parte, dat fiind că Γ este finită, există un $n \in \mathbb{N}$ cu proprietatea că $\bigcup_{\varphi \in \Gamma} \text{Var}(\varphi) \subseteq \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$.

Fie, atunci, pentru orice $k \in \mathbb{N}$, câte o funcție $e_k : Q \rightarrow 2$, definită, pentru orice $x \in Q$, prin:

$$e_k(x) := \begin{cases} e(x), & \text{dacă } x \in \{v_0, \dots, v_n\} \\ 1, & \text{dacă } x \in \{v_{n+1}, \dots, v_{n+k}\} \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Atunci, pentru $k \neq l$ avem $e_k \neq e_l$. Prin urmare, $\{e_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ este o mulțime numărabilă. Pentru orice $k \in \mathbb{N}$ și $\varphi \in \Gamma$, avem că $e_k|_{\text{Var}(\varphi)} = e|_{\text{Var}(\varphi)}$, deci $e_k^+(\varphi) = e^+(\varphi) = 1$. Așadar, $e_k \models \varphi$.

Am obținut astfel că $\{e_k \mid k \in \mathbb{N}\} \subseteq \text{Mod}(\Gamma)$. Așadar, $\text{Mod}(\Gamma)$ este infinită. \square

8. Considerăm Q numărabilă, i.e. $Q = \{v_0, v_1, v_2, \dots\}$. Găsiți o mulțime (infinită) de formule cu proprietatea că nu există o mulțime finită de formule care să aibă exact aceleași modele.

Soluție: Considerăm $\Gamma := Q$. Clar, Γ este infinită. Fie $f : Q \rightarrow 2$ funcția constantă 1. Avem că $\text{Mod}(\Gamma) = \{f\}$.

Fie acum Δ o mulțime finită de formule. Avem două cazuri:

- (a) Δ nu este satisfiabilă. Atunci $\text{Mod}(\Delta) = \emptyset$.
- (b) Δ este satisfiabilă. Atunci aplicăm exercițiul precedent pentru a concluziona că $\text{Mod}(\Delta)$ este infinită.

În ambele cazuri, obținem că $\text{Mod}(\Delta) \neq \text{Mod}(\Gamma)$. \square

9. Fie $\Gamma \subseteq E(Q)$ și $\varphi, \psi \in E(Q)$. Să se arate că:

- (a) $\{\psi, \neg\psi\} \vdash \varphi$;
- (b) $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$;
- (c) $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi$ și $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi$ implică $\Gamma \vdash \varphi$;
- (d) $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$;
- (e) $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$.

Soluție:

- (a) Avem:

- | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------------|
| (1) | | $\vdash \neg\psi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi)$ | (A1) |
| (2) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$ | Teorema deducției |
| (3) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ | (A3) |
| (4) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash \psi \rightarrow \varphi$ | (MP): (2), (3) |
| (5) | $\{\psi, \neg\psi\}$ | $\vdash \varphi$ | Teorema deducției. |

- (b) Avem:

- | | | | |
|-----|----------------------|--|--------------------|
| (1) | $\{\psi, \neg\psi\}$ | $\vdash \varphi$ | Ex. 9a |
| (2) | $\{\neg\psi\}$ | $\vdash \psi \rightarrow \varphi$ | Teorema deducției |
| (3) | | $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ | Teorema deducției. |

- (c) Avem:

- | | | | |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------------|
| (1) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \perp)$ | Ex. 9b |
| (2) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\psi$ | Ipoteză |
| (3) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \psi \rightarrow \perp$ | (MP): (1), (2) |
| (4) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \psi$ | Ipoteză |
| (5) | $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ | $\vdash \perp$ | (MP): (3), (4) |
| (6) | Γ | $\vdash \varphi$ | Metoda reducerii la absurd. |

(d) Avem:

- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|----------------------------|
| (1) | $\{\neg\varphi, \neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \perp$ | Ex. 9a |
| (2) | $\{\neg\neg\varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | Metoda reducerii la absurd |
| (3) | | $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$ | Teorema deducției. |

(e) Avem:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| (1) | $\vdash \neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi$ | Ex. 9d |
| (2) | $\vdash (\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi)$ | (A3) |
| (3) | $\vdash \varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$ | (MP): (1), (2). |

□

10. Să se arate că, pentru orice $\varphi \in E(Q)$,

$$\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi.$$

Soluție: Avem:

- | | | | |
|-----|--|--|------------------------|
| (1) | $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\varphi \rightarrow \varphi$ | |
| (2) | $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \neg\varphi$ | |
| (3) | $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | (MP): (1), (2) |
| (4) | $\{\neg\varphi \rightarrow \varphi\}$ | $\vdash \varphi$ | Ex. 9c pentru (1), (3) |
| (5) | | $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$ | Teorema deducției. |

□

11. Să se arate că, pentru orice $\varphi, \psi \in E(Q)$,

$$\vdash \psi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \varphi)).$$

Soluție: Avem:

- | | | | |
|-----|---|--|------------------------|
| (1) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)\}$ | $\vdash \psi$ | |
| (2) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)\}$ | $\vdash \neg\varphi$ | |
| (3) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)\}$ | $\vdash \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)$ | |
| (4) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)\}$ | $\vdash \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ | Ex. 9d |
| (5) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)\}$ | $\vdash \psi \rightarrow \varphi$ | (MP): (3), (4) |
| (6) | $\{\psi, \neg\varphi, \neg\neg(\psi \rightarrow \varphi)\}$ | $\vdash \varphi$ | (MP): (1), (5) |
| (7) | $\{\psi, \neg\varphi\}$ | $\vdash \neg(\psi \rightarrow \varphi)$ | Ex. 9c pentru (2), (6) |
| (8) | $\{\psi\}$ | $\vdash \neg\varphi \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \varphi)$ | Teorema deducției |
| (9) | | $\vdash \psi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \varphi))$ | Teorema deducției. |

□

12. (“Reciproca” Axiomei 3)

Să se arate că, pentru orice $\varphi, \psi \in E(Q)$,

$$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi).$$

Soluție: Avem:

(1)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi \rightarrow \psi$	
(2)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\psi$	
(3)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\neg\varphi$	
(4)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	Ex. 9d
(5)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \varphi$	(MP): (3), (4)
(6)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi, \neg\neg\varphi\}$	$\vdash \psi$	(MP): (1), (5)
(7)	$\{\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi\}$	$\vdash \neg\varphi$	Ex. 9c pentru (2), (6)
(8)	$\{\varphi \rightarrow \psi\}$	$\vdash \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$	Teorema deducției
(9)		$\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$	Teorema deducției.

□

3 Logica de ordinul I

1. Considerăm σ_{ar} și \mathcal{N} așa cum au fost ele definite în curs. Fie $x, y \in V$ cu $x \neq y$.

- (a) Fie $t := \dot{\times}(\dot{S}x, \dot{S}\dot{S}y)$. (Îl putem scrie pe t și ca $\dot{S}x \dot{\times} \dot{S}\dot{S}y$.) Să se calculeze $t_v^{\mathcal{N}}$, unde $v : V \rightarrow \mathbb{N}$ verifică $v(x) = 3$ și $v(y) = 7$.
- (b) Fie $\varphi := \dot{<}(x, \dot{S}y) \rightarrow (\dot{<}(x, y) \vee x = y)$. (Îl putem scrie pe φ și ca $x \dot{<} \dot{S}y \rightarrow (x \dot{<} y \vee x = y)$.) Să se arate că, pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{N}$, $\|\varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1$.

Soluție:

(a) Pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned}
 t_v^{\mathcal{N}} &= N_{\dot{\times}}((\dot{S}x)_v^{\mathcal{N}}, (\dot{S}\dot{S}y)_v^{\mathcal{N}}) = (\dot{S}x)_v^{\mathcal{N}} \cdot (\dot{S}\dot{S}y)_v^{\mathcal{N}} \\
 &= N_{\dot{S}}(x_v^{\mathcal{N}}) \cdot N_{\dot{S}}((\dot{S}y)_v^{\mathcal{N}}) = S(v(x)) \cdot S(N_{\dot{S}}(y_v^{\mathcal{N}})) \\
 &= S(v(x)) \cdot S(S(v(y))).
 \end{aligned}$$

Prin urmare, dacă $v(x) = 3$ și $v(y) = 7$, atunci

$$t_v^{\mathcal{N}} = S(3) \cdot S(S(7)) = 4 \cdot 9 = 36.$$

(b) Pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{N}$, avem

$$\begin{aligned}
 \|\varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1 &\Leftrightarrow \|\dot{<}(x, \dot{S}y)\|_v^{\mathcal{N}} = 0 \text{ sau } \|\dot{<}(x, y) \vee x = y\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \\
 &\Leftrightarrow \text{nu avem } N_{\dot{<}}(v(x), S(v(y))) \text{ sau avem} \\
 &\quad \|\dot{<}(x, y)\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \text{ sau avem } \|x = y\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \\
 &\Leftrightarrow \text{nu avem } v(x) < S(v(y)) \text{ sau avem } v(x) < v(y) \\
 &\quad \text{sau avem } v(x) = v(y) \\
 &\Leftrightarrow v(x) \geq S(v(y)) \text{ sau } v(x) < v(y) \text{ sau } v(x) = v(y) \\
 &\Leftrightarrow v(x) \geq v(y) + 1 \text{ sau } v(x) < v(y) \text{ sau } v(x) = v(y).
 \end{aligned}$$

Prin urmare, pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{N}$, $\|\varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1$.

De obicei, scriem:

$$\begin{aligned}
 \|\varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1 &\Leftrightarrow \|\dot{<}(x, \dot{S}y)\|_v^{\mathcal{N}} = 0 \text{ sau } \|\dot{<}(x, y) \vee x = y\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \\
 &\Leftrightarrow v(x) \geq S(v(y)) \text{ sau } v(x) < v(y) \text{ sau } v(x) = v(y) \\
 &\Leftrightarrow v(x) \geq v(y) + 1 \text{ sau } v(x) < v(y) \text{ sau } v(x) = v(y).
 \end{aligned}$$

□

2. Considerăm σ_{ar} și \mathcal{N} așa cum au fost ele definite în curs. Fie formula $\varphi := \forall x_4(x_3 \dot{<} x_4 \vee x_3 = x_4)$. Să se caracterizeze acele $v : V \rightarrow \mathbb{N}$ ce au proprietatea că $\|\varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1$.

Soluție: Fie $v : V \rightarrow \mathbb{N}$. Avem:

$$\begin{aligned}
\|\varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1 &\Leftrightarrow \|\forall x_4(x_3 \dot{<} x_4 \vee x_3 = x_4)\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in \mathbb{N}, \|x_3 \dot{<} x_4 \vee x_3 = x_4\|_{v_{x_4 \leftarrow a}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in \mathbb{N}, \|x_3 \dot{<} x_4\|_{v_{x_4 \leftarrow a}}^{\mathcal{N}} \vee \|x_3 = x_4\|_{v_{x_4 \leftarrow a}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in \mathbb{N}, \|x_3 \dot{<} x_4\|_{v_{x_4 \leftarrow a}}^{\mathcal{N}} = 1 \text{ sau } \|x_3 = x_4\|_{v_{x_4 \leftarrow a}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in \mathbb{N}, v_{x_4 \leftarrow a}(x_3) < v_{x_4 \leftarrow a}(x_4) \text{ sau } v_{x_4 \leftarrow a}(x_3) = v_{x_4 \leftarrow a}(x_4) \\
&\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in \mathbb{N}, v_{x_4 \leftarrow a}(x_3) \leq v_{x_4 \leftarrow a}(x_4) \\
&\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in \mathbb{N}, v(x_3) \leq a \\
&\Leftrightarrow v(x_3) = 0.
\end{aligned}$$

□

3. Fie σ o semnătură. Să se arate că pentru orice σ -formulă φ și orice variabile x, y cu $x \neq y$ și $FV(\varphi) \subseteq \{x, y\}$, avem $\exists y \forall x \varphi \models \forall x \exists y \varphi$. (Folosirea semnului \models are sens deoarece $\exists y \forall x \varphi$ și $\forall x \exists y \varphi$ sunt enunțuri.)

Soluție: Fie \mathcal{A} o σ -structură cu universul A . Trebuie să arătăm că dacă $\mathcal{A} \models \exists y \forall x \varphi$, atunci $\mathcal{A} \models \forall x \exists y \varphi$.

Avem că $\mathcal{A} \models \exists y \forall x \varphi$ dacă și numai dacă există $v : V \rightarrow A$ astfel încât $\|\exists y \forall x \varphi\|_v^{\mathcal{A}} = 1$ dacă și numai dacă există $v : V \rightarrow A$ astfel încât există $b \in A$ astfel încât pentru orice $a \in A$ avem $\|\varphi\|_{(v_{y \leftarrow b})_{x \leftarrow a}}^{\mathcal{A}} = 1$, i.e., folosind ipoteza că $x \neq y$, $\|\varphi\|_{v_{x \leftarrow a, y \leftarrow b}}^{\mathcal{A}} = 1$ (*).

Pe de altă parte, avem că $\mathcal{A} \models \forall x \exists y \varphi$ dacă și numai dacă există $v : V \rightarrow A$ astfel încât $\|\forall x \exists y \varphi\|_v^{\mathcal{A}} = 1$ dacă și numai dacă există $v : V \rightarrow A$ astfel încât pentru orice $c \in A$ există $d \in A$ astfel încât $\|\varphi\|_{(v_{x \leftarrow c})_{y \leftarrow d}}^{\mathcal{A}} = 1$, i.e., folosind ipoteza că $x \neq y$, $\|\varphi\|_{v_{x \leftarrow c, y \leftarrow d}}^{\mathcal{A}} = 1$ (**).

Știm, deci, (*) și vrem să arătăm (**).

Luăm în continuare în (**) același v ca în (*).

Fie acum $c \in A$. Vrem $d \in A$ astfel încât $\|\varphi\|_{v_{x \leftarrow c, y \leftarrow d}}^{\mathcal{A}} = 1$.

Luăm d să fie b -ul din (*). Atunci, pentru orice $a \in A$ avem $\|\varphi\|_{v_{x \leftarrow a, y \leftarrow d}}^{\mathcal{A}} = 1$. În particular, luând $a := c$, obținem $\|\varphi\|_{v_{x \leftarrow c, y \leftarrow d}}^{\mathcal{A}} = 1$, ceea ce ne trebuia. □

4. Fie x, y variabile cu $x \neq y$. Să se dea exemple de semnătură σ și de formulă φ cu $FV(\varphi) \subseteq \{x, y\}$ astfel încât $\forall x \exists y \varphi \not\models \exists y \forall x \varphi$. (Din nou, folosirea semnului \models are sens deoarece $\forall x \exists y \varphi$ și $\exists y \forall x \varphi$ sunt enunțuri.)

Soluție: Vom considera σ_{ar} și \mathcal{N} așa cum au fost ele definite în curs. Fie $v : V \rightarrow \mathbb{N}$ arbitrară (de pildă, punem, pentru orice $z \in V$, $v(z) := 7$).

Luăm $\sigma := \sigma_{ar}$ și $\varphi := x \dot{<} y$. Atunci

$$\begin{aligned}
\|\forall x \exists y \varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1 &\quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N}, \text{ avem } \|\exists y \varphi\|_{v_{x \leftarrow n}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ astfel încât } \|\varphi\|_{v_{x \leftarrow n, y \leftarrow m}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ există } m \in \mathbb{N} \text{ astfel încât } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este adevărat – se ia, de pildă, $m := n + 1$. Așadar,

$$\mathcal{N} \models \forall x \exists y \varphi.$$

Pe de altă parte,

$$\begin{aligned}
\|\exists y \forall x \varphi\|_v^{\mathcal{N}} = 1 &\quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ astfel încât } \|\forall x \varphi\|_{v_{y \leftarrow m}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ astfel încât pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } \|\varphi\|_{v_{x \leftarrow n, y \leftarrow m}}^{\mathcal{N}} = 1 \\
&\quad \text{dacă și numai dacă} \quad \text{există } m \in \mathbb{N} \text{ astfel încât pentru orice } n \in \mathbb{N} \text{ avem } n < m,
\end{aligned}$$

ceea ce este fals. Așadar,

$$\mathcal{N} \not\models \exists y \forall x \varphi.$$

Am demonstrat că $\forall x \exists y \varphi \not\models \exists y \forall x \varphi$. □

5. Fie σ o semnătură, $\varphi, \psi \in F_\sigma$ și $x \in V \setminus FV(\varphi)$. Fie \mathcal{A} o σ -structură cu universul A și $v : V \rightarrow A$. Atunci avem

$$\|\forall x(\varphi \wedge \psi)\|_v^{\mathcal{A}} = \|\varphi \wedge \forall x \psi\|_v^{\mathcal{A}}.$$

Soluție:

Avem:

$$\begin{aligned} \|\forall x(\varphi \wedge \psi)\|_v^{\mathcal{A}} = 1 &\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in A, \|\varphi \wedge \psi\|_{v_{x \leftarrow a}}^{\mathcal{A}} = 1 \\ &\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in A, \|\varphi\|_{v_{x \leftarrow a}}^{\mathcal{A}} = 1 \text{ și } \|\psi\|_{v_{x \leftarrow a}}^{\mathcal{A}} = 1 \\ &\Leftrightarrow \text{pentru orice } a \in A, \|\varphi\|_v^{\mathcal{A}} = 1 \text{ și } \|\psi\|_{v_{x \leftarrow a}}^{\mathcal{A}} = 1 \\ &\quad (\text{aplicând Lema de coincidență}) \\ &\Leftrightarrow \|\varphi\|_v^{\mathcal{A}} = 1 \text{ și pentru orice } a \in A, \|\psi\|_{v_{x \leftarrow a}}^{\mathcal{A}} = 1 \\ &\Leftrightarrow \|\varphi\|_v^{\mathcal{A}} = 1 \text{ și } \|\forall x \psi\|_v^{\mathcal{A}} = 1 \\ &\Leftrightarrow \|\varphi \wedge \forall x \psi\|_v^{\mathcal{A}} = 1. \end{aligned}$$

□

6. Considerăm σ_{ar} și \mathcal{N} așa cum au fost ele definite în curs. Să se dea exemplu de σ_{ar} -formule $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ astfel încât pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{N}$,

- (a) $\|\varphi_1\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \Leftrightarrow v(x_0)$ este par;
- (b) $\|\varphi_2\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \Leftrightarrow v(x_0)$ este prim;
- (c) $\|\varphi_3\|_v^{\mathcal{N}} = 1 \Leftrightarrow v(x_0)$ este putere a lui 2 cu exponent strict pozitiv.

Soluție:

- (a) Luăm

$$\varphi_1 := \exists x_1 (x_1 \dot{+} x_1 = x_0).$$

- (b) Luăm

$$\varphi_2 := \dot{S}\dot{0} \dot{<} x_0 \wedge \forall x_1 ((x_1 \dot{<} x_0 \wedge \exists x_2 (x_1 \dot{\times} x_2 = x_0)) \rightarrow x_1 = \dot{S}\dot{0}).$$

- (c) Luăm

$$\varphi_3 := \dot{S}\dot{0} \dot{<} x_0 \wedge \forall x_1 ((\dot{S}\dot{0} \dot{<} x_1 \wedge \exists x_2 (x_1 \dot{\times} x_2 = x_0)) \rightarrow \exists x_2 (x_1 = x_2 \dot{+} x_2)).$$

□

7. Considerăm semnătura σ_r ce conține două simboluri de operație de aritate 2, notate cu $\dot{+}$ și $\dot{\times}$.

- (a) Considerăm σ_r -structura \mathcal{R} cu universul \mathbb{R} , unde cele două simboluri sunt instanțiate cu operațiile uzuale pe numerele reale $+$, respectiv \cdot . Să se dea exemplu de σ_r -formulă ψ astfel încât pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\|\psi\|_v^{\mathcal{R}} = 1 \Leftrightarrow v(x_0) \leq v(x_1).$$

- (b) (Exercițiu suplimentar) Considerăm σ_r -structura \mathcal{Z} cu universul \mathbb{Z} , unde cele două simboluri sunt instanțiate cu operațiile uzuale pe numerele întregi $+$, respectiv \cdot . Să se dea exemplu de σ_r -formulă χ astfel încât pentru orice $v : V \rightarrow \mathbb{Z}$,

$$\|\chi\|_v^{\mathcal{Z}} = 1 \Leftrightarrow v(x_0) \leq v(x_1).$$

Soluție:

(a) Luăm

$$\psi := \exists x_2(x_1 = x_0 + x_2 \wedge \exists x_3(x_2 = x_3 \times x_3)).$$

(b) Ne bazăm pe rezultatul lui J. L. Lagrange (1770), care spune că orice număr natural se scrie ca o sumă de patru pătrate. Așadar, luăm (cu parantezările de rigoare)

$$\chi := \exists x_2(x_1 = x_0 + x_2 \wedge \exists x_3 \exists x_4 \exists x_5 \exists x_6(x_2 = x_3 \times x_3 + x_4 \times x_4 + x_5 \times x_5 + x_6 \times x_6)).$$

□

8. Considerăm signatura σ ce conține un singur simbol de operație, $+$, de aritate 2. Să se găsească un σ -enunț φ astfel încât $(\mathbb{Z}, +) \models \varphi$, dar $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, +) \not\models \varphi$.

Soluție:

Prima soluție: se ia φ ca fiind

$$\forall x_0 \forall x_1 ((\neg \exists x_2(x_0 = x_2 + x_2) \wedge \neg \exists x_2(x_1 = x_2 + x_2)) \rightarrow \exists x_2(x_0 + x_1 = x_2 + x_2)),$$

ce exprimă faptul că suma a două elemente „nepare” este pară – în \mathbb{Z} , avem într-adevăr regula „impar + impar = par”, dar în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ avem contraexemplul $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$.

A doua soluție: se ia φ ca fiind

$$\exists x_1 \forall x_0 (\exists x_2(x_0 = x_2 + x_2) \vee \exists x_2(x_0 = x_2 + x_2 + x_1)),$$

ce este adevărată în \mathbb{Z} , luând valoarea lui x_1 să fie 1 (orice număr este ori de forma $2k$, ori de forma $2k + 1$), dar nu este adevărat în $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, unde relația de congruență indusă de elementele pare are patru clase, și nu două. □

9. Considerăm signatura σ ce conține un singur simbol de operație, \cdot , de aritate 2. Fie $\mathcal{G} = (G, \cdot^{\mathcal{G}})$ un grup finit. Să se determine un enunț $\varphi_{\mathcal{G}}$ astfel încât pentru orice grup $\mathcal{H} = (H, \cdot^{\mathcal{H}})$ avem că $\mathcal{H} \models \varphi_{\mathcal{G}}$ dacă și numai dacă \mathcal{H} este izomorf cu \mathcal{G} .

Soluție: Dat fiind că G este mulțime finită, există $n \in \mathbb{N}$ și $h : n^+ \rightarrow G$ o bijecție. Luăm enunțul $\varphi_{\mathcal{G}}$ ca fiind

$$\exists x_0 \dots \exists x_n \left(\bigwedge_{\substack{i, j \in n^+ \\ i \neq j}} \neg(x_i = x_j) \wedge \forall x_{n+} \left(\bigvee_{i \in n^+} z = x_i \right) \wedge \bigwedge_{i, j \in n^+} x_i \cdot x_j = x_{h^{-1}(h(i) \cdot^{\mathcal{G}} h(j))} \right),$$

unde primii doi termeni ai conjuncției din paranteză exprimă faptul că x_0, \dots, x_n sunt exact elementele potențialei structuri, iar ultimul termen codifică tabla grupului \mathcal{G} . □

10. Considerăm signatura σ ce conține un singur simbol de relație, $<$, de aritate 2. Fie Γ o mulțime de enunțuri ce conține axiomele de ordine strictă, totală și ce admite măcar un model infinit. Să se arate că există un model \mathcal{A} pentru Γ în care, mai mult, $(\mathbb{Q}, <)$ se scufundă, i.e. există $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathcal{A}$ (necesar injectivă) cu proprietatea că pentru orice $q, r \in \mathbb{Q}$, $q < r$ dacă și numai dacă $f(q) <^{\mathcal{A}} f(r)$.

Soluție: Notăm cu σ' signatura ce extinde σ prin adăugarea unei familii de constante $\{c_q\}_{q \in \mathbb{Q}}$, câte una corespunzătoare fiecărui număr rațional. Mai departe, notăm cu Γ' mulțimea Γ la care adăugăm toate enunțurile de forma $c_q < c_r$, cu $q < r$. Fie \mathcal{B} un model infinit pentru Γ .

Arătăm că Γ' este finit satisfiabilă, deci satisfiabilă. Fie Δ o submulțime finită a lui Γ' . Există $n \in \mathbb{N}^*$ și $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{Q}$ astfel încât doar constante dintre c_{q_1}, \dots, c_{q_n} apar în Δ . Fără a restrânge generalitatea, considerăm $q_1 < \dots < q_n$. Structura \mathcal{B} fiind infinită, admite o secvență $b_1 \dot{<}^{\mathcal{B}} \dots \dot{<}^{\mathcal{B}} b_n$. Construim o σ' -expansiune \mathcal{B}_Δ a lui \mathcal{B} în felul următor: pentru orice $i \in \{1, \dots, n\}$, punem $c_{q_i}^{\mathcal{B}} := b_i$, iar pentru orice $q \notin \{q_1, \dots, q_n\}$, punem $c_q^{\mathcal{B}} := b_1$ (o valoare arbitrară). Atunci \mathcal{B}_Δ va fi model pentru Δ .

Fie \mathcal{C} un model pentru Γ' . Notăm cu \mathcal{A} σ -redusa lui \mathcal{C} . Atunci \mathcal{A} este modelul căutat pentru Γ – scufundarea f va fi dată, pentru orice $q \in \mathbb{Q}$, de

$$f(q) := c_q^{\mathcal{C}}.$$

□