## Examen<sup>1</sup> la Geometrie I, seria 11, 31.01.2021

Nume și prenume: BOTOSAN ILIE ALEXANDRU

Grupa: 111

## I. Decideți dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false, justificând pe scurt alegerea:

- 1. Dacă hiperbola  $\mathcal{H}$  are ecuația  $\mathcal{H}: \frac{x^2}{64} \frac{y^2}{36} = 1$ , atunci punctul P = (10,0) este focar al lui  $\mathcal{H}$ . (0,7p)
- **2.** Dreptele din plan  $d_1: 2x y \alpha = 0$  și  $d_2: -4x + 2y + 5 = 0$  sunt paralele pentru orice  $\alpha \in \mathbb{R}$ . (0,7p)
- 3. Dacă A = (1, -1), B = (4, -3) și C = (-5, 3), atunci triunghiul ABC este degenerat. (0,7p)
- **4.** Dacă în spațiul real  $\mathbb{R}^3$  avem  $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{7} = \frac{z}{1}$  și  $\pi = \{(1+t-s, 2t+s, -1+s) \mid t, s \in \mathbb{R}\}$ , atunci  $d \parallel \pi$ . (0,7p)
- 5. Dacă o conică Γ are două centre A şi B distincte, atunci orice punct de pe dreapta AB este centru pentru Γ. (0,7p)
   II. Redactați rezolvările complete²:
- 1. În planul  $\mathbb{R}^2$ , fie dreapta d: x+3y-2=0 și funcția  $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ , f(x,y)=(3x-2,3y+2).
- a) Arătați că f este o omotetie și calculați centrul și raportul ei.
- b) Aflați ecuația dreptei d' = f(d) și calculați distanța de la d la d'. (0,75p)
- c) Găsiți ecuația unei conice nedegenerate care este tangentă la d și d'. (0,5p)
- **2.** În planul euclidian  $\mathbb{R}^2$ , fie conica

$$\Gamma: x^2 + 4xy + y^2 + 4x + 8y + 4 = 0$$

- a) Aflați natura conicei Γ. Precizați dacă este nedegenerată și dacă are centru unic. (0,5p)
- b) Aduceți  $\Gamma$  la o formă canonică și precizați reperul ortonormat pozitiv orientat în care are această formă. (1p)
- 3. În planul euclidian  $\mathbb{R}^2$ , fie cercurile neconcentrice

$$C_1: f_1(x,y) = x^2 + y^2 + a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$
  
 $C_2: f_2(x,y) = x^2 + y^2 + a_2x + b_2y + c_2 = 0$ 

și d axa lor radicală.

Considerăm mulțimea de conice

$$\mathcal{F} = \{ \Gamma_{\alpha_1, \alpha_2} : \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 = 0 \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}, \ \alpha_1^2 + \alpha_2^2 > 0 \}.$$

a) Demonstrați că  $d \in \mathcal{F}$  și este singura dreaptă din  $\mathcal{F}$ .

 $(0,\!25\mathrm{p})$ 

b) Demonstrați că cercurile din  $\mathcal{F}$ , diferite de  $\mathcal{C}_1$ , au axa radicală cu  $\mathcal{C}_1$  dreapta d.

(0.75p)

(0.75p)

- c) Demonstrați că dacă  $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 = \{A, B\}$ , atunci cercurile din  $\mathcal{F}$  sunt exact cercurile ce trec prin punctele A și B. (0,25p)
- d) Demonstrați că dacă  $C_1 \cap C_2 = \emptyset$ , atunci cercurile din  $\mathcal{F}$  sunt disjuncte două câte două.

(0,25p)

- 4. Considerăm  $\mathbb{R}^2$  planul euclidian.
- a) Fie  $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$  o conică. Demonstrați că dacă  $A, B, C, D \in \Gamma$  sunt vârfurile unui paralelogram cu centru O, atunci O este și centru al conicei  $\Gamma$ .
- b) Demonstrați că singura conică în care nu poate fi înscris un paralelogram (eventual degenerat) este parabola. (0,5p)

 $<sup>^1</sup>$ Se acordă 1 punct din oficiu. Nota pe lucrare este minimul dintre suma punctajelor și 10. Timp de lucru: 3 ore. Succes!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Puteți presupune un subpunct adevărat în subpunctele următoare, chiar dacă nu ați reușit să îl demonstrați.