

EXAMEN EDP - 3 FEBRUARIE 2016/2017 (GRUPA 301)

• NUME si PRENUME:

Cateva instructiuni:

- Cu exceptia unei singure foi nu sunt permise alte materiale ajutatoare.
- Telefoanele si orice alte dispozitive electronice trebuie mentinute inchise pe tot parcursul examenului.
- 1 punct din oficiu
- Durata examen: 3 ore

Problema 1. (3p). Fie functia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{-|x-1|}$.

- 1). Definiti spatiul $W^{1,1}(\mathbb{R})$.
- 2). Determinati derivata slaba f' a lui f si aratati ca $f' \in L^1(\mathbb{R})$.
- 3). Aratati ca $f \in W^{1,1}(\mathbb{R})$ si calculati norma lui f in $W^{1,1}(\mathbb{R})$.
- 4). Consideram functia $u : B_1(0) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ data de

$$u(x) = \left(\ln \frac{2}{|x|} \right)^{\frac{1}{2}-\epsilon}, \quad \epsilon \geq 0, \quad x = (x_1, x_2),$$

unde $B_1(0)$ este bila unitate din \mathbb{R}^2 centrata in origine.

- 5). Pentru $\epsilon > 0$ calculati

$$\int_0^1 \frac{1}{r} \left(\ln \frac{2}{r} \right)^{-1-2\epsilon} dr.$$

- 6). Aratati ca derivatele partiale $\frac{\partial u}{\partial x_i}$, $i \in \{1, 2\}$ apartin lui $L^2(B_1(0))$.
- 7). Sa se scrie formula operatorului Laplacian Δ pentru functii cu simetrie radiala.
- 8). Pentru $\epsilon = 0$ aratati ca

$$\Delta u + \frac{u}{4|x|^2 \ln^2(2/|x|)} = 0. \quad \forall x \in B_1(0) \setminus \{0\}.$$

Problema 2. (2p). Consideram urmatoarea problema de tip "unde"

$$(1) \quad \begin{cases} u_{tt}(x, t) - 2u_{xx}(x, t) = 1, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = x^2, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = 1, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

i). Consideram

$$v(x, t) = u(x, t) - \frac{t^2}{2}.$$

ii). Scrieti ecuatia satisfacuta de v

iii). Aratati ca pentru orice functie w de clasa C^2 avem

$$w_{tt}(x, t) - 2w_{xx}(x, t) = \left(\frac{\partial}{\partial t} - \sqrt{2} \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} + \sqrt{2} \frac{\partial}{\partial x} \right) w.$$

iv). Pentru v de mai sus notam

$$z(x, t) = \frac{\partial v}{\partial t} + \sqrt{2} \frac{\partial v}{\partial x}.$$

Gasiti ecuatia satisfacuta de z .

v). Gasiti forma generala a functiei z .

vi). Cu z determinat anterior rezolvati ecuatia

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \sqrt{2} \frac{\partial v}{\partial x} = z(x, t)$$

si scrieti forma generala a lui v .

vii). Folosind conditiile asupra lui v la $t = 0$ din enunt obtineti pe v si apoi deduceti solutia u a problemei (1).

Problema 3. (2p). Se considera problema la limita

$$(2) \quad \begin{cases} u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, & (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1) \\ u(x, 0) = u(x, 1) = u(1, y) = 0, & x \in (0, 1), y \in (0, 1) \\ u(0, y) = \sin(2\pi y). & y \in (0, 1), \end{cases}$$

1). Scrieti formula lui Green de integrare prin parti.

2). Aratati ca (2) are cel mult o solutie de clasa C^2 .

3). Determinati solutia problemei (2) cautand-o in variabile separate sub forma $u(x, y) = A(x)B(y)$.

4). Calculati $\max_{\Omega} u$, $\min_{\Omega} u$ unde $\Omega := [0, 1] \times [0, 1]$.

Problema 4. (2p). Se considera problema Dirichlet omogena

$$(3) \quad \begin{cases} (-(2 - \sin x)u'(x))' + u(x) = \cos x, & x \in (0, 1), \\ u(0) = u(1) = 0, \end{cases}$$

1). Definim o solutie slaba pentru (3) ca fiind o functie $u \in H_0^1(0, 1)$ ce satisface formularea variationala

$$(4) \quad \int_0^1 (2 - \sin x)u'v'dx + \int_0^1 uvdx = \int_0^1 \cos xv(x)dx, \quad \forall v \in H_0^1(0, 1).$$

2). Aratati ca daca $u \in C^2([0, 1])$ este solutie clasica pentru (3) atunci u este solutie slaba pentru (3) in sensul lui (4).

3). Aratati ca formularea variationala (4) se gaseste in conditiile aplicarii lemei Lax-Milgram si aratati ca exista o unica solutie slaba $u \in H_0^1(0, 1)$ in sensul lui (4).