

Restanta EDP I

Disciplina: Ecuatii cu derivate partiale

Tipul examinarii: Examen-restanta

Nume student: _____

Seriile 30, 31, 32 _____

Timp de lucru: 3 ore si 30 min (incluzand atasarea rezolvarilor pe Moodle/Email)

Acest examen contine 5 probleme (toate obligatorii).

Examenul este individual. Nu uitati sa va salvati foile cu rezolvarile subiectelor intr-un singur fisier de tip PDF in timp util astfel incat sa va incadrati in cele 3 ore si 15 minute pentru incarcarea fisierului pe platforma Moodle sau pe Email.

Salvati fisierul PDF creat cu numele vostru (Nume_Prenume_Grupa.pdf).

Pentru elaborarea lucrarii scrise puteti folosi orice materiale ajutatoare.

Pentru redactare tineti cont de urmatoarele sugestii:

- Daca folositi o teorema fundamentala, rezultat cunoscut, etc **indicati** acest lucru si explicati cum se poate aplica rezultatul respectiv.
- **Organizati-va munca** intr-un mod coerent pentru a avea toti de castigat ! Incercati ca la crearea fisierului PDF fiecare problema sa fie redactata in ordinea aparitiei pe foaia cu subiecte. Ideal ar fi ca si subpunctele sa fie redactate in ordine. Daca nu stiti a rezolva un anumit subpunct scrieti numarul subpunctului si lasati liber.
- Raspunsurile corecte dar argumentate incomplet (din punct de vedere al calculelor/explicatiilor) vor primi punctaj partial.

Barem: P1 (2p) + P2 (1.5p)+ P3 (2p) +P4 (1.5p)+P5 (2p) + 1p oficiu= **10p** (Plus eventual BONUS acolo unde este cazul in functie de activitatea/temele din timpul semestrului).

Pentru orice nelamuriri scrieti-mi la adresa cristian.cazacu@fmi.unibuc.ro.

Rezultatele finale vor fi postate pe Moodle in cel mai scurt timp posibil.

Problema 1. (2p).

- 1). Gasiti $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel incat $\operatorname{div}(|x|^4 \cdot \nabla v(x)) = \lambda v(x)|x|^2$, unde $v : \mathbb{R}^4 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $v(x) := |x|^{-\frac{7}{4}}$.
- 2). Sa se determine pentru ce valori $p \geq 1$ are loc $|v|^p \in L^1(B_1(0))$, unde $B_1(0)$ este bila unitate din \mathbb{R}^4 .
- 3). * Sa se determine pentru ce valori $p \geq 1$ are loc $(|x|^2 + 1)|v|^p \in L^1(\mathbb{R}^4 \setminus \overline{B_1(0)})$.
- 4). Dati exemplu de o functie strict superarmonica ($-\Delta u > 0$) pe \mathbb{R}^2 care sa se anuleze pe dreapta $x - 3y + 1 = 0$.
- 5). Consideram functia $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ data de

$$u(x) = \ln(1 + 2|x|^2), \quad x = (x_1, x_2).$$

Calculati $\Delta u(1, 1)$.

Problema 2. (1.5p). Fie $\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; \quad x^2 + y^2 < 16\}$ si $\partial\Omega$ frontiera lui Ω . Fie problema

$$(1) \quad \begin{cases} -\Delta u(x, y) = \frac{3}{1+x^2}, & (x, y) \in \Omega \\ u(x, y) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

- 1). Aratati ca problema (1) are cel mult o solutie $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.
- 2). Calculati $\nabla u(0, 0)$.
- 3). Gasiti constanta C astfel incat functia $v(x, y) = C(x^2 + y^2)$ sa verifice $-\Delta v = 3$ in Ω .
- 4). Folosind eventual principiul de maxim pentru functii sub/super armonice sa se arate ca solutia problemei (1) verifica

$$0 < u(x, y) \leq 12, \quad \forall (x, y) \in \Omega.$$

Problema 3. (2p). Consideram urmatoarea problema de tip “unde”

$$(2) \quad \begin{cases} 3u_{tt}(x, t) - 8u_{tx}(x, t) - 3u_{xx}(x, t) = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = g(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

unde $f, g \in C^2(\mathbb{R})$ sunt functii date.

- 1). Aratati ca daca $u = u(x, t)$ este o functie de clasa C^2 atunci u verifica

$$(3\partial_t + \partial_x)(u_t(x, t) - 3u_x(x, t)) = 3u_{tt}(x, t) - 8u_{tx}(x, t) - 3u_{xx}(x, t),$$

pe domeniul sau de definitie.

- 2). Rezolvati problema cu valori initiale satisfacuta de u in (2) (scrieti forma generala a lui u) reducand-o la rezolvarea a doua ecuatii de transport (una omogena si alta neomogena).
- 3). Folosind conditiile la $t = 0$ deduceti solutia u a problemei (2) in cazul particular $f(x) = e^{-3x}$ si $g(x) = \sin(3x)$.

Problema 4. (1.5p) Consideram problema Cauchy

$$(3) \quad \begin{cases} u_t(x, t) - u_{xx}(x, t) + \frac{t^2+1}{t^2+2}u(x, t) = 0, & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = e^{-x^2}, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

1). Gasiti o functie $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ astfel incat functia $v(x, t) := u(x, t)\phi(t)$ sa verifice ecuatia caldurii

$$(4) \quad v_t(x, t) - v_{xx}(x, t) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0.$$

2). Scrieti problema Cauchy verificata de v determinati explicit solutia problemei (3).

Problema 5. (2p). Fie functia $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - |x + \frac{1}{2}|$.

1). Explicitati functia f si faceti graficul functiei f .

2). Sa se determine punctele de derivabilitate ale lui f pe intervalul $(-1, 1)$.

3). Argumentati ca $f \in H^1(-1, 1)$ si calculati norma lui f in $H^1(-1, 1)$ (precizati inainte norma cu care lucrati). Este f in $H_0^1(-1, 1)$?

4). * Determinati $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel incat functia $z : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $z(x) = (1 + x)^\alpha$ sa apartina lui $W^{1,4}(0, 1)$.

5). * Determinati $\alpha \in \mathbb{R}$ astfel incat functia $z : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $z(x) = \frac{x^\alpha}{1+x^2}$ sa apartina lui $H^1(1, \infty)$.