

## Hausaufgabe 12

---

### Aufgabe 1

a)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h \sin(h)|}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} |\sin(h)| & \text{für } h \geq 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} -|\sin(h)| & \text{für } h < 0 \end{cases} = 0$$

Da nun der Grenzwert existiert, folgt Differenzierbarkeit von  $f$  in  $x_0$ .

b)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - \sin(0)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1 & \text{für } h \geq 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 & \text{für } h < 0 \end{cases}$$

Da nun also der rechtsseitige Grenzwert ungleich dem linksseitigen ist, existiert der Grenzwert nicht. Es ist also  $g$  in  $x_0$  nicht differenzierbar.

c)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{j(x_0 + h) - j(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{j(h) - \sin^n(0)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^n(h)}{h} = ? & \text{für } h \geq 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0 & \text{für } h < 0 \end{cases}$$

### Aufgabe 2

a) Es sei  $x \in \mathbb{R}$  gegeben. Es gilt:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x + h - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

b) Es sei  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$  gegeben. Es gilt:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + h) - g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x - x + h}{(x^2 + hx)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{x^2 + hx} = -\frac{1}{x^2}$$

c) Es sei  $n = 1$ . Es gilt für gegebenes  $x \in \mathbb{R}$ :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_n(x+h) - k_n(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = 1$$

Also gilt die Behauptung für ein  $n \in \mathbb{N}$ . Sei nun ein  $n \in \mathbb{N}$  gegeben sodass die Behauptung gilt, also  $k(x) = x^n$  auf ganz  $\mathbb{R}$  differenzierbar ist. Es folgt für  $n+1$ :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_{n+1}(x+h) - k_{n+1}(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^{n+1} - x^{n+1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left( \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} h^k \right) - x^{n+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} h^k}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} h^{k-1} = \lim_{h \rightarrow 0} \binom{n+1}{1} x^n h^0 + \sum_{k=2}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} h^{k-1} \\ &= (n+1)x^n + \sum_{k=2}^{n+1} \binom{n+1}{k} x^{n+1-k} 0^{k-1} = (n+1)x^n \end{aligned}$$

Der Differenzenquotient existiert dann also auch für  $k_{n+1}$  und ist ein Skalar von  $k_n$ , welche ebenfalls differenzierbar ist. Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion existiert nun also der Differenzenquotient von  $k_n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

d) Mit der geometrischen Summe lässt sich herleiten:

$$\begin{aligned} (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k &= (a-b) a^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} \left( \frac{b}{a} \right)^k = (a-b) a^{n-1} \frac{1 - \left( \frac{b}{a} \right)^n}{1 - \frac{b}{a}} \\ &= (a-b) a^{n-1} \frac{\left( \frac{a^n - b^n}{a^n} \right)}{\left( \frac{a-b}{a} \right)} = (a-b) a^{n-1} \frac{a(a^n - b^n)}{a^n(a-b)} = a^n - b^n \end{aligned}$$

Damit folgt nun für gegebenes  $n \in \mathbb{N}$  und  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{j(x+h) - j(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+h)^n} - \frac{1}{x^n}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left( \frac{x^n - (x+h)^n}{x^n(x+h)^n} \right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x - (x+h)) \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-k-1} (x+h)^k}{hx^n(x+h)^n} = \lim_{h \rightarrow 0} - \sum_{k=0}^{n-1} x^{-k-1} (x+h)^{k-n} \\ &= - \sum_{k=0}^{n-1} x^{-(n+1)} = \frac{-n}{x^{n+1}} \end{aligned}$$

Also existiert der Differenzenquotient von  $j_n(x)$  für beliebige  $n \in \mathbb{N}$ .

### Aufgabe 3