

Hausaufgabe 10

Aufgabe 1

a)

Für den Grenzwert $\lim_{x \downarrow 3} f(x)$ gilt stets $x > 3$ und damit $|x - 3| = x - 3 > 0$, also auch:

$$\lim_{x \downarrow 3} f(x) = \lim_{x \downarrow 3} \frac{|x - 3|}{x - 3} = \lim_{x \downarrow 3} \frac{x - 3}{x - 3} = 1$$

Für den Grenzwert $\lim_{x \uparrow 3} f(x)$ gilt stets $x < 3$ und damit $x - 3 < 0 < |x - 3|$, also auch:

$$\lim_{x \uparrow 3} f(x) = \lim_{x \uparrow 3} \frac{|x - 3|}{x - 3} = \lim_{x \uparrow 3} \frac{-(x - 3)}{x - 3} = -1$$

Da nun $\lim_{x \downarrow 3} f(x) \neq \lim_{x \uparrow 3} f(x)$ gilt, lässt sich schließen, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ nicht existiert und $f(x)$ nicht stetig ist.

b)

Da die Polynome $x^2 + 5$ und $1 - 3x$ für $x = -2$ wohldefiniert sind, lässt sich hier der Grenzwert durch Einsetzen individuell bestimmen. Daraus folgt auch, dass (wie bei praktisch jedem Polynom) der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow -2}$ existiert (1.6) und dann mit (1.10) gilt:

$$\lim_{x \uparrow -2} x^2 + 5 = \lim_{x \rightarrow -2} x^2 + 5 \quad \text{und} \quad \lim_{x \downarrow -2} 1 - 3x = \lim_{x \rightarrow -2} 1 - 3x$$

Es folgt also:

$$\lim_{x \uparrow -2} x^2 + 5 = (-2)^2 + 5 = 9 \quad \text{und} \quad \lim_{x \downarrow -2} 1 - 3x = 1 - 3(-2) = 7$$

Weiterhin ist gilt wie in a) für den Grenzwert $\lim_{x \uparrow -2} g(x)$, dass $x < -2$ und damit nach Konstruktion $g(x) = x^2 + 5$. Analog dazu gilt für $\lim_{x \downarrow -2} g(x)$, dass $x > -2$ und damit nach Konstruktion $g(x) = 1 - 3x$. Es folgt also

$$\lim_{x \uparrow -2} g(x) = \lim_{x \uparrow -2} x^2 + 5 = 9 \quad \text{und} \quad \lim_{x \downarrow -2} g(x) = \lim_{x \downarrow -2} 1 - 3x = 7$$

Da nun $\lim_{x \uparrow -2} g(x) \neq \lim_{x \downarrow -2} g(x)$ gilt, lässt sich schließen, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow -2} g(x)$ nicht existiert und $g(x)$ nicht stetig ist.

c) Analog zu Beispiel 1.18 lässt sich begründen, dass $\lim_{x \uparrow 0} \frac{1}{x^3} = -\infty$ und $\lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x^3} = \infty$ gilt:

Zu gegebenem $M > 0$ wähle $a = \frac{1}{\sqrt[3]{M}}$. Dann ist für $0 < x < a$:

$$\frac{1}{x^3} > \frac{1}{a^3} = M$$

Also gilt $\lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x^3} = \infty$. Analog dazu wählen wir zu gegebenem $M > 0$ wieder $b = -\frac{1}{\sqrt[3]{M}}$.

Dann ist für $b < x < 0$:

$$\frac{1}{x^3} < \frac{1}{b^3} = -M$$

Also gilt $\lim_{x \uparrow 0} \frac{1}{x^3} = -\infty$.

Weiterhin gilt für $\lim_{x \downarrow 0} j(x)$ bzw. $\lim_{x \uparrow 0} j(x)$ stets $x \neq 0$ und damit auch

$$\lim_{x \downarrow 0} j(x) = \lim_{x \downarrow 0} \frac{1}{x^3} = \infty \quad \text{sowie} \quad \lim_{x \uparrow 0} j(x) = \lim_{x \uparrow 0} \frac{1}{x^3} = -\infty$$

Da nun $\lim_{x \uparrow 0} j(x) \neq \lim_{x \downarrow 0} j(x)$ gilt, lässt sich schließen, dass der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 0} j(x)$ nicht existiert und $j(x)$ nicht stetig ist.

Aufgabe 2

a)

Es gilt für $x, y \in [0, 2]$ stets $|x - y| \leq \max[0, 2] = 2$, ebenso $|x^2 - y^2| < \max[0, 2^2] = 4$.

Wir wählen also $L = 2$. Es folgt:

$$\forall x, y \in [0, 2]: |f(x) - f(y)| = |x^2 - y^2| \leq L \cdot |x - y| = |2x - 2y| \leq 4$$

Dies gilt, da stets $x^2 = x \cdot x \leq 2 \cdot x$ für $x \in [0, 2]$. Damit ist f im Intervall $[0, 2]$ Lipschitz-stetig.

b)

Wäre f im Intervall $[0, 1]$ Lipschitz-stetig (Widerspruchsannahme), so gäbe es ein $L \in \mathbb{R}, L \geq 0$ sodass gilt:

$$\forall x, y \in [0, 1]: |f(x) - f(y)| = |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq L|x - y|$$

Sei nun $x = 2y \in [0, 1]$. Wir formen die das Lipschitz-Kriterium leicht um. Es müsste gelten:

$$\forall y \in \left[0, \frac{1}{2}\right], x \in [0, 1], x = 2y: \frac{|\sqrt{x} - \sqrt{y}|}{|x - y|} = \frac{\sqrt{2y} - \sqrt{y}}{2y - y} = \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{y}} \leq L$$

Es lässt sich jedoch zu jedem $M > 0$ ein $a = \frac{1}{M^2}$ wählen, sodass für $0 < x < a$ gilt:

$$\frac{\sqrt{2} - 1}{x} > \frac{1}{\sqrt{x}} > \frac{1}{\sqrt{a}} = M$$

Es gilt also $\lim_{x \downarrow 0} \frac{\sqrt{2} - 1}{x} = \infty$, damit wäre die Funktion im gegebenen Intervall für $x = 2y$ nach oben unbeschränkt. Dies stellt einen Widerspruch dar, da sonst L eine obere Schranke für eine nach oben unbeschränkte Funktion darstellen würde. Damit haben wir ein Gegenbeispiel gezeigt, folglich ist f nicht Lipschitz-stetig.

c)
FEHLT NOCH

Aufgabe 3

a)

Es sei eine beliebige Folge x_n mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ gegeben. Die Exponentialfunktion ist stets größer 0 und streng monoton steigend (III 3.21). Weiterhin gilt:

$$\exp(0) = 1 \quad \text{und} \quad \exp(-1) = \frac{1}{e} < 1 \quad \text{sodass} \quad \forall x < 0: \exp(x) < 1$$

Weiterhin gilt stets $x^2 > 0$ und somit auch $\frac{-1}{x^2} < 0$. Es folgt also:

$$0 < \left| \exp\left(\frac{-1}{x_n^2}\right) \right| < 1 \quad \implies \quad 0 < \left| x_n \cdot \exp\left(\frac{-1}{x_n^2}\right) \right| < |x_n|$$

Es gilt jedoch nach Konstruktion von x_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} 0$$

Somit folgt nach dem Sandwich Lemma:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x_n \cdot \exp\left(\frac{-1}{x_n^2}\right) \right| = 0$$

Weiterhin gilt nach Definition auch $f(0) = 0$, also folgt für jede beliebige Nullfolge x_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = f(0) = 0$$

Damit ist f stetig in 0.

b)