Tobias Riedel, 379133 Phil Pützstück, 377247 Kevin Holzmann, 371116 Gurvinderjit Singh, 369227

Hausaufgabe 8

Aufgabe 1

a)

Für w_1 gilt:

$$w_1 = \frac{2}{1 - 3i} = (2 + 0i) \cdot (1 - 3i)^{-1} = (2 + 0i) \cdot \left(\frac{1 + 3i}{1^2 + 3^2}\right) = (2 + 0i) \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{3}{10}i\right) = \frac{1}{5} + \frac{3}{5}i$$

Es folgt

$$Re(w_1) = \frac{1}{5}$$
 und $Im(w_1) = \frac{3}{5}$

Für w_2 gilt:

$$w_2 = \frac{1}{i} = (1+0i) \cdot (0+i)^{-1} = (1+0i) \cdot \left(\frac{0-i}{1}\right) = 0-i$$

Es folgt

$$\operatorname{Re}(w_2) = 0$$
 und $\operatorname{Im}(w_2) = -1$

Für w_3 gilt:

$$w_3 = \frac{1+it}{1-it} \cdot \frac{1+it}{1+it} = \frac{1-t^2+i2t}{1+t^2} = \frac{1-t^2}{1+t^2} + i \cdot \left(\frac{2t}{1+t^2}\right)$$

Es folgt

$$Re(w_3) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$
 und $Im(w_3) = \frac{2t}{1+t^2}$

b) Nach Satz 1.6 lässt sich der Betrag |z| wie folgt berechnen:

$$\left| \frac{(3+4i)(-1+2i)}{(-1-i)(3-i)} \right| = \frac{|(3+4i)(-1+2i)|}{|(-1-i)(3-i)|} = \frac{|3+4i| \cdot |-1+2i|}{|-1-i| \cdot |3-i|}$$
$$= \frac{\sqrt{3^2+4^2}\sqrt{1^2+2^2}}{\sqrt{(-1)^2+(-1)^2}\sqrt{3^2+(-1)^2}} = \frac{5 \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{10}} = \frac{5}{2}$$


c) Sei $x, y \in \mathbb{R}$ mit z = x + iy. Es gilt

$$\left|\frac{z+i}{z-i}\right| = \frac{|z+i|}{|z-i|} = \frac{|(x+iy)+i|}{|(x+iy)-i|} = \frac{|x+i(y+1)|}{|x+i(y-1)|} = \sqrt{\frac{x^2+(y+1)^2}{x^2+(y-1)^2}} \le 1$$

Die lässt sich weiter umformen:

$$\sqrt{\frac{x^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2}} \le 1 \iff \frac{x^2 + (y+1)^2}{x^2 + (y-1)^2} \le 1^2 = 1 \iff x^2 + (y+1)^2 \le x^2 + (y-1)^2$$
$$\iff (y^2 + 2y + 1) - (y^2 - 2y + 1) \le 0 \iff 4y \le 0 \iff y \le 0$$

Also ist die Ungleichung für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $\mathrm{Im}(z) \leq 0$ erfüllt.



d) Es seien $x, y \in \mathbb{R}$ mit x = Re(z) und y = Im(z). Es folgt:

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{1+z}{1-z} \cdot \frac{1-x+iy}{1-x+iy}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{-x^2+2iy-y^2+1}{x^2-2x+y^2+1}\right)$$
$$= \operatorname{Re}\left(\frac{1-x^2-y^2}{x^2-2x+y^2+1} + i \cdot \frac{2y}{x^2-2x+y^2+1}\right) = \frac{1-x^2-y^2}{x^2-2x+y^2+1} \ge 0$$

Es ist $y^2 \ge 0$ für alle $y \in \mathbb{R}$. Also gilt


$$\left(x^2 - 2x + 1 \ge 0 \Longrightarrow x^2 - 2x + y^2 + 1 \ge 0\right) \Longleftrightarrow \left((x - 1)^2 \ge 0 \Longrightarrow x^2 - 2x + y^2 + 1 \ge 0\right)$$

Da $(x-1)^2 \ge 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, ist der Nenner des Quotienten nie negativ.

Also gilt


$$\frac{1 - x^2 - y^2}{x^2 - 2x + y^2 - + 1} \ge 0 \iff x^2 + y^2 \le 1 \iff \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 \le 1$$

Dies entspricht einer typischen Kreisgleichung:




Aufgabe 2

a) Mit $|z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2}$ folgt




b) Dies lässt sich wie eine Grade darstellen, welche $\mathrm{Im}(z)$ in Relation zu $\mathrm{Re}(z)$ setzt:

$$2\operatorname{Re}(z) + 5\operatorname{Im}(y) = 1 \iff \operatorname{Im}(z) = \frac{1 - 2\operatorname{Re}(z)}{5}$$




c)
$$\operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z) - 1 > 2 \iff \operatorname{Im}(z) > 3 - \operatorname{Re}(z)$$

Damit haben wir eine Geradengleichung. Alle werte "über" dieser gerade gehören zu M_3 :



d) Aus $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ folgt, dass alle Elemente von M_4 schonmal im 1. Quadranten liegen müssen. Weiterhin muss $\operatorname{Im}(z) \geq \operatorname{Re}(z)$ gelten, also liegen alle Elemente von M_4 überhalb und auf der Geradengleichung $\operatorname{Im}(z) = \operatorname{Re}(z)$. Als letztes muss |z| < 9 gelten wordurch das ganze mit dem Radius 9 beschränkt wird, daher das runde Ende:



Aufgabe 3

Wir definieren:

$$(b_n)_{n\in\mathbb{N}} := 5i^{4n} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)$$

$$(c_n)_{n\in\mathbb{N}} := 5i^{4n+1} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)$$

$$(d_n)_{n\in\mathbb{N}} := 5i^{4n+2} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)$$

$$(e_n)_{n\in\mathbb{N}} := 5i^{4n+3} \left(1 + \frac{1}{n^3} \right)$$

Es gilt

$$\forall n \in \mathbb{N} : i^{4n} = (i^2 \cdot i^2)^n = ((-1)(-1))^n = 1^n = 1$$

Es folgt

$$\forall n \in \mathbb{N} : i^{4n+1} = i^{4n} \cdot i = i$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : i^{4n+2} = i^{4n} \cdot i^2 = i^2 = -1$$

$$\forall n \in \mathbb{N} : i^{4n+3} = i^{4n} \cdot i^3 = i^3 = -i$$

Weiterhin seien:

$$(w_n)_{n \in \mathbb{N}} := 4n$$
 $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} := 4n + 1$ $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} := 4n + 2$ $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} := 4n + 3$

Dann gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ stets:

$$b_n = \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = 5i^{4n} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = a_{w_n} \qquad c_n = i \cdot \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) 5i^{4n+1} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = a_{x_n}$$

$$d_n = -\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = 5i^{4n+2} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = a_{y_n} \quad e_n = -i \cdot \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = 5i^{4n+3} \left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = a_{z_n}$$

Folglich sind b_n, c_n, d_n und e_n alle Teilfolgen von a_n . Die Grenzwertsätze lassen sich wie folgt anwenden:

$$\lim_{n \to \infty} b_n = \lim_{n \to \infty} 1 + \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^3} = 1 + 0 = 1$$

$$\lim_{n \to \infty} c_n = \lim_{n \to \infty} i + \lim_{n \to \infty} i \cdot \frac{1}{n^3} = i + \lim_{n \to \infty} i \cdot \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^3} = i + i \cdot 0 = i$$

$$\lim_{n \to \infty} d_n = \lim_{n \to \infty} -1 - \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^3} = -1 - 0 = -1$$

$$\lim_{n \to \infty} e_n = \lim_{n \to \infty} -i - \lim_{n \to \infty} i \cdot \frac{1}{n^3} = -i - \lim_{n \to \infty} i \cdot \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n^3} = -i - i \cdot 0 = -i$$

Also folgt für die Teilfolgen b_n, c_n, d_n, e_n von a_n :

$$\lim_{n \to \infty} b_n \neq \lim_{n \to \infty} c_n \neq \lim_{n \to \infty} d_n \neq \lim_{n \to \infty} e_n$$

Aufgabe 4