Если не оговорено противное, под словом «граф» далее понимается неориентированный граф без петель и кратных рёбер.

- **1.2.1.** Каждому дереву сопоставим набор степеней его вершин (чисел в наборе будет столько, сколько вершин есть в графе, некоторые числа могут быть одинаковы). Существуют ли деревья, степени которых равны:
- **a)** 1, 2, 2, 2, 1;
- **6)** 1, 1, 1, 1, 1;
- **B)** 4, 1, 1, 1, 1;
- **r)** 3, 2, 2, 2, 1;
- д) 3, 2, 2, 1, 1, 1;
- e) 3, 3, 2, 1, 1, 0;
- ж) 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1?
- з*) Как по последовательности степеней вершин определить, есть ли дерево с такой последовательностью степеней?
- 1.2.2. Существует ли дерево на 9 вершинах, в котором 2 вершины имеют степень 5?
- **1.2.3.** В дереве с не менее чем двумя вершинами нет вершин степени 2. Докажите, что количество висячих вершин (т.е. вершин степени 1) больше половины общего количества вершин.
- **1.2.4.** Верно ли, что из всякого связного графа можно удалить одну вершину, чтобы он остался связным?

Замечание. Если вы решили и сдали все задачи выше во время занятия, вы можете решать и сдавать домашние задачи также во время занятия.

- **1.2.5.** Граф называется *минимально связным*, если он связен, но после удаления любого ребра перестает быть связным. Докажите, что минимально связные графы это в точности деревья.
- **1.2.6.** В группе каждый имеет знакомого. Докажите, что эту группу можно разбить на две так, чтобы каждый человек имел знакомого из другой группы.

Граф называется k-реберно-связным, если он остается связным после удаления любых k ребер.

- **1.2.7.** В гости придут либо 5, либо 7 человек. На какое минимальное число кусков нужно порезать торт, чтобы гарантированно можно было раздать всем поровну?
- **1.2.8.** Пусть в дереве 20 листьев. Мы хотим добавить в дерево ребер так, чтобы оно стало 1-реберно-связным.
- а) Докажите, что нужно добавить не меньше 10 ребер.
- **б***) Докажите, что 10 ребер всегда достаточно.

Домашнее задание 1, часть 2 Дедлайны: 13 февраля и 15 февраля, 19:00

Правила сдачи и оценивания. Это часть 2 домашнего задания 1. Всего в домашнем задании 6 задач, каждая оценивается в 2,5 баллов. Максимальная оценка за домашнее задание составляет 10 баллов. Если вы наберете больше, то баллы сверх 10 пойдут в виде бонуса.

Дедлайн первого домашнего задания — 15 февраля в 19:00. Решения нужно отправить по адресу hw.graphs.sber@gmail.com. Решения будут проверены до 19:00 16 февраля.

Также можно отправить решения до 19:00 13 февраля. Тогда они будут проверены до 19:00 14 февраля и в случае наличия ошибок можно будет успеть их исправить до основного дедлайна.

- **1.2.9.** *Лесом* называется граф, каждая компонента связности которого является деревом. Пусть у нас есть лес на 20 вершинах, в котором три компоненты связности. Сколько в нем ребер?
- **1.2.10.** В связном графе на 10 вершинах есть три вершины степени 4. Может ли этот граф быть деревом?
- **1.2.11.** Граф образует решетку размера 5×6 , где вершинами являются узлы решетки, а ребрами, отрезки между узлами (то есть, всего в графе $6 \cdot 7 = 42$ вершин). Мы хотим удалить как можно больше ребер, чтобы при этом граф не распался на несколько компонент связности. Какое максимальное количество ребер можно удалить? Обратите внимание, что для полного решения задачи не достаточно объяснить, как удалить указанное вами в качестве ответа число ребер. Нужно также объяснить, что больше ребер удалить уже не получится.

