

# Семинар 18

## Поиск инвариантных подпространств

Пусть у нас дано векторное пространство  $V$  над полем  $F$  и на нем действует оператор  $\phi: V \rightarrow V$ . Наша задача найти все  $\phi$ -инвариантные подпространства  $U \subseteq V$ , то есть все такие подпространства  $U \subseteq V$ , что  $\phi(U) \subseteq U$ . Такая задача в общем виде требует знания о Жордановой нормальной форме оператора и потому сложна в решении. Однако, уже сейчас мы можем понять, как работает общий алгоритм. Описываемый мною подход состоит из двух этапов:

1. Описать все инвариантные подпространства специального вида (все главные инвариантные).
2. Свести описание произвольных инвариантных к инвариантным специального вида (главным инвариантным).

## Главные инвариантные

Для оператор  $\phi: V \rightarrow V$  и вектора  $v \in V$  определим следующее подпространство

$$[v]_\phi = \langle v, \phi v, \phi^2 v, \dots, \phi^m v, \dots \rangle$$

Обратите внимание, что данное векторное пространство является инвариантным подпространством. Действительно, если произвольный элемент в нем имеет вид  $a_0 v + a_1 \phi v + \dots + a_n \phi^n v$ . После применения  $\phi$  мы получим  $a_0 \phi v + a_1 \phi^2 v + \dots + a_n \phi^{n+1} v$ , то есть образ вектора остался в подпространстве, то есть оно инвариантно.

Подпространство  $[v]_\phi$  является наименьшим инвариантным подпространством в  $V$  содержащим  $v$ . Действительно, для этого надо показать, что если  $U$  – некоторое другое инвариантное подпространство содержащее  $U$ , то оно целиком содержит  $[v]_\phi$ . Действительно, если  $v \in U$ , то и  $\phi v \in U$  в силу инвариантности. Но тогда и  $\phi^2 v \in U$ , а следовательно и  $\phi^3 v \in U$  и так далее. То есть любая степень  $\phi^n v \in U$ . А значит по определению и линейная оболочка этих векторов попала в  $U$ . Но последнее означает, что  $[v]_\phi \subseteq U$ .

## Описание всех инвариантных

Пусть  $U \subseteq V$  – произвольное инвариантное. Тогда у него есть какой-то базис, то есть  $U = \langle u_1, \dots, u_k \rangle$ . Давайте покажем, что в этом случае  $U = [u_1]_\phi + \dots + [u_k]_\phi$ .<sup>1</sup> Действительно, так как  $u_i \in [u_i]_\phi$  и последнее является подпространством, то  $\langle u_i \rangle \subseteq [u_i]_\phi$ . А значит после сложения этих вложений мы получим  $\langle u_1, \dots, u_k \rangle \subseteq [u_1]_\phi + \dots + [u_k]_\phi$ . Обратно, мы видим, что  $u_i \in U$  и так как  $U$  инвариантное, то оно содержит наименьшее инвариантное содержащее  $u_i$ . То есть  $[u_i]_\phi \subseteq U$ . А значит складывая эти вложения мы получим  $[u_1]_\phi + \dots + [u_k]_\phi \subseteq U$ , что доказывает второе вложение.

Описание выше показывает, что нам достаточно найти все главные инвариантные, а потом найти все возможные суммы главных инвариантных между собой. И это даст нам описание всех инвариантных.

## Поиск главных инвариантных

Тут у меня начинаются для вас плохие новости. В общем виде – это тот еще геморрой. Потому давайте я продемонстрирую поиск главных инвариантных на двух примерах. Я надеюсь, что это даст общее представление, как пытаться описывать подобные подпространства в похожих случаях.

**Диагональный оператор** Пусть оператор  $\phi: F^3 \rightarrow F^3$  задан матрицей  $A$ , где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

Пусть нам дан произвольный вектор  $v = (a, b, c)^t$ . Покажем, что

$$\left[ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right]_A = \left\langle \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix} \right\rangle$$

---

<sup>1</sup>Обратите внимание, что тут сумма не обязательно прямая.

Давайте введем следующие обозначения

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

Тогда заметим, что векторы  $v_i$  являются собственными, а именно

$$Av_1 = v_1, Av_2 = 2v_2, Av_3 = 3v_3$$

В частности это значит, что пространство  $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$  является инвариантным. И очевидно, что оно содержит вектор  $v = v_1 + v_2 + v_3$ . А значит и содержит минимальное инвариантное  $[v]_A$ .

Теперь покажем вложение в обратную сторону. Для этого достаточно показать, что вектор  $v_1, v_2, v_3$  лежат в  $[v]_A$ . Для этого рассмотрим векторы  $v, Av, A^2v$  заметим, что

$$\begin{aligned} v &= v_1 + v_2 + v_3 \\ Av &= v_1 + 2v_2 + 3v_3 \\ A^2v &= v_1 + 2^2v_2 + 3^2v_3 \end{aligned} \quad \text{то есть} \quad (v, Av, A^2v) = (v_1, v_2, v_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 \\ 1 & 3 & 3^2 \end{pmatrix}$$

Но матрица справа обратима, так как ее определитель – это определитель Вандермонда. А значит, можно разделить на эту матрицу и получим

$$(v_1, v_2, v_3) = (v, Av, A^2v) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 \\ 1 & 3 & 3^2 \end{pmatrix}^{-1}$$

А это значит, что векторы  $v_1, v_2, v_3$  выражаются через  $v, Av, A^2v$ . А в частности это значит, что  $v_1, v_2, v_3$  лежат в  $[v]_A$ . Что завершает доказательство второго вложения.

Таким образом мы видим, что главными инвариантными являются

$$0, \langle e_1 \rangle, \langle e_2 \rangle, \langle e_3 \rangle, \langle e_1, e_2 \rangle, \langle e_1, e_3 \rangle, \langle e_2, e_3 \rangle, F^3$$

Кроме того, обратите внимание, что сумма любых двух главных подпространств опять главное подпространство. То есть этот же список является списком всех инвариантных подпространств для данного оператора.

**Жорданова клетка** Пусть оператор  $\phi: F^3 \rightarrow F^3$  задан матрицей  $A$ , где

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

Покажем, что все главные инвариантные – это подпространства «порожденные префиксом стандартного базиса», то есть

$$0, \langle e_1 \rangle, \langle e_1, e_2 \rangle, \langle e_1, e_2, e_3 \rangle = F^3$$

Давайте возьмем произвольный вектор  $v = (a, b, c)^t$ . Давайте предположим, что  $c = 0$  и сделаем вычисление главного инвариантного в случае  $v = (a, b, 0)^t$ . Покажем, что

$$\left[ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \right]_A = \langle e_1, e_2 \rangle$$

Как легко видеть, подпространство в правой части инвариантно относительно  $A$  и содержит вектор  $v$ . Значит, содержит минимальное инвариантное  $[v]_A$ . Что доказывает, что левая часть принадлежит правой. Теперь осталось показать, что вектора  $e_1$  и  $e_2$  лежат в левой части. Действительно, рассмотрим  $Av = (b, 0, 0)^t = be_1$ . Теперь поделим на  $b$  и видим, что  $e_1 \in [v]_A$ . Теперь рассмотрим  $v - ae_1 = (0, b, 0)^t = be_2$ . Разделим последнее на  $b$  и видим, что  $e_2 \in [v]_A$ .<sup>2</sup> То есть мы доказали обратное вложение.

<sup>2</sup>В общем случае результат устроен так. Пусть  $k$  – номер последней ненулевой координаты в векторе  $v$ , тогда  $[v] = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ .