R = (A, B, C, D, E) ונתונות התלויות הפונקציונליות: R = (A, B, C, D, E) ונתונות המסד:  $C \rightarrow A$  (ה)  $ED \rightarrow BC$  (ד)  $AB \rightarrow CE$  (ב)  $AB \rightarrow CE$  (ב)  $AB \rightarrow CE$ 

א. הציגו את כל המפתחות המועמדים לסכמה. עבור **אחד** מתוך המפתחות שהצגתם הצדיקו את היותו מפתח.

מציאת המפתחות:

ננסה למצוא את הקבוצות המינימליות של תכונות שמאפשרות להגיע לכל תכונה בסכמה.

נתחיל בבדיקה של תכונות יחידות:

:C נתחיל עם

.A-, ולכן נוכל להגיע גם ל $C \rightarrow A$ 

 $A \rightarrow D$  כי D, נוכל להגיע גם ל-D, כי A בעזרת

נשאר לבדוק את B ו-E. מכיוון שאין תלות ישירה, נבדוק צירופים אחרים.

נבדוק צירופים: C כבר מביא לנו את A,D אך לא את C

מה CE

.A-, ולכן נוכל להגיע גם ל $C \rightarrow A$ 

.D-, ולכן נוכל להגיע גם ל-A  $\rightarrow$  D

.B-אז אנחנו מגיעים גם ל-CD  $\rightarrow$  EB-ו ווש לנו את כו לנו את

ולכן, CE הוא מפתח מועמד.

ננסה CD:

.E-ו B אז יש לנו, CD → EB

A-, ולכן נוכל להגיע גם ל,C  $\rightarrow$  A

.D-, ולכן נוכל להגיע גם ל $A \rightarrow D$ 

ולכן, CD הוא מפתח מועמד נוסף.

1.1

1.2

לסיכום, המפתחות המועמדים לסכמה הם: CE ו-CD.

ב. הציגו שני פירוקים שונים משמרים תחת צירוף של הסכמה לצורה נורמלית של בויס-קוד. עבור כל צעד בפירוק תארו על-פי איזה ת״פ פרקתם את הסכמה.

שני פירוקים שונים משמרים תחת צירוף של הסכמה לצורה נורמלית של בויס-קוד הם:

 $A \rightarrow D$  פירוק ראשון: נפרק לפי התלות

 $R_1 = (A,D)$ 

 $R_2 = (A,B,C,E)$ 

 $:C \rightarrow A$  פירוק שני: נפרק לפי התלות

 $R_1 = (C,A)$ 

 $R_2 = (A,B,D,E)$ 

 עבור כל אחד משני הפרוקים: אם קיימת תלות כלשהי שאובדת בפירוק אזי הציגו תלות אחת שאובדת (אם אובדות כמה תלויות די להציג תלות יחידה, ואם לא אובדת אף תלות אזי אין צורך להציג דבר).

בפירוק הראשון לא מאבדים אף תלות כי התלות D נשמרת ב- $R_1$ , והתלויות האחרות נשמרות בפירוק הראשון לא מאבדים אף תלות בעזרת איחוד הסכמות.

בפירוק השני לא מאבדים אף תלות כי התלות C  $\rightarrow$  A נשמרת ב-R<sub>1</sub>, והתלויות האחרות נשמרות בפירוק השני לשחזר את התכונות בעזרת איחוד הסכמות.

# ד. האם הסכמה הנתונה R מצויה בצורה נורמלית שלישית! הסבירו.

עם התלויות הפונקציונליות: R = (A, B, C, D, E)

- $A \rightarrow D (\kappa)$
- $AB \rightarrow CE (a)$
- $CD \rightarrow EB (\lambda)$
- ED→BC (**T**)
  - (ה) A←C

3.1

אינה מצויה בצורה נורמלית שלישית (3NF).

הסיבה היא שהתלות הפונקציונלית (ג) CD→EB אינה תלות פונקציונלית מועמדת, כלומר EB אינו מפתח מועמד. לפיכך, הסכמה R אינה בצורה נורמלית שלישית.

ה. הציגו פירוק משמר תחת צירוף ומשמר תייפ של הסכמה לצורה נורמלית של שלישית. האם הפרוק מצוי גם בצורה נורמלית של בויס-קוד! הסבירו בקצרה. (ענו על סעיף זה גם אם בסעיף הקודם עניתם שהסכמה כבר מצויה ב- 3NF.)

פירוק משמר תחת צירוף ומשמר תלויות פונקציונליות של הסכמה R לצורה נורמלית שלישית (NF3) ובצורה נורמלית של בויס-קוד (BCNF):

 $R_1 = (A, D)$ 

 $R_2 = (C, E, B)$ 

 $R_3 = (C, D, E, B)$ 

נסביר מדוע:

 $A \rightarrow D$  משמרת את התלות R<sub>1</sub>

 $(C \rightarrow A)$  (C  $\rightarrow A$ , AB  $\rightarrow CE$  משמרת את התלויות R<sub>2</sub>

 $CD \rightarrow EB$ ,  $ED \rightarrow BC$  משמרת התלויות  $R_3$ 

בפירוק זה, כל תלות פונקציונלית תלויה במפתח מועמד או בחלק ממפתח מועמד בסכמה החלקית: ב- A R₁ הוא מפתח מועמד כיוון שקיימת התלות D→D.


AB→CE ניתן להסיק ש-C קובע ייחודית את A, ומהתלות C→A ב-C ניתן להסיק ש-C R₂ הוא מפתח מועמד מהתלות ש-C R₂ (כאשר C→A) ניתן להסיק ש-C קובע ייחודית גם את E.

:ED-ו CD ב- $R_3$ , המפתחות המועמדים הם

.CD→EB הוא מפתח מועמד כיוון שקיימת התלות CD

ED→BC הוא מפתח מועמד כיוון שקיימת התלות ED

## ו. הציגו פירוק נוסף משמר תחת צירוף של הסכמה לצורה נורמלית שלישית. האם הפירוק שהצגתם משמר את כל הת"פ! הסבירו בקצרה.





$$R_2 = (A, D)$$

$$R_3 = (A, B, C, E)$$

$$R_4 = (E, D, B, C)$$

נסביר מדוע

 $C \rightarrow A$  משמרת את התלות R<sub>1</sub>

 $A \rightarrow D$  משמרת את התלות R<sub>2</sub>

(C  $\rightarrow$  A כי) AB  $\rightarrow$  CE משמרת את התלות R $_3$ 

ED  $\rightarrow$  BC משמרת את התלות  $R_4$ 

בפירוק זה, כל תלות פונקציונלית תלויה במפתח מועמד או בחלק ממפתח מועמד בסכמה החלקית:

.הוא מפתח מועמד  $C R_1$ 

ב-A  $R_2$  הוא מפתח מועמד.

ב-₃AB R הוא מפתח מועמד.

ב-ED  $R_4$  הוא מפתח מועמד.

# אינדקס הערות

- יש עוד שלושה מפתחות מועמדים שלא בדקת (10-)
- 1.2 C לבדו מועמד מפתח (-1)
- 3.1 מחמש מאוי, הסכמה הנתונה מצויה כבר בצורה נורמלית שלישית, שכן כל אחת מחמשהתכונות המופיעות בה נכללת במפתח מועמד כלשהו (-5)