

DIARREIA AGUDA



ROTINA CLÍNICA

Modelos de prescrição

GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **Uso Oral (Antidiarreicos):**

Cloridrato de Loperamida 2 mg ---- 20 comprimidos

Tomar dose inicial de 4 mg (dois comprimidos).

Após cada evacuação líquida, tomar mais um comprimido. Não tomar mais de 8 comprimidos por dia (a dose máxima diária é de 16 mg).

Ou

Racecadotril 100 mg --- 1 caixa

Tomar 1 cápsula de 8/8h por até 7 dias.



ROTINA CLÍNICA

GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **Sintomáticos (Uso oral):**

Dipirona 500 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 a 2 comprimidos de 6/6h em caso de dor ou febre.

Escopolamina 10 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6/6h em caso de dor abdominal.

Bromoprida 10 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 8/8h em caso de náuseas/vômitos.

Ou

Ondansetrona 4 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 a 2 comprimidos de 8/8h em caso de náuseas/vômitos.



ROTINA CLÍNICA

GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **Hidratação com SRO (Uso oral):**

Soro de reidratação oral (SRO) ---- 6 sachês
Diluir o conteúdo de 1 sachê em 1 litro de água filtrada e tomar à vontade. Armazenar em geladeira.

A solução possui validade de 24 horas (descartar após este intervalo).

Repor 120 a 240 ml (um copo) de soro de reidratação oral para cada episódio de diarreia ou vômito.

Tomar 2 a 3 litros de líquidos por dia, sendo:
1 a 2 Litros SRO.

E mais 1 a 2 litros de outros líquidos ao longo do dia (água, água de coco, suco de frutas natural, chás, isotônico).



GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **Sintomáticos (Uso oral):**

Simeticona 125 mg ---- 20 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 6/6h em caso de gases/distensão abdominal.

- **Probiótico (Uso Oral):**

Saccharomyces boulardii 100 mg --- 06 comprimidos

Tomar 1 cápsula de 12/12h por 3 dias.

Tomar em jejum ou 30 minutos antes das refeições.



GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **Orientações gerais (Recomendações):**

Manter hidratação adequada com água filtrada, água de coco e sucos naturais (caju e goiaba, por exemplo).

Realizar alimentação balanceada, com ingesta de frutas (banana, goiaba, maçã), arroz, macarrão, cenoura e frango.



ROTINA CLÍNICA

GASTROENTERITE VIRAL AGUDA

- **Orientações: (Não recomendável):**

Diminuir ou evitar a ingestão de leite e derivados, café e bebidas que tenham cafeína e refrigerantes até resolução do quadro.

Evite também a ingestão de mamão, laranja, comidas gordurosas, chocolate, frituras, feijão, farinha, tomate, alho, temperos artificiais, Ketchup, maionese, biscoitos e doces.

- **Retornar em caso de sinais de alarme:**

Diarreia com sangue ou pus.

A diarreia durar mais que 14 dias sem melhora.

Dor intensa, localizada e persistente na barriga.

Tiver febre e calafrios persistentes.



ROTINA CLÍNICA

DISENTERIA

- **Antimicrobianos (Uso oral):**

Ciprofloxacino 500 mg ---- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 5 dias.

Ou

Levofloxacino 500 mg ---- 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.

Ou

Azitromicina 500 mg ---- 5 comprimidos

Tomar 1 comprimido uma vez ao dia por 5 dias.



ROTINA CLÍNICA

DISENTERIA

- **Antimicrobianos (Uso oral):**

Sulfametoxazol+trimetoprima 800/160 mg --
-- 10 comprimidos

Tomar 1 comprimido de 12/12h por 5 dias.

- **Retornar em caso de sinais de alarme:**

Persistência da diarreia com sangue ou pus.

A diarreia durar mais que 5 dias sem melhora.

Dor intensa, localizada e persistente na barriga.

Apresentar febre e calafrios após as primeiras 48 horas.

- **Detalhe:**

Os sintomáticos e orientações alimentares são equivalentes para Disenteria e Gastroenterite viral aguda.



DISENTERIA

Em caso de internação:

- **Antimicrobianos (Uso endovenoso):**

Racional envolve associar:

Ciprofloxacino + Metronidazol

Ciprofloxacino 400mg Solução injetável

Não é necessário reconstituição. Infundir em 60 minutos de 12/12h por 7 dias.

+

Metronidazol injetável 5mg/mL - Bolsa

Não é necessário reconstituição. Infundir em 60 minutos de 8/8h por 7 dias.

Ou

Ceftriaxona + Metronidazol (detalhado na página seguinte).



ROTINA CLÍNICA

DISENTERIA

Em caso de internação:

- **Antimicrobianos (Uso endovenoso):**

Ceftriaxona 1g F/A (dose habitual: 2g/dia)

Reconstituir cada frasco em 10 mL de água destilada. Diluir em 100 ml de soro fisiológico 0,9%, infundir em 30 minutos a 1 hora, uma vez ao dia por 7 dias.

+

Metronidazol injetável 5mg/mL - Bolsa

Não é necessário reconstituição. Infundir em 60 minutos de 8/8h por 7 dias.



ROTINA CLÍNICA