

ARBOVIROSES



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE FEBRE, MIALGIA, CEFALeia, DOR RETRO-ORBITÁRIA, ASTENIA, NÁUSEAS E/OU VÔMITOS (SEM ELEMENTOS PATOLÓGICOS), PROSTRAÇÃO, DIARREIA SEM ELEMENTOS PATOLÓGICOS, ARTRALGIA E EXANTEMA.
NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EXAME FÍSICO

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.

PELE: EXANTEMA MACULOPAPULAR DIFUSO.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

ARBOVIROSE SEM SINAIS DE ALARME


- **CONDUTA:**

- SINTOMÁTICOS POR VIA ORAL AGORA (SE NECESSÁRIO)
- REAVALIAÇÃO APÓS (SE NECESSÁRIO)
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SOBRE HIDRATAÇÃO ADEQUADA, REPOUSO E SOBRE SINAIS DE ALARME E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE




CHIKUNGUNYA

- NA **HDA** DO PACIENTE COM SUSPEITA DE CHIKUNGUNYA (FASE AGUDA), PODEM PREDOMINAR **QUEIXAS ARTICULARES (ARTRALGIA E/OU ARTRITE)**.
- NO **EXAME FÍSICO**, DURANTE AVALIAÇÃO OSTEOARTICULAR, PODEMOS ENCONTRAR: EDEMA ARTICULAR, SINAIS FLOGÍSTICOS E DOR À PALPAÇÃO E/OU MOBILIZAÇÃO ARTICULAR.
- NO DEMAIS, SEM MAIS ESPECIFICIDADES PARA A ORGANIZAÇÃO DA ANAMNESE NESSA SITUAÇÃO.



ZIKA

- NA **HDA** DO PACIENTE COM SUSPEITA DE INFECÇÃO POR ZIKA PODE OCORRER **EXANTEMA** PRECOCEMENTE (EM RELAÇÃO À DENGUE) E **CONJUNTIVITE** NÃO PURULENTA.
- NO **EXAME FÍSICO**, PODEMOS OBSERVAR EXANTEMA MACULOPAPULAR E PRESENÇA DE HIPEREMIA CONJUNTIVAL.
- NO DEMAIS, SEM MAIS ESPECIFICIDADES PARA A ORGANIZAÇÃO DA ANAMNESE DO PACIENTE COM SUSPEITA DE INFECÇÃO POR ZIKA VÍRUS.



DENGUE

- NA **HDA** DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DENGUE, EM GERAL, DESTACA-SE A PRESENÇA DE FEBRE E MIALGIA DIFUSA, ASSOCIADA COM QUEDA DO ESTADO GERAL. O SURGIMENTO DE EXANTEMA MACULOPAPULAR É MAIS TARDIO NO PACIENTE COM DENGUE (OCORRE NO FINAL DA FASE FEBRIL).
- NO **EXAME FÍSICO**, PODEMOS ENCONTRAR DIFERENTES ACHADOS, A DEPENDER DA HISTÓRIA NATURAL E DA PRESENÇA, OU NÃO, DE SINAIS DE ALARME.

