




Lista de Exercícios

Função Afim e
Função Quadrática



LISTA COM GABARITO COMENTADO

1) Observe o plano cartesiano, no qual estão representadas as funções f e g :



O ponto P de interseção entre os gráficos dessas funções possui abscissa w , cujo valor é:

- a) $\frac{5}{2}$
- b) 3
- c) $\frac{7}{2}$
- d) 4

2) Seja a função $g(x)$ do 1º grau, sabemos que $g(1) = 2$ e que $g(-1) = -4$. Determine o valor de $g(0)$:


- a) -2
- b) -1
- c) 0
- d) 1
- e) 2

3) O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado por cada uma delas era uma reta. Ele notou que quando cobrava R\$ 6,00 por fatia eram vendidas 55 fatias e quando cobrava R\$ 8,00 por fatia eram vendidas apenas 25. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por R\$ 5,00. A quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia foi de:


- a) 70.
- b) 75.
- c) 80.
- d) 85.
- e) 90.

4) Considere o sistema linear $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$. Assinale a alternativa que representa graficamente esse sistema.


a)




b)




c)



d)




e)




5) Considere o gráfico a seguir:





A lei que melhor representa a função afim $y = f(x)$ do gráfico é dada por:

- a) $f(x) = 12 - 4x$
 - b) $f(x) = 12 - 2x$
 - c) $f(x) = 12 + 6x$
 - d) $f(x) = 12 + 12x$
 - e) $f(x) = 12 - 6x$
- 6) Considere as funções polinomiais do 1º grau $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = -x + 6$. Sobre essas funções, afirma-se que:
- a) possuem pontos de máximo.
 - b) são crescentes.
 - c) possuem domínios diferentes.
 - d) têm o ponto $(1, 5)$ em comum.
 - e) suas representações gráficas não se intersectam.
- 7) A função $f: R \rightarrow R$ é uma função polinomial do 1º grau tal que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 2$, conforme mostra o gráfico.



A lei de formação da função f é:

- a) $f(x) = -\frac{2x}{5} + \frac{4}{5}$
- b) $f(x) = -3x + 2$
- c) $f(x) = -3x - 2$
- d) $f(x) = -\frac{3x}{5} + \frac{2}{5}$
- e) $f(x) = -\frac{3x}{5} + 2$

- 8) Um equipamento eletrônico utilizado por uma indústria tem seu valor monetário continuamente reduzido em função do uso e do surgimento de novas tecnologias,

dentre outros fatores. Se o valor monetário do equipamento decresce linearmente com o tempo, sabendo-se que foi adquirido há três anos pelo valor de R\$180.000,00 e que hoje está avaliado em R\$ 135.000,00, é correto afirmar que o valor monetário do equipamento daqui a dois anos será:

(Uma função real de variável real decresce linearmente se é do tipo $f(x) = ax + b$, com a e b números reais constantes e $a < 0$).

- a) R\$ 105.000,00.
- b) R\$ 115.000,00.
- c) R\$ 108.000,00.
- d) R\$ 112.000,00.

9) Uma caixa d'água, cuja capacidade é 5000 litros, tem uma torneira no fundo que, quando aberta, escoa água a uma vazão constante. Se a caixa está cheia e a torneira é aberta, depois de t horas o volume de água na caixa é dado por $V(t) = 5000 - kt$, k constante. Certo dia, estando a caixa cheia, a torneira foi aberta às 10 horas. Às 18 horas do mesmo dia, observou-se que a caixa continha 2000 litros de água. Assim, pode-se afirmar corretamente que o volume de água na caixa era 2750 litros, exatamente, às

- a) 15h.
- b) 15h40.
- c) 16h.
- d) 16h40.

10) Para uma função polinomial de 1º grau $f: R \rightarrow R$ dada por $f(x) = ax + b$, tem-se um gráfico de reta de coeficiente angular positivo. Sabe-se que $f(f(x)) = 49x + 24$.

Assinale a alternativa CORRETA que demarca o ponto de ordenada da intersecção do gráfico de f com o eixo y .

- a) -3
- b) 8
- c) 4
- d) 7
- e) 3

11) Para cada número real x , a função f é definida por $f(x) = 3x - 7$. Para os números m e n , valem $f(m) = n$ e $f(n) = 2m$. Para esses mesmos valores de m e n , é verdade que $m^2 - n^2$ é igual a:

- a) -8.
- b) -9.
- c) 16.
- d) 23.
- e) 41.


12) Um aluno distraído desmontou um relógio. Ao remontá-lo, trocou a posição dos ponteiros das horas e dos minutos, de modo que o ponteiro das horas passou a girar com a velocidade do ponteiro dos minutos, e vice-versa. Sabendo que o relógio foi acertado para as 4 horas, o intervalo que contém o horário t que marcará a hora certa novamente pela primeira vez é:

- a) $4h30min \leq t < 5h$
 b) $5h \leq t < 5h30min$
 c) $5h30min \leq t < 6h$
 d) $6h \leq t < 6h30min$
 e) $6h30min \leq t < 7h10min$

13) Uma função $f: R \rightarrow R$ definida por $f(x) = mx + n$, onde m e n são números reais não nulos, é comumente denominada de função linear afim. Quando $n = 0$ e $m \neq 0$, a função será chamada de função linear não nula. O gráfico de tais funções, quando desenhado em um plano munido de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, é uma reta. Sejam $f_1(x) = m_1x + p_1$ e $f_2(x) = m_2x + p_2$ duas funções lineares afins distintas tais que a medida do ângulo que seus gráficos formam com o eixo das abscissas (eixo dos x) são múltiplos de 45° . Se os gráficos de f_1 e f_2 se cortam no ponto $P = (5, 10)$, então, é correto afirmar que $p_1 + p_2$ é igual a:

- a) 20.
 b) 5.
 c) 15.
 d) 10.


14) Considere o gráfico da função real $f(x) = -2x + 4$, representado no plano cartesiano a seguir.



A função afim, $g(x)$, cujo gráfico é simétrico ao dessa função $f(x)$ em relação ao eixo y , é dada por:


- a) $g(x) = 2x + 4$
 b) $g(x) = 2x - 4$
 c) $g(x) = -2x - 4$
 d) $g(x) = -4x + 2$

15) No gráfico estão representadas duas funções: $f(x)$ do primeiro grau e $g(x)$ do segundo grau.




O gráfico que melhor representa a função $h(x) = f(x) + g(x)$
é:


a)




b)




c)



d)



e)



- 16) Em uma confeitoria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é de R\$ 2,00 e o preço de venda, de cada barra, é de x reais, sendo x um número inteiro. Estima-se que $(20 - x)$ barras serão vendidas por dia.


De acordo com essa estimativa, o lucro diário da venda dessas barras de chocolate, com o preço unitário de x reais, será igual a:

- a) $-x^2 + 18x - 32$
- b) $-x^2 - 18x + 40$
- c) $-x^2 - 22x + 32$
- d) $-x^2 + 22x - 40$

17. Um depósito de munições no formato retangular será construído em um campo de instrução do Exército Brasileiro. A planta da construção prevê que esse retângulo esteja inscrito em uma área cujo formato é de um triângulo isósceles de base 24m e altura 16m. A área máxima do depósito que atende a essas condições é igual a:

- a) 32 m^2
- b) 48 m^2
- c) 64 m^2
- d) 72 m^2
- e) 96 m^2

18. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta, e o ponto $P = (a, b)$, que é um dos pontos de interseção da reta com a parábola.



O valor de $a + b$ é:

- a) -7,5.
- b) -7.
- c) -6,5.
- d) -6.

19) No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual cuja origem é o ponto $E = (0,0)$, sejam P e Q os pontos extremos (máximo ou mínimo) dos gráficos das funções quadráticas $f(x) = 2(x - 3)(x + 1)$ e $g(x) = 3(2 - x)(x - 4)$. A medida da área, em uc^2 , do triângulo com vértices nos pontos E , P e Q é igual a:

Nota: uc é a unidade de comprimento usada na marcação dos pontos no sistema de coordenadas.

- a) $\frac{31}{2}$.
- b) $\frac{25}{2}$.
- c) $\frac{29}{2}$.
- d) $\frac{27}{2}$.

20) Seja uma função polinomial do segundo grau, dada por $f(x) = x^2 + mx + p$, com $m, p \in R$. Se o gráfico dessa função no plano cartesiano, intersecta o eixo x nos pontos de coordenadas $(-2, 0)$ e $(4, 0)$, então, $m + p$ é igual a:

- a) -10 .
- b) -12 .
- c) -8 .
- d) -6 .
- e) 6 .

21. No plano cartesiano, o gráfico da função quadrática $f(x) = -6x^2 + bx + c$, em que b e c são números reais, corta o eixo das abscissas nos pontos de coordenadas $(1, 0)$ e $(3, 0)$.

O valor de $f(0)$ é:

- a) -15 .
- b) -12 .
- c) -18 .
- d) -6 .
- e) -9 .

22) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço p cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$.

O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R\$ 400 acrescido de R\$ 25 por unidade produzida, ou seja:

$$C(p) = 400 + 25 \cdot Q(p)$$

Para calcular o valor A arrecadado no mês com as vendas, multiplica-se o preço unitário p pela quantidade Q de unidades vendidas no período.


O lucro mensal L apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação A e o custo C .

Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, o lucro será de:

- a) R\$ 3000,00.
- b) R\$ 3050,00.
- c) R\$ 3150,00.

- d) R\$ 3250,00.
e) R\$ 3350,00.

23) Em um plano cartesiano, a parábola descrita pela função quadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$ tem vértice no ponto V, de abscissa 2, e passa pelo ponto P de abscissa 4.



A reta que passa pelos pontos P e V intersecta o eixo y no ponto de ordenada igual a:


- a) -2.
b) -1.
c) -4.
d) -3.
e) -5.

24) A análise dos dados financeiros mensais de uma indústria de bens duráveis indicou que:

SITUAÇÃO 1: Os impostos e taxas a pagar na produção dos bens dessa indústria podem ser modelados, em reais (R\$), em função da quantidade de matéria prima necessária para a produção, em toneladas (ton), por uma linha reta.

SITUAÇÃO 2: Os impostos e taxas a pagar pela venda dos bens dessa indústria podem ser modelados, em reais (R\$), em função da quantidade de matéria prima usada na produção, em toneladas (ton), por uma linha parabólica.

O desenho a seguir indica a análise dos dados para o mês de maio de 2022 no qual se vê que há dois pontos de igualdade entre as duas situações: um para a produção e venda de 10 ton com pagamento de R\$ 16800,00 em impostos e taxas e o outro na produção e venda de 110 ton, maior quantidade que a indústria tem a capacidade de produzir por mês.




O valor máximo em impostos e taxas pagos na situação 2 é um número, em reais, do intervalo

- a) [30000, 34000[
- b) [34000, 38000[
- c) [38000, 42000[
- d) [42000, 46000[.

25) No sistema usual de coordenadas cartesianas, o gráfico da função quadrática f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Se o valor máximo que f assume é igual a 16 e se a distância entre os pontos de cruzamento do gráfico de f com o eixo das abscissas é igual a 8, então a expressão algébrica da função f é:

- a) $f(x) = -x^2 + 4x + 16$.
- b) $f(x) = -2x^2 + 2x + 16$.
- c) $f(x) = -x^2 + 16$.
- d) $f(x) = -2x^2 + 16$.

26) Em um plano cartesiano, a parábola descrita pela função $f(x) = -x^2 + bx + c$, em que b e c são números reais, intersecta os eixos coordenados nos pontos M, N e T, e as coordenadas do ponto de máximo V são $(1, 4)$.



A equação da reta que passa pelos pontos N e T é dada por

- a) $y = -x - 1$
- b) $y = x + 2$
- c) $y = -x + 3$
- d) $y = x + 5$
- e) $y = -x + 4$

27) Considere a função $f(x) = -x^2 + 6x - 8$. No plano


cartesiano, sejam P e Q as intersecções do gráfico de f com o eixo x. Sendo R = (a, b) um ponto do gráfico de f, com $b > 0$, assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR.

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 6

28) Um terreno retangular está localizado ao lado de uma margem de rio linear. Você tem à sua disposição 50 metros de arame para cercar o terreno, mas é importante observar que não é necessário cercar a margem do rio. Quais devem ser as dimensões do terreno retangular de modo a cercar a maior área possível?

- a) 10,5 m e 35 m.
- b) 12,5 m e 25 m.
- c) 10 m e 25 m.
- d) 15 m e 25 m.
- e) 20 m e 15 m.


29) Nos gráficos indicados a seguir, estão desenhadas duas parábolas que representam as funções reais h e g definidas pelas leis: $h(x) = ax^2 + bx + c$ e $g(x) = dx^2 + ex + f$ com a, b, c, d, e, f números reais não nulos.



Com base nas informações e nos gráficos, é correto afirmar, necessariamente, que

- a) $bf < -\frac{e}{2d}$
- b) $e^2 \neq 4df$
- c) $ad > f - e$
- d)

30) Em um exercício de aperfeiçoamento de Cadetes da Força Aérea Brasileira, três aeronaves estão posicionadas como indicado na figura a seguir.



Em certo momento, as aeronaves 1, 2 e 3 são vistas de um determinado ponto, seguindo uma trajetória de voo sobre a curva de uma parábola, sendo dadas suas distâncias de referência como a da figura.

Considere um plano cartesiano em que:

- as aeronaves 1, 2 e 3 estão sobre a trajetória de uma única parábola;
- a pista de aterrissagem está no eixo das abscissas;
- a posição de cada aeronave é um ponto (x, y) desse plano, onde $y = f(x)$ é a altura atingida pela aeronave, em km, em relação ao chão; e
- o eixo das ordenadas passa pela aeronave 1.

A lei da função f que satisfaz as condições estabelecidas na figura é

a) $f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)(x - m)^2$

b) $f(x) = \left(\frac{1}{m}\right)(x + m)^2$

c) $f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)(x - 2m)^2$

d) $f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)x^2$

GABARITO

1. (C)

Equação de f:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ 0 & 15 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y = -3x + 15$$

Equação de g:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y = x + 1$$

Abscissa do ponto P:

$$-3w + 15 = w + 1$$

$$-4w = -14$$

$$\therefore w = \frac{7}{2}$$

2. (B)

Como g é do 1º grau, temos que $g(x) = ax + b$. Logo:

$$\begin{cases} a \cdot 1 + b = 2 \\ a \cdot (-1) + b = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + b = 2 \\ -a + b = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -1 \end{cases}$$

$$\therefore g(x) = 3x - 1$$

Logo:

$$g(0) = 3 \cdot 0 - 1 = -1$$

3. (A)

Sendo x e y, respectivamente, o preço cobrado por fatia e o número de fatias vendidas, temos que:

$$y = ax + b$$

$$\begin{cases} 55 = 6a + b \quad (\text{I}) \\ 25 = 8a + b \quad (\text{II}) \end{cases}$$

$$(\text{I}) - (\text{II}):$$

$$30 = -2a$$

$$a = -15$$

$$b = 55 - 6 \cdot (-15) = 145$$

$$\therefore y = -15x + 145$$

Dessa forma, vendendo cada fatia por R\$ 5,00, a quantidade de fatias vendidas no dia foi de:

$$y = -15 \cdot 5 + 145$$

$$\therefore y = 70 \text{ fatias}$$

4. (E)

O ponto P de interseção entre as retas é dado por:

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 6x - 2y = 10 \end{cases} +$$

$$7x = 14 \Rightarrow x = 2$$

$$2 + 2y = 4 \Rightarrow y = 1$$

$$\therefore P = (2, 1)$$

$$\begin{aligned} \text{Ponto Q de interseção da reta } x + 2y = 4 \text{ com o eixo } y: \\ 0 + 2y = 4 \Rightarrow y = 2 \\ \therefore Q = (0, 2) \end{aligned}$$

Portanto, o sistema é representado graficamente pelo gráfico da alternativa [E].

5. (E)

$$f(x) = b + a \cdot x$$

$$f(x) = 12 + \frac{0 - 12}{2 - 0} \cdot x$$

$$f(x) = 12 - 6 \cdot x$$

6. (D)

Resolvendo o sistema com a funções, obtemos:

$$\begin{cases} y = 2x + 3 \\ y = -x + 6 \end{cases}$$

$$2x + 3 = -x + 6$$

$$3x = 3$$

$$x = 1 \text{ e } y = 5$$

Portanto, estas funções têm o ponto (1, 5) em comum.

7. (A)

Considerando que a reta de equação $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $(-3, 2)$ e $(2, 0)$, temos:

$$\begin{cases} f(2) = 0 \\ f(-3) = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a + b = 0 \\ -3a + b = 2 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos:

$$a = -\frac{2}{5} \text{ e } b = \frac{4}{5}$$

$$\text{Logo, } f(x) = -\frac{2x}{5} + \frac{4}{5}$$

8. (A)

Admitindo que V (reais) seja o valor do equipamento

eletrônico em função do tempo t (anos), temos:

$$t = 0 \Rightarrow V = 180.000$$

$$t = 3 \Rightarrow V = 135.000$$

$$t = 5 \Rightarrow V = ?$$

Determinando a taxa de variação do valor V em relação ao tempo t , temos:

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{135.000 - 180.000}{3 - 0} = -15.000 \text{ por ano.}$$

Logo, daqui a dois anos o valor será:

$$V = 135.000 - 2 \cdot 15.000$$

$$\boxed{V = R\$ 105.000}$$

9. (C)

Após $18 - 10 = 8$ horas a caixa continha 2000 litros. Logo, segue que $V(8) = 2000$ e, portanto, vem

$$2000 = 5000 - k \cdot 8 \Leftrightarrow k = 375.$$

O valor de t para o qual se tem $V(t) = 2750$ litros é dado por

$$2750 = 5000 - 375t \Leftrightarrow t = 6.$$

A resposta é $10 + 6 = 16$ h.

10. (E)

A ordenada do ponto de interseção da função f com o eixo x é dada por:

$$f(0) = a \cdot 0 + b = b$$

Da função composta, obtemos:

$$f(f(x)) = 49x + 24$$

$$af(x) + b = 49x + 24$$

$$a(ax + b) + b = 49x + 24$$

$$a^2x + ab + b = 49x + 24$$

$$\begin{cases} a^2 = 49 \\ b(a+1) = 24 \end{cases}$$

Como $a > 0$, devemos ter:

$$a = 7$$

$$b(7+1) = 24$$

$$\therefore b = 3$$

11. (B)

$$f(m) = n \Rightarrow 3m - 7 = n \Rightarrow 3m - n = 7$$

$$f(n) = 2m \Rightarrow 3n - 7 = 2m \Rightarrow -2m + 3n = 7$$

Podemos, então, considerar o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 3m - n = 7 \\ -2m + 3n = 7 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, obtemos:

$$m = 4 \text{ e } n = 5.$$

Portanto:

$$m^2 - n^2 = 4^2 - 5^2 = 16 - 25 = -9$$

12. (B)

Decorridos t minutos a partir das 4 horas, as posições angulares dos ponteiros de um relógio em perfeito estado de funcionamento são dadas por:

$$\begin{cases} \theta_{\min} = 6t \\ \theta_h = 0,5t + 120^\circ \end{cases}$$

E, para o relógio defeituoso, teremos:

$$\begin{cases} \theta'_{\min} = 0,5t \\ \theta'_h = 6t + 120^\circ \end{cases}$$

Para que o relógio marque o horário corretamente, devemos ter (com $k \in \mathbb{Q}$):

$$\begin{cases} \theta_{\min} - \theta'_{\min} = 360k \\ \theta'_h - \theta_h = 360k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6t - 0,5t = 360k \\ 6t + 120^\circ - (0,5t + 120^\circ) = 360k \end{cases} \Rightarrow t = \frac{360 \cdot 1}{5,5} \text{ min} \approx 65,5 \text{ min}$$

O 1º horário após às 4 horas em que será marcado um horário correto é dado por $k = 1$:

$$t = \frac{360 \cdot 1}{5,5} \text{ min} \approx 65,5 \text{ min}$$

O que resulta em aproximadamente 5h 5min 30s. Ou seja: $5 \text{ h} \leq t < 5 \text{ h} 30 \text{ min}$

13. (A)

Se os ângulos são múltiplos de 45° , concluímos que os possíveis coeficientes angulares são 1 ou -1 , portanto as equações das retas são:

$$f_1(x) = x + p_1 \text{ e } f_2(x) = -x + p_2$$

Considerando que o ponto $P(5, 10)$ pertence às duas retas, temos:


$$10 = 5 + p_1 \Rightarrow \boxed{p_1 = 5}$$

$$10 = -5 + p_2 \Rightarrow \boxed{p_2 = 10}$$

$$\text{Logo, } \boxed{p_1 + p_2 = 20}$$

14. (A)

A reta simétrica à reta dada, em relação ao eixo y , passa pelos pontos $(0, 4)$ e $B(-2, 0)$ como se observa na figura abaixo:



Determinando agora o coeficiente angular da reta obtemos:

$$m = \frac{4 - 0}{0 - (-2)} = 2$$

O coeficiente linear é $q = 4$, portanto a função g representada pelo gráfico será dada por $g(x) = 2x + 4$.

15. (C)

Como o gráfico de f passa pelos pontos $(-2, 0)$ e $(0, 2)$, segue que $f(x) = x + 2$. Além disso, como o gráfico de g passa pelos pontos $(0, 0)$ e $(0, 1)$, temos que

$$g(x) = ax^2 - ax, \text{ com } a > 0.$$

$$h(x) = ax^2 - (a-1)x + 2.$$

Desse modo, o gráfico de h intersecta o eixo y no ponto de ordenada 2 e tem sua concavidade voltada para cima. A abscissa do vértice do gráfico de h é dada por

$$x_v = -\frac{-(a-1)}{2a} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2a} < \frac{1}{2}.$$

Finalmente, como $f(1) = 3$ e $g(1) = 0$, segue que $h(1) = f(1) + g(1) = 3$ e, portanto, o gráfico que melhor representa a função h é o da alternativa [C].

16. (D)


O lucro diário é dado por:

$$L(x) = \underbrace{x(20-x)}_{\text{receita}} - \underbrace{2(20-x)}_{\text{custo}} = 20x - x^2 - 40 + 2x$$

$$\therefore L(x) = -x^2 + 22x - 40$$

17. (E)

Sendo x e y as dimensões do retângulo, por semelhança entre os triângulos ABC e DEC , temos:



$$\frac{x}{24} = \frac{16-y}{16}$$

$$2x = 48 - 3y$$

$$y = -\frac{2}{3}x + 16$$

A área do depósito é dada por:

$$A = xy = -\frac{2}{3}x^2 + 16x$$

Logo, a sua área máxima vale:

$$A_{\max} = y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

$$A_{\max} = -\frac{16^2 - 4 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 0}{4 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)} = \frac{256}{\frac{8}{3}} = \frac{256 \cdot 3}{8} = 96$$

$$\therefore A_{\max} = 96 \text{ m}^2$$

18. (B)

Equação da reta:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow y = 2x + 2$$

Equação da parábola:

$$y = \alpha(x+2)(x-1)$$

$$2 = \alpha(0+2)(0-1)$$

$$2 = \alpha \cdot (-2)$$

$$\alpha = -1$$

$$y = -(x+2)(x-1)$$

$$y = -(x^2 - x + 2x - 2)$$

$$y = -x^2 - x + 2$$

Ponto de interseção entre a reta e a parábola:

$$\begin{cases} y = 2x + 2 \\ y = -x^2 - x + 2 \end{cases}$$

$$2x + 2 = -x^2 - x + 2$$

$$x^2 + 3x = 0$$

$$x(x+3) = 0$$

$$x = 0 \text{ e } y = 2 \cdot 0 + 2 = 2$$

ou

$$x = -3 \text{ e } y = 2 \cdot (-3) + 2 = -4$$

Como o ponto P pertence ao 3º quadrante, devemos ter que P = (-3, -4). Logo: a + b = -3 + (-4) = -7

19. (D)

Ponto extremo de f(x):

$$\begin{cases} x_v = \frac{3+(-1)}{2} = 1 \\ y_v = 2(1-3)(1+1) = -8 \end{cases} \Rightarrow P_1 = (1, -8)$$

Ponto extremo de g(x):

$$\begin{cases} x_v = \frac{2+4}{2} = 3 \\ y_v = 3(2-3)(3-4) = 3 \end{cases} \Rightarrow P_2 = (3, 3)$$

Portanto, a área do triângulo formado vale:

$$A = \frac{1}{2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -8 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{27}{2}$$

20. (A)

Substituindo os pontos dados na função, obtemos:

$$\begin{cases} 0 = (-2)^2 + m \cdot (-2) + p \\ 0 = 4^2 + m \cdot 4 + p \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 - 2m + p = 0 & (\text{I}) \\ 16 + 4m + p = 0 & (\text{II}) \end{cases}$$

Fazendo (II) - (I):

$$12 + 6m = 0 \Rightarrow m = -2$$

$$4 - 2 \cdot (-2) + p = 0 \Rightarrow p = -8$$

Portanto:

$$m + p = -10$$

21. (C)

Sabendo que as raízes de f são $x_1 = 1$ e $x_2 = 3$, pelas Relações de Girard, temos

$$1 \cdot 3 = \frac{c}{-6} \Leftrightarrow c = -18.$$

Por conseguinte, vem $f(0) = c = -18$.

22. (E)

O lucro é dado por:

$$L(p) = p \cdot Q(p) - C(p)$$

$$L(p) = p(200-p) - [400 + 25(200-p)]$$

$$L(p) = 200p - p^2 - 400 - 5000 + 25p$$

$$L(p) = -p^2 + 225p - 5400$$

Preço para 150 unidades vendidas:

$$150 = 200 - p$$

$$p = R\$ 50,00$$

Logo, o lucro será de:

$$L(50) = -50^2 + 225 \cdot 50 - 5400$$

$$\therefore L(50) = R\$ 3350,00$$

23. (E)

Determinando as coordenadas do vértice, temos:

$$y_V = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = -1$$

$$\therefore V = (2, -1)$$

Determinando as coordenadas do ponto P:

$$y_P = 4^2 - 4 \cdot 4 + 3 = 3$$

$$\therefore P = (4, 3)$$

Seja Q(0, q) o ponto de intersecção da reta, que passa pelos pontos V e P, com o eixo y.

Logo:

$$\begin{vmatrix} 0 & q & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow 0 - 4 + 2q - (6 + 0 + 4q) = 0 \Rightarrow -2q - 10 = 0 \Rightarrow -2q = 10 \Rightarrow q = -5$$

24. (C)

Função da reta:



$$f(x) = mx + n$$

$$\begin{cases} f(0) = 15600 \\ f(10) = 16800 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m \cdot 0 + n = 15600 \\ m \cdot 10 + n = 16800 \end{cases} \Rightarrow (m, n) = (120, 15600)$$

$$\therefore f(x) = 120x + 15600$$

Para a produção e venda de 110 ton, temos:

$$f(110) = 120 \cdot 110 + 15600 = 28800$$

Função da parábola:

$$g(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{cases} g(0) = 9000 \\ g(10) = 16800 \\ g(110) = 28800 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 9000 \\ a \cdot 10^2 + b \cdot 10 + c = 16800 \\ a \cdot 110^2 + b \cdot 110 + c = 28800 \end{cases} \Rightarrow (a, b, c) = (-6, 840, 9000)$$

$$\therefore g(x) = -6x^2 + 840x + 9000$$

Portanto, o valor máximo em impostos e taxas pagos (em R\$) na situação 2 é de:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{840^2 - 4 \cdot (-6) \cdot 9000}{4 \cdot (-6)} = 38400$$

Que é um valor do intervalo [38000, 42000].

25. (C)

Seja a função f dada por:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Como f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas e o seu valor máximo é 16, devemos ter que:

$$f(0) = 16 : a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = 16 \Rightarrow c = 16$$

E a distância entre as raízes de f é igual a 8. Logo:

$$|x_1 - x_2| = 8 \Rightarrow \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = 8 \Rightarrow \frac{2\sqrt{\Delta}}{2a} = 8$$

$$\Rightarrow \sqrt{b^2 - 4ac} = 8a \Rightarrow b^2 - 64a = 64a^2 \quad (\text{I})$$

Do valor máximo de f , também obtemos:

$$y_v = -\frac{\Delta}{4a} = -\frac{b^2 - 4a \cdot 16}{4a} = 16 \Rightarrow -b^2 + 64a = 64a \quad (\text{II})$$

Somando (I) e (II), vem:

$$\begin{cases} b^2 - 64a = 64a^2 \\ -b^2 + 64a = 64a \end{cases} \Rightarrow 0 = 64a^2 + 64a \Rightarrow a(a+1) = 0 \Rightarrow a = -1 \text{ ou } a = 0 \text{ (não convém)}$$

Sendo assim, b vale:

$$b^2 - 64 \cdot (-1) = 64 \cdot (-1)^2 \Rightarrow b = 0$$

Logo, a expressão algébrica de f é:

$$f(x) = -x^2 + 16$$

26. (C)

A abscissa do vértice da parábola é 1, portanto:

$$-\frac{b}{2 \cdot (-1)} = 1 \Rightarrow b = 2$$

A ordenada do vértice é $y = 4$, logo:

$$f(1) = 4 \Rightarrow f(1) \Rightarrow -1 + 2 + c = 4 \Rightarrow c = 3$$

$$\therefore f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

Determinando os N e T, intersecções, com os eixos coordenados, obtemos:
 $N = (0, 3)$


$$-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ ou } x = -1$$

$$\therefore T = (3, 0)$$

Determinando a equação da reta que passa pelos pontos T e N, obtemos:

$$y = \frac{0 - 3}{3 - 0} \cdot x + 3 \Rightarrow y = -x + 3$$

27. (A)



Determinando as raízes da função $f(x) = -x^2 + 6x - 8$
 $-x^2 + 6x - 8 = 0$

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{4}}{2 \cdot (-1)} \Rightarrow x = 2 \text{ ou } x = 4.$$

Logo, $P(2, 0)$ e $Q(4, 0)$


A área do triângulo de base PQ = $4 - 2 = 2$ será máxima quando b for igual a ordenada do vértice.

$$b = -\frac{\Delta}{4 \cdot a} \Rightarrow b = \frac{-4}{4 \cdot (-1)} \Rightarrow b = 1.$$

Logo, a área do triângulo PQR será:

$$A = \frac{2 \cdot 1}{2} \Rightarrow A = 1$$

28. (B)



$$2x + d = 50 \Rightarrow d = 50 - 2x$$

Calculando a área do terreno em função de x , obtemos:

$$A = d \cdot x$$

$$A(x) = (50 - 2x) \cdot x$$

$$A(x) = -2x^2 + 50x$$

Para que essa área seja máxima, o valor de x deverá ser:

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-50}{2 \cdot 2} = 12,5m$$

$$\text{Logo: } d = 50 - 2x = 25m$$

Resposta: 12,5 m e 25 m.

29. (A)

De acordo com os gráficos, podemos escrever que:

$$a < 0$$

$$c < 0$$

$$-\frac{b}{2a} < 0 (\times 2a) \Rightarrow -b > 0 (\times (-1)) \Leftrightarrow b < 0$$

$$d > 0$$

$$f > 0$$


$$-\frac{e}{2d} > 0 (\times 2d) \Rightarrow -e > 0 (\times (-1)) \Leftrightarrow e < 0$$

Portanto, a opção correta é:

$$bf < -\frac{e}{2d}.$$

30. (A)

Adotando um sistema cartesiano ortogonal para a figura, podemos determinar sua equação facilmente.



Para isto utilizaremos a forma canônica do trinômio do segundo grau.

$$f(x) = a(x - xv)^2 + yv.$$

considerando que o vértice é o ponto $(m, 0)$ e também o ponto $(0, m/2)$, temos:

$$f(x) = a(x - m)^2 + 0$$

Com o ponto $(0, m/2)$, pertence a parábola, temos:


$$\frac{m}{2} = a(0 - m)^2 \Rightarrow a = \frac{1}{2m}$$

Portanto:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)(x - m)^2$$

LISTA COM GABARITO (LETRINHA)

- Observe o plano cartesiano, no qual estão representadas as funções f e g :



O ponto P de interseção entre os gráficos dessas funções possui abscissa w, cujo valor é:

- a) $\frac{5}{2}$
- b) 3
- c) $\frac{7}{2}$
- d) 4






2) Seja a função $g(x)$ do 1º grau, sabemos que $g(1) = 2$ e que $g(-1) = -4$. Determine o valor de $g(0)$:

- a) -2
- b) -1
- c) 0
- d) 1
- e) 2


3) O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado por cada uma delas era uma reta. Ele notou que quando cobrava R\$ 6,00 por fatia eram vendidas 55 fatias e quando cobrava R\$ 8,00 por fatia eram vendidas apenas 25. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por R\$ 5,00. A quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia foi de:

- a) 70.
- b) 75.
- c) 80.
- d) 85.
- e) 90.

4) Considere o sistema linear $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$. Assinale a alternativa que representa graficamente esse sistema.



5) Considere o gráfico a seguir:




A lei que melhor representa a função afim $y = f(x)$ do gráfico é dada por:

- a) $f(x) = 12 - 4x$
- b) $f(x) = 12 - 2x$
- c) $f(x) = 12 + 6x$
- d) $f(x) = 12 + 12x$
- e) $f(x) = 12 - 6x$

6) Considere as funções polinomiais do 1º grau $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = -x + 6$. Sobre essas funções, afirma-se que:

- a) possuem pontos de máximo.
- b) são crescentes.
- c) possuem domínios diferentes.
- d) têm o ponto $(1, 5)$ em comum.
- e) suas representações gráficas não se intersectam.

7) A função $f: R \rightarrow R$ é uma função polinomial do 1º grau tal que $f(2) = 0$ e $f(-3) = 2$, conforme mostra o gráfico.



A lei de formação da função f é:

- a) $f(x) = -\frac{2x}{5} + \frac{4}{5}$
- b) $f(x) = -3x + 2$
- c) $f(x) = -3x - 2$
- d) $f(x) = -\frac{3x}{5} + \frac{2}{5}$
- e) $f(x) = -\frac{3x}{5} + 2$

8) Um equipamento eletrônico utilizado por uma indústria tem seu valor monetário continuamente reduzido em função do uso e do surgimento de novas tecnologias,

entre outros fatores. Se o valor monetário do equipamento decresce linearmente com o tempo, sabendo-se que foi adquirido há três anos pelo valor de R\$ 180.000,00 e que hoje está avaliado em R\$ 135.000,00, é correto afirmar que o valor monetário do equipamento daqui a dois anos será:

(Uma função real de variável real decresce linearmente se é do tipo $f(x) = ax + b$, com a e b números reais constantes e $a < 0$).

- a) R\$ 105.000,00.
- b) R\$ 115.000,00.
- c) R\$ 108.000,00.
- d) R\$ 112.000,00.

9) Uma caixa d'água, cuja capacidade é 5000 litros, tem uma torneira no fundo que, quando aberta, escoa água a uma vazão constante. Se a caixa está cheia e a torneira é aberta, depois de t horas o volume de água na caixa é dado por $V(t) = 5000 - kt$, k constante. Certo dia, estando a caixa cheia, a torneira foi aberta às 10 horas. Às 18 horas do mesmo dia, observou-se que a caixa continha 2000 litros de água. Assim, pode-se afirmar corretamente que o volume de água na caixa era 2750 litros, exatamente, às

- a) 15h.
- b) 15h40.
- c) 16h.
- d) 16h40.

10) Para uma função polinomial de 1º grau $f: R \rightarrow R$ dada por $f(x) = ax + b$, tem-se um gráfico de reta de coeficiente angular positivo. Sabe-se que $f(f(x)) = 49x + 24$.

Assinale a alternativa CORRETA que demarca o ponto de ordenada da intersecção do gráfico de f com o eixo y .

- a) -3
- b) 8
- c) 4
- d) 7
- e) 3

11) Para cada número real x , a função f é definida por $f(x) = 3x - 7$. Para os números m e n , valem $f(m) = n$ e $f(n) = 2m$. Para esses mesmos valores de m e n , é verdade que $m^2 - n^2$ é igual a:

- a) -8.
- b) -9.
- c) 16.
- d) 23.
- e) 41.

12) Um aluno distraído desmontou um relógio. Ao remontá-lo, trocou a posição dos ponteiros das horas e dos minutos, de modo que o ponteiro das horas passou a girar com a velocidade do ponteiro dos minutos, e vice-versa. Sabendo que o relógio foi acertado para as 4 horas, o intervalo que contém o horário t que marcará a hora certa novamente pela primeira vez é:


- a) $4h30min \leq t < 5h$
- b) $5h \leq t < 5h30min$

- c) $5h30\text{min} \leq t < 6h$
d) $6h \leq t < 6h30\text{min}$
e) $6h30\text{min} \leq t < 7h10\text{min}$

13) Uma função $f: R \rightarrow R$ definida por $f(x) = mx + n$, onde m e n são números reais não nulos, é comumente denominada de função linear afim. Quando $n = 0$ e $m \neq 0$, a função será chamada de função linear não nula. O gráfico de tais funções, quando desenhado em um plano munido de um sistema de coordenadas cartesiano ortogonal, é uma reta. Sejam $f_1(x) = m_1x + p_1$ e $f_2(x) = m_2x + p_2$ duas funções lineares afins distintas tais que a medida do ângulo que seus gráficos formam com o eixo das abscissas (eixo dos x) são múltiplos de 45° . Se os gráficos de f_1 e f_2 se cortam no ponto $P = (5, 10)$, então, é correto afirmar que $p_1 + p_2$ é igual a:

- a) 20.
b) 5.
c) 15.
d) 10.


14) Considere o gráfico da função real $f(x) = -2x + 4$, representado no plano cartesiano a seguir.




A função afim, $g(x)$, cujo gráfico é simétrico ao dessa função $f(x)$ em relação ao eixo y , é dada por:

- a) $g(x) = 2x + 4$
b) $g(x) = 2x - 4$
c) $g(x) = -2x - 4$
d) $g(x) = -4x + 2$


15) No gráfico estão representadas duas funções: $f(x)$ do primeiro grau e $g(x)$ do segundo grau.



O gráfico que melhor representa a função $h(x) = f(x) + g(x)$ é:



e)



- 16) Em uma confeitoria recém-inaugurada, o preço de custo de uma barra de chocolate é de R\$ 2,00 e o preço de venda, de cada barra, é de x reais, sendo x um número inteiro. Estima-se que $(20 - x)$ barras serão vendidas por dia.


De acordo com essa estimativa, o lucro diário da venda dessas barras de chocolate, com o preço unitário de x reais, será igual a:

- a) $-x^2 + 18x - 32$
- b) $-x^2 - 18x + 40$
- c) $-x^2 - 22x + 32$
- d) $-x^2 + 22x - 40$

17. Um depósito de munições no formato retangular será construído em um campo de instrução do Exército Brasileiro. A planta da construção prevê que esse retângulo esteja inscrito em uma área cujo formato é de um triângulo isósceles de base 24m e altura 16m. A área máxima do depósito que atende a essas condições é igual a:

- a) 32 m^2
- b) 48 m^2
- c) 64 m^2
- d) 72 m^2
- e) 96 m^2

18. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta, e o ponto $P = (a, b)$, que é um dos pontos de interseção da reta com a parábola.



O valor de $a + b$ é:

- a) $-7,5$
- b) -7
- c) $-6,5$
- d) -6

- 19) No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual cuja origem é o ponto $E = (0,0)$, sejam P e Q os pontos extremos (máximo ou mínimo) dos gráficos das funções quadráticas $f(x) = 2(x - 3)(x + 1)$ e $g(x) = 3(2 - x)(x - 4)$. A medida da área, em uc^2 , do triângulo com vértices nos pontos E , P e Q é igual a:

Nota: uc é a unidade de comprimento usada na marcação dos pontos no sistema de coordenadas.

- a) $\frac{31}{2}$
- b) $\frac{25}{2}$
- c) $\frac{29}{2}$
- d) $\frac{27}{2}$

- 20) Seja uma função polinomial do segundo grau, dada por $f(x) = x^2 + mx + p$, com $m, p \in \mathbb{R}$. Se o gráfico dessa função no plano cartesiano, intersecta o eixo x nos pontos de coordenadas $(-2, 0)$ e $(4, 0)$, então, $m + p$ é igual a:

- a) -10
- b) -12
- c) -8
- d) -6
- e) 6

21. No plano cartesiano, o gráfico da função quadrática $f(x) = -6x^2 + bx + c$, em que b e c são números reais, corta o eixo das abscissas nos pontos de coordenadas $(1, 0)$ e $(3, 0)$.

O valor de $f(0)$ é:

- a) -15
- b) -12
- c) -18
- d) -6
- e) -9

- 22) Uma confecção produz calças jeans e conclui que a quantidade Q de unidades vendidas mensalmente depende do preço p cobrado por unidade conforme a função $Q(p) = 200 - p$.

O custo de produção mensal dessas calças é composto por um valor fixo de R\$ 400 acrescido de R\$ 25 por unidade produzida, ou seja:

$$C(p) = 400 + 25 \cdot Q(p)$$

Para calcular o valor A arrecadado no mês com as vendas, multiplica-se o preço unitário p pela quantidade Q de unidades vendidas no período.


O lucro mensal L apurado no mês é dado pela diferença entre a arrecadação A e o custo C .

Em um mês em que forem vendidas 150 unidades, o lucro será de:

- a) R\$ 3000,00
- b) R\$ 3050,00
- c) R\$ 3150,00

- d) R\$ 3250,00.
e) R\$ 3350,00.

23) Em um plano cartesiano, a parábola descrita pela função quadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$ tem vértice no ponto V, de abscissa 2, e passa pelo ponto P de abscissa 4.



A reta que passa pelos pontos P e V intersecta o eixo y no ponto de ordenada igual a:


- a) -2.
b) -1.
c) -4.
d) -3.
e) -5.

24) A análise dos dados financeiros mensais de uma indústria de bens duráveis indicou que:

SITUAÇÃO 1: Os impostos e taxas a pagar na produção dos bens dessa indústria podem ser modelados, em reais (R\$), em função da quantidade de matéria prima necessária para a produção, em toneladas (ton), por uma linha reta.

SITUAÇÃO 2: Os impostos e taxas a pagar pela venda dos bens dessa indústria podem ser modelados, em reais (R\$), em função da quantidade de matéria prima usada na produção, em toneladas (ton), por uma linha parabólica.

O desenho a seguir indica a análise dos dados para o mês de maio de 2022 no qual se vê que há dois pontos de igualdade entre as duas situações: um para a produção e venda de 10 ton com pagamento de R\$ 16800,00 em impostos e taxas e o outro na produção e venda de 110 ton, maior quantidade que a indústria tem a capacidade de produzir por mês.




O valor máximo em impostos e taxas pagos na situação 2 é um número, em reais, do intervalo

- a) [30000, 34000[
b) [34000, 38000[
c) [38000, 42000[
d) [42000, 46000[.

25) No sistema usual de coordenadas cartesianas, o gráfico da função quadrática f é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Se o valor máximo que f assume é igual a 16 e se a distância entre os pontos de cruzamento do gráfico de f com o eixo das abscissas é igual a 8, então a expressão algébrica da função f é:

- a) $f(x) = -x^2 + 4x + 16$.
b) $f(x) = -2x^2 + 2x + 16$.
c) $f(x) = -x^2 + 16$.
d) $f(x) = -2x^2 + 16$.

26) Em um plano cartesiano, a parábola descrita pela função $f(x) = -x^2 + bx + c$, em que b e c são números reais, intersecta os eixos coordenados nos pontos M, N e T, e as coordenadas do ponto de máximo V são (1, 4).



A equação da reta que passa pelos pontos N e T é dada por

- a) $y = -x - 1$
b) $y = x + 2$
c) $y = -x + 3$
d) $y = x + 5$
e) $y = -x + 4$

27) Considere a função $f(x) = -x^2 + 6x - 8$. No plano


cartesiano, sejam P e Q as intersecções do gráfico de f com o eixo x. Sendo $R = (a, b)$ um ponto do gráfico de f , com $b > 0$, assinale a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível da área do triângulo PQR.

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 6

28) Um terreno retangular está localizado ao lado de uma margem de rio linear. Você tem à sua disposição 50 metros de arame para cercar o terreno, mas é importante observar que não é necessário cercar a margem do rio. Quais devem ser as dimensões do terreno retangular de modo a cercar a maior área possível?

- a) 10,5 m e 35 m.
- b) 12,5 m e 25 m.
- c) 10 m e 25 m.
- d) 15 m e 25 m.
- e) 20 m e 15 m.

29) Nos gráficos indicados a seguir, estão desenhadas duas parábolas que representam as funções reais h e g definidas pelas leis: $h(x) = ax^2 + bx + c$ e $g(x) = dx^2 + ex + f$ com a, b, c, d, e, f números reais não nulos.



Com base nas informações e nos gráficos, é correto afirmar, necessariamente, que

- a) $bf < -\frac{e}{2d}$
- b) $e^2 \neq 4df$
- c) $ad > f - e$
- d)

1. (C)

2. (B)

3. (A)


4. (E)

5. (E)

6. (D)

7. (A)

30) Em um exercício de aperfeiçoamento de Cadetes da Força Aérea Brasileira, três aeronaves estão posicionadas como indicado na figura a seguir.



Em certo momento, as aeronaves 1, 2 e 3 são vistas de um determinado ponto, seguindo uma trajetória de voo sobre a curva de uma parábola, sendo dadas suas distâncias de referência como a da figura.

Considere um plano cartesiano em que:

- as aeronaves 1, 2 e 3 estão sobre a trajetória de uma única parábola;
- a pista de aterrissagem está no eixo das abscissas;
- a posição de cada aeronave é um ponto (x, y) desse plano, onde $y = f(x)$ é a altura atingida pela aeronave, em km, em relação ao chão; e
- o eixo das ordenadas passa pela aeronave 1.

A lei da função f que satisfaz as condições estabelecidas na figura é

- a) $f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)(x - m)^2$
- b) $f(x) = \left(\frac{1}{m}\right)(x + m)^2$
- c) $f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)(x - 2m)^2$
- d) $f(x) = \left(\frac{1}{2m}\right)x^2$

Gabarito:

8. (A)

9. (C)

10. (E)

11. (B)

12. (B)

13. (A)

14. (A)

- | | |
|---------|---------|
| 15. (C) | 23. (E) |
| 16. (D) | 24. (C) |
| 17. (E) | 25. (C) |
| 18. (B) | 26. (C) |
| 19. (D) | 27. (A) |
| 20. (A) | 28. (B) |
| 21. (C) | 29. (A) |
| 22. (E) | 30. (A) |

