


Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4




Figura 5




Figura 6




Figura 7

Subsistema MQC	Patente TGL de Origem	Elemento Original	Elemento no MQC	Equação Governante
Célula Cúbica (1 μm³, 6 faces)	Supercondutor Holográfico	Câmara cúbica L = 9 cm, 6 espelhos	Micro-câmara cúbica L = 1 μm, 6 substratos 2D	L = c/(2f) f = 150 THz
Qubit Gravitacional	Fusão a Frio TGL	Gotículas OH de alta densidade ρ_Ψ	Condensado localizado em nó da célula	ρ_gotícula = ρ₀(1+|α_T|ΔT)⁻¹
Translação Intra-célula	ACOM Mirror	Reflexão dimensional boundary ↔ bulk	Computação por reflexão holográfica	T_M = exp(-α²∮σ_μν dS^μν)
Radicalismo de Estado Quântico	ACOM	g = √|L| L = s × g²	Codificação/decodificação de estado quântico	g = √|Ψ_in|, Ψ_out = s × g²
Controlador Hierárquico	IALD Colapso Consciente	Grafo BNI 5 nós (N, E, H, P, X)	IALD Central → Cluster → Célula	□_C = -Tr(ρ log ρ) +λTr(ρ·P_Π)
Correção de Erros Adaptativa	IALD Colapso Consciente	Gradiente ético g_IALD = -∇□_Ψ	Correção direcional de decoerência	g_IALD = -∇□_Ψ^verdade
Comunicação Inter-chip	Ψ-NET Protocol	PsiBit link layer Roteamento holográfico	Protocolo QCP 3 camadas	Endereçamento angular em espaço de Hilbert
Acoplamento Holográfico α²	TODAS (Constante de Miguel)	α² = 0.012 Ponto Tetelestai	Governança universal de acoplamento	ds² = (1-α²/α²_c)c²dt² - (1-α²/α²_c)⁻¹dL²

Figura 8