

29.1 数据的代表

知识清单

- 知识1 平均数
知识2 加权平均数
知识3 中位数
知识4 众数
知识5 平均数、中位数、众数的优缺点



知识 1 平均数



一般地,对于 n 个数 x_1, x_2, \dots, x_n , 我们把 $\frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ 叫做这 n 个数的算术平均数, 简称平均数, 记作“ \bar{x} ”, 读作“ x 拔”。



温馨提示

①平均数、数的个数以及所有数的总和这三个量中, 已知任意两个就能求出第三个, 平均数 = $\frac{\text{所有数的总和}}{\text{数的个数}}$ 。


②平均数是描述一组数据的一种常用指标。一组数据的平均数只有一个。

③平均数的大小与一组数据里的每个数据均有关系, 其中任一数据的变动都会引起平均数的变动。平均数容易受个别极端值影响。

④数据 x_1, x_2, \dots, x_n 的平均数为 \bar{x} , 则 $x_1 \pm a, x_2 \pm a, \dots, x_n \pm a$ 的平均数为 $\bar{x} \pm a$; kx_1, kx_2, \dots, kx_n 的平均数为 $k\bar{x}$ (a, k 为常数)。

⑤总体中所有个体的平均数叫做总体平均数, 样本中所有个体的平均数叫做样本平均数, 通常用样本平均数去估计总体平均数。

例 1 某住宅小区六月份中 1 至 6 日每天用水量变化情况如折线图所示, 那么这 6 天的平均每天用水量是 ()



A. 30 吨

B. 31 吨

C. 32 吨

D. 33 吨

解析 根据平均数的定义可得这 6 天平均每天的用水量为 $\frac{30+34+32+37+28+31}{6} = 32$ (吨), 故选 C。

答案 C

知识 2 加权平均数



当一组数据中有数据重复出现时, 如在 n 个数据中, x_1 出现 f_1 次, x_2 出现 f_2 次, \dots, x_k 出现 f_k 次 (这里 $f_1 + f_2 + \dots +$

$f_k = n$), 那么这 n 个数据的平均数可表示为 $\frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}$, 这个平均数也叫做加权平均数, 其中 f_1, f_2, \dots, f_k 分别叫做 x_1, x_2, \dots, x_k 的权。

或者, 若 n 个数 x_1, x_2, \dots, x_n 的权分别是 w_1, w_2, \dots, w_n , 则 $\frac{x_1 w_1 + x_2 w_2 + \dots + x_n w_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}$ 叫做这 n 个数的加权平均数。




温馨提示

①加权平均数实际上是算术平均数的另一种表现形式。

②若各个数据的权相同, 则加权平均数就是算术平均数, 而可以看出算术平均数实质上是加权平均数的一种特例。

③算术平均数是用一组数据的和除以数据的个数来计算的; 加权平均数在计算上与算术平均数有所不同, 是因为在实际问题中数据的“重要程度”未必相同, 即各个数据的“权”未必相同。

例 2 射击比赛中, 某队员 10 次射击成绩如图所示, 则该队员的平均成绩是 _____ 环。



解析 由条形图可知, 该队员的平均成绩为

$$\frac{6 \times 1 + 7 \times 1 + 8 \times 2 + 9 \times 4 + 10 \times 2}{1 + 1 + 2 + 4 + 2} = 8.5 \text{ (环)}.$$

答案 8.5

知识 3 中位数



中位数

将一组数据按大小顺序排列后, 处于中间位置的数叫做这组数据的中位数。如果数据的个数为奇数, 那么处于中间位置的一个数据是这组数据的中位数; 如果数据的个数为偶数, 那么处于中间位置的两个数据的平均数是这组数据的中位数。

温馨提示


(1) 求中位数的步骤: ①排序: 由小到大或由大到小; ②结果: 如果数据的个数 n 是奇数, 那么第 $\frac{n+1}{2}$ 个数是中位数;

如果数据的个数 n 是偶数, 那么第 $\frac{n}{2}$ 个和第 $\frac{n}{2} + 1$ 个数的平均数是中位数。

(2) 一组数据的中位数是唯一的, 它可能是原数据中的一个数, 也可能不是原数据中的数。

(3) 由一组数据的中位数可以知道中位数以上和以下的各数据各占一半。

例3 某校为了解全校学生“五一”假期参加社团活动的情况,抽查了100名学生,统计他们假期参加社团活动的时间,绘成频数分布直方图(如图),则参加社团活动时间的中位数所在的范围是 ()



- A. 4~6 小时
- B. 6~8 小时
- C. 8~10 小时
- D. 不能确定

解析 100 个数,排序后,中间的两个数为第 50 个数和第 51 个数,而第 50 个数和第 51 个数都落在第三组,所以参加社团活动时间的中位数所在的范围为 6~8 小时.故选 B.

答案 B

例4 某校开展了主题为“青春梦想”的艺术作品征集活动,从八年级五个班收集到作品的数量(单位:件)分别为 42,50,45,46,50;从九年级六个班收集到作品的数量(单位:件)分别为 43,50,47,50,49,40,则八、九年级这两组数据的中位数分别是_____.

解析 八年级的这组数据从小到大排列为 42,45,46,50,50,

处在最中间的数是 46,所以这组数据的中位数是 46.

九年级的这组数据从小到大排列为 40,43,47,49,50,50.

处在最中间的有两个数据 47 和 49,它们的平均数是 48,所以这组数据的中位数是 48.

答案 46,48

知识 4 众数

众数就是一组数据中出现次数最多的数据. 一组数据中,众数可能不止一个,它同平均数、中位数一样,都反映了一组数据的集中趋势.

温馨提示

①如果一组数据中有若干个数据的频数一样,都是最大的,那么这若干个数据都是这组数据的众数,即一组数据的众数可以不唯一.

②一组数据的众数一定出现在这组数据中,众数是一组数据中出现次数最多的数据,而不是数据出现的次数.

③众数的大小只与这组数据中部分数据有关,当一组数据中有个别数据多次重复出现,以至于其他数据的作用显得相对较小时,众数可以在某种意义上代表这组数据的整体情况.

例5 求下列各组数据的众数:

- (1) 5,6,8,16,16;
- (2) 75,90,90,85,90,95,85,100,85;
- (3) 1,2,3,4,5.

解析 (1) 这组数据中,16 出现了两次,次数最多,则众数是 16.

(2) 这组数据中,85 和 90 各出现了 3 次,次数最多,则众数是 85 和 90.

(3) 这组数据中,各个数据出现的次数相同,则众数不存在.

知识 5 平均数、中位数、众数的优缺点

	优点	缺点	联系
平均数	平均数能充分利用各数据提供的信息,在实际生活中常用样本的平均数估计总体的平均数	在计算平均数时,所有的数据都参与运算,所以它易受极端值的影响	平均数、中位数和众数都是描述一组数据的集中趋势的特征数
中位数	中位数不受个别偏大或偏小数据的影响,当一组数据中的个别数据变动较大时,一般用中位数来描述数据的集中趋势	不能充分地利用各数据的信息	
众数	众数考察的是各数据所出现的频数,其大小只与部分数据有关,当一组数据中某些数据多次重复出现时,众数往往更能反映问题	当各数据重复出现的次数大致相等时,它往往就没有什么特别意义	


方法清单

- 方法1 平均数、中位数、众数的计算方法
- 方法2 加权平均数的应用方法
- 方法3 选择合适的统计量解决问题
- 方法4 求统计图表中的“三数”的方法

方法 1 平均数、中位数、众数的计算方法

对一组数据的平均数、中位数、众数要严格按照其定义进行计算,特别是中位数的计算,要注意数据个数是奇数还是偶数,数据个数为奇数时,其中位数是排序后处于中间位置的数,数据个数为偶数时,其中位数是排序后中间两个数的平均数.一组数据的平均数、中位数只有一个,而众数可能不止一个.

例1 在光明中学组织的全校师生迎“五四”诗词大赛中,来自不同年级的25名参赛同学的得分情况如图所示.这些成绩的中位数和众数分别是 ()



- A. 96分、98分 B. 97分、98分
C. 98分、96分 D. 97分、96分


解析 由题图可知,得98分的人数最多,有9人,故这些成绩的众数是98分;由题图可知,得100分的有3人,得98分的有9人,得96分的有8人,得94分的有5人,把这些成绩按从小到大的顺序排列后,最中间(第13个数)的成绩是96分,所以中位数是96分,故选A.

答案 A

方法2 加权平均数的应用方法

在实际问题中,如果一组数据的“重要程度”不相同,求其平均数需采用加权平均数的计算方法.计算时要根据所给数据的特征,正确识别数据的“重要程度”,进而利用加权平均数进行进一步的分析与决策.

例2 某超市销售A,B,C,D四种矿泉水,它们的单价依次是5元、3元、2元、1元.某天的销售情况如图所示,则这天销售的矿泉水的平均单价是 ()



- A. 1.95元 B. 2.15元 C. 2.25元 D. 2.75元

解析 这天销售的矿泉水的平均单价为 $5 \times 10\% + 3 \times 15\% + 2 \times 55\% + 1 \times 20\% = 2.25$ (元),故选C.

答案 C

例3 某市某学校招聘数学教师,本次招聘进行专业技能笔试和课堂教学展示两项考核,这两项考核的满分均为100分,学校将这两项考核的得分按一定的比例计算出总成绩.经统计,参加考核的4名考生的两项考核的得分如下表所示:

考生序号	1	2	3	4
专业技能笔试	90	70	86	75
课堂教学展示	70	90	80	86

经过计算,1号考生的总成绩为78分.

(1)求专业技能笔试得分和课堂教学展示得分分别占总成绩的百分比;

(2)若学校录取总成绩最高的考生,通过计算说明4名

考生中哪一名考生会被录取.

解析 (1)设专业技能笔试得分占总成绩的百分比为 a ,则课堂教学展示得分占总成绩的百分比为 $1-a$,根据题意,得 $90a + 70(1-a) = 78$,解得 $a = 40\%$,所以 $1-a = 60\%$,故专业技能笔试得分占总成绩的40%,课堂教学展示得分占总成绩的60%.

(2)根据(1)中的比例计算得,

2号考生的总成绩为 $70 \times 40\% + 90 \times 60\% = 82$ (分),

3号考生的总成绩为 $86 \times 40\% + 80 \times 60\% = 82.4$ (分),

4号考生的总成绩为 $75 \times 40\% + 86 \times 60\% = 81.6$ (分),

\therefore 3号考生会被录取.

方法3 选择合适的统计量解决问题

当一组数据中某个数据特别大时,平均数不能反映这组数据的集中趋势,应选用中位数或众数来代表该组数据的“平均水平”.平均数、中位数和众数都是用来刻画数据平均水平的统计量,平均数常用于表示统计对象的一般水平,中位数表示这组数据的中等水平,而众数刻画了数据中出现次数最多的情况.

例4 下表是随机抽取的某公司部分员工的月收入资料:

月收入/元	45 000	18 000	10 000	5 500	5 000	3 400	3 000	2 000
人数	1	1	1	3	6	1	11	2

(1)请计算以上样本的平均数和中位数;

(2)甲、乙两人分别用样本平均数和中位数来推断公司全体员工月收入水平,请你写出甲、乙两人的推断结论.

解析 (1)样本的平均数 $\bar{x} =$

$$\frac{45\,000 + 18\,000 + 10\,000 + 5\,500 \times 3 + 5\,000 \times 6 + 3\,400 + 3\,000 \times 11 + 2\,000 \times 2}{1 + 1 + 1 + 3 + 6 + 1 + 11 + 2}$$

$= 6\,150$ (元).

这组数据共有26个,按月收入从高到低排列后,第13、14个数据分别是3 400、3 000,所以样本的中位数是 $\frac{3\,400 + 3\,000}{2} = 3\,200$ (元).

(2)甲:由样本平均数为6 150元推断公司全体员工月平均收入大约为6 150元.


乙:由样本中位数为3 200元推断公司全体员工大约有一半的员工月收入超过3 200元,有一半的员工月收入不足3 200元.

方法4 求统计图表中的“三数”的方法

表示数据的主要工具是统计图表,条形统计图、扇形统计图、折线统计图是三种常用的统计图.三种统计图表示数据时都有形象直观、见图知意的优点.利用各数据提供的信息,便可计算平均数和中位数;根据各数据所出现的频数,就可确定众数.

例5 某班同学数学测验成绩的统计表和扇形统计图如下:

人数	a	16	b	2
成绩/分	90	80	71	65



则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$; $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $y = \underline{\hspace{2cm}}$; 测验成绩的中位数是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 众数是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 平均数是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解析 由题表可知,成绩为 80 分和 65 分的共有 18 人,占总人数的 $1-25\%-30\%=45\%$, \therefore 班级总人数为 $18 \div 45\% = 40$, $\therefore a = 40 \times 30\% = 12$, $b = 40 \times 25\% = 10$, $x = \frac{16}{40} \times 100\% = 40\%$, $y = \frac{2}{40} \times 100\% = 5\%$,从而求得测验成绩的中位数为 80 分,众数为 80 分,平均数为 80 分.

答案 12;10;40%;5%;80分;80分;80分

29.2 数据的波动

知识清单

知识 方差

知识 方差

1. 在一组数据 x_1, x_2, \dots, x_n 中, 各数据与它们的平均数的差的平方的平均数叫做这组数据的方差, 通常用 s^2 表示, 即

$$s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2].$$

2. 方差的计算方法有如下三种:

①定义法:就是利用上面方差的定义公式计算.

②原始数据计算法:当数据较小时,可直接利用原始数据
据进行计算: $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) - n\bar{x}^2]$.

③新数据算法:当数据较大且比较集中时,可以依照简化平均数的计算方法,将每个数据同时减去与它们的平均数接近的常数 a ,得到一组新数据: $x'_1 = x_1 - a, x'_2 = x_2 - a, \dots, x'_n = x_n - a$, 那么 $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1'^2 + x_2'^2 + \dots + x_n'^2) - nx\overline{x'^2}]$.

3.求方差的步骤:求方差的步骤可概括为一均,二差,三方,四再均.即第一步求原数据的平均数,第二步求原数据中各数据与平均数的差,第三步求所得各个差的平方,第四步求所得各平方数的平均数.



温馨提示

①方差反映的是数据在它的平均数附近波动的情况,是用来衡量一组数据波动大小的量.

②方差能够反映所有数据的信息,因而在刻画数据波动情况时比极差更准确.方差越大,数据波动越大;方差越小,数据波动越小.只有当两组数据的平均数相等或接近时,才能用方差比较它们波动的情况.

③一组数据的每个数据都变为原来的 k 倍, 则所得的一组新数据的方差将变为原数据方差的 k^2 倍.

④方差的单位是原数据单位的平方,在具体使用时可不标注单位.

例 已知一个样本的方差 $s^2 = \frac{1}{11}[(x_1 - 6)^2 + (x_2 - 6)^2 + \dots + (x_{11} - 6)^2]$, 则这个样本的容量是 _____, 样本的平均数 _____.

解析 样本方差的公式为 $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 n 为样本数据的个数, \bar{x} 为平均数, 故这个样本的容量为 11, 样本的平均数为 6.

答案 11;6

知识拓展

1. 极差

一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做极差,即
极差=最大值-最小值.极差反映了这组数据的变化范围.



温馨提示

①在对一组数据的波动情况进行粗略估计时,经常用极差.

②极差是由数据中的两个极端值所决定的,当个别极端值远离其他数据时,极差往往不能反映全体数据的实际波动情况.

③极差小,平均数对这组数据的一般水平的代表性就大;极差大,平均数对这组数据的一般水平的代表性就小.

例 在九年级体育测试中,某班参加仰卧起坐测试的一组女生(每组8人)的测试成绩如下(单位:次/分):46,44,45,42,48,46,47,45,则这组数据的极差为 ()

A.2

B.4

C.6

D.8

解析 $\because 46, 44, 45, 42, 48, 46, 47, 45$ 中最大的数是 48, 最小的数是 42,

∴ 这组数据的极差为 $48-42=6$, 故选 C.

答案 C

2.极差与方差的区别与联系

(1) 极差与方差的区别

①极差反映的仅仅是数据的变化范围;方差反映的是数据在它的平均数附近波动的情况.

②计算极差时,只需要计算数据的最大值与最小值的差即可,而方差的计算就要复杂得多.方差是一组数据中各个数据与这组数据平均数的差的平方的平均数.

(2) 极差与方差的关系

极差、方差都是用来描述一组数据波动情况的,常用来比较两组数据波动的大小,极差、方差越小,波动越小,进而知这组数据比较稳定;极差、方差越大,波动越大,进而知这组数据不稳定.

3. 标准差

方差的算术平方根叫做这组数据的标准差,用“s”表示,即

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]}.$$



温馨提示

①标准差的单位与原数据一致.

②标准差也用来描述一组数据波动情况,常用来比较两组数据波动的大小.

方法清单

- 方法1 方差的性质的应用方法
- 方法2 极差、方差的应用方法
- 方法3 利用方差进行决策的方法

方法1 方差的性质的应用方法

若题目中已知一组数据的方差,而另一组数据又是由原始数据中每个数据通过一定四则运算得到的,则可用方差的性质求解另一组数据的方差,例如:一组数据 x_1, x_2, \cdots, x_n 的方差为 s^2 , 则 (1) $x_1 \pm b, x_2 \pm b, \cdots, x_n \pm b$ 的方差为 s^2 ; (2) $ax_1 \pm b, ax_2 \pm b, \cdots, ax_n \pm b$ 的方差为 $a^2 s^2$.

例1 (1) 如果将一组数据中的每一个数据都加上同一个非零常数,那么这组数据的 ()

- A. 平均数和方差都不变
- B. 平均数不变, 方差改变
- C. 平均数改变, 方差不变
- D. 平均数和方差都改变

(2) 一组数据的方差为 s^2 , 将这组数据中的每个数都除以 2, 所得新数据的方差是 ()

- A. $\frac{1}{2} s^2$
- B. $2 s^2$
- C. $\frac{1}{4} s^2$
- D. $4 s^2$

(3) 已知一组数据 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数是 2, 方差是 $\frac{1}{3}$, 那么另一组数据 $3x_1 - 2, 3x_2 - 2, 3x_3 - 2, 3x_4 - 2, 3x_5 - 2$ 的平均数和方差分别为 ()

- A. $2, \frac{1}{3}$
- B. $2, 1$
- C. $4, \frac{2}{3}$
- D. $4, 3$


解析 若 x_1, x_2, \cdots, x_n 的平均数为 \bar{x} , 方差为 s^2 , 则 (1) $x_1 \pm a, x_2 \pm a, \cdots, x_n \pm a$ 的平均数为 $\bar{x} \pm a$, 方差不变; (2) kx_1, kx_2, \cdots, kx_n 的平均数为 $k\bar{x}$, 方差为 $k^2 s^2$; (3) $kx_1 + a, kx_2 + a, \cdots, kx_n + a$ 的平均数为 $k\bar{x} + a$, 方差为 $k^2 s^2$.

答案 (1) C (2) C (3) D

方法2 极差、方差的应用方法

极差反映数据的波动范围, 计算方便. 方差反映数据的稳定性, 方差越大, 说明其稳定性越差; 方差越小, 说明其稳定性越好.

例2 根据李飞与刘亮射击训练的成绩绘制了如图所示的折线统计图.



根据折线统计图所提供的信息, 若要推荐一位成绩较稳定的选手去参赛, 应推荐 ()

- A. 李飞或刘亮
- B. 李飞
- C. 刘亮
- D. 无法确定

解析 李飞的成绩 (单位: 环) 为 5、8、9、7、8、9、10、8、9、7,

则李飞成绩的平均数为 $\frac{5+7+8+8+9+7+8+9+10+8}{10} = 8$ (环),

\therefore 李飞成绩的方差为 $\frac{1}{10} \times [(5-8)^2 + 2 \times (7-8)^2 + 3 \times (8-8)^2 + 3 \times (9-8)^2 + (10-8)^2] = 1.8$;

刘亮的成绩 (单位: 环) 为 7、8、8、9、7、8、8、9、7、9,

则刘亮成绩的平均数为 $\frac{7+8+8+9+7+8+8+9+7+9}{10} = 8$ (环),

\therefore 刘亮成绩的方差为 $\frac{1}{10} \times [3 \times (7-8)^2 + 4 \times (8-8)^2 + 3 \times (9-8)^2] = 0.6$.

$\therefore 0.6 < 1.8$,

\therefore 应推荐刘亮, 故选 C.

答案 C

例 3 下表是甲、乙两名同学近五次数学测试(满分均为 100 分)的成绩统计表.

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
甲	90	88	92	94	91
乙	90	91	93	94	92

根据上表中数据,成绩较好且比较稳定的同学是_____.

思路分析 一组数据的平均数反映这组数据的平均水平,平均分越高成绩越好.方差反映一组数据在其平均数附近波动的大小,方差越大,数据波动就越大,越不稳定;方差越小,数据波动就越小,越稳定.

$$\text{解析 } \bar{x}_{\text{甲}} = \frac{90+88+92+94+91}{5} = 91(\text{分}),$$

$$\bar{x}_{\text{乙}} = \frac{90+91+93+94+92}{5} = 92(\text{分}),$$

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{5} \times [(90-91)^2 + (88-91)^2 + (92-91)^2 + (94-91)^2 + (91-91)^2] = 4,$$

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{5} \times [(90-92)^2 + (91-92)^2 + (93-92)^2 + (94-92)^2 + (92-92)^2] = 2.$$

$$\because \bar{x}_{\text{甲}} < \bar{x}_{\text{乙}}, s_{\text{乙}}^2 < s_{\text{甲}}^2,$$

\therefore 成绩较好且比较稳定的同学是乙.


答案 乙

方法 3 利用方差进行决策的方法

在分析数据时,往往要求数据的平均数,当数据的平均水平一致时,为了更好地根据统计结果进行合理的判断和

预测,我们往往会根据方差来判断数据的稳定性,从而得到正确的决策.

例 4 甲、乙两名射击运动员进行射击比赛,两人在相同条件下各射击 10 次,射击的成绩如图所示.



根据图中信息,回答下列问题:

(1) 求甲的平均数与乙的中位数;

(2) 分别计算甲、乙成绩的方差,并从计算结果分析哪位运动员的射击成绩更稳定.

$$\text{解析 } (1) \text{ 甲的平均数为 } \frac{6+10+8+9+8+7+8+10+7+7}{10} =$$

8, 乙的中位数是 7.5.

$$(2) \text{ 乙的平均数为 } \frac{1}{10} \times (7+10+7+7+9+8+7+9+9+7) =$$

8,

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{1}{10} \times [(6-8)^2 + 2 \times (10-8)^2 + 3 \times (8-8)^2 + (9-8)^2 + 3 \times$$

$$(7-8)^2] = 1.6,$$

$$s_{\text{乙}}^2 = \frac{1}{10} \times [5 \times (7-8)^2 + (8-8)^2 + 3 \times (9-8)^2 + (10-8)^2] =$$

1.2.

$$\because s_{\text{乙}}^2 < s_{\text{甲}}^2,$$

\therefore 乙运动员的射击成绩更稳定.