

ASISTENCIA VITAL

Manual de Emergencia - Esquema Rojo

1. EVALUACIÓN INICIAL (PAS)

La seguridad es la prioridad absoluta. Antes de actuar, siga el protocolo internacional **PAS**:


- **Proteger:** Asegure el entorno para usted, la víctima y los testigos.
- **Avisar:** Contacte a emergencias (911/103/107) indicando ubicación y estado.
- **Socorrer:** Comience las maniobras de auxilio solo si el lugar es seguro.

2. RCP (MANOS ÚNICAMENTE)

Si la persona no responde y no respira con normalidad, su corazón se ha detenido. Usted debe actuar como su bomba circulatoria:

- Coloque el talón de una mano en el centro del pecho.
- Entrelace la otra mano encima.
- Comprima fuerte y rápido (100-120 latidos por minuto) a una profundidad de 5-6 cm.
- Permita que el pecho regrese a su posición original entre compresiones.

PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS: COLOCACIÓN DE LAS MANOS PARA COMPRESIONES TORÁCICAS DE RCP




3. ATRAGANTAMIENTO (HEIMLICH)

Utilice esta maniobra solo si la persona no puede toser, hablar o respirar (obstrucción total):

- Abrazar a la persona por detrás, por debajo de sus brazos.
- Poner el puño cerrado 2 dedos por encima del ombligo.
- Cubrir el puño con la otra mano.
- Presionar fuerte hacia adentro y hacia arriba (movimiento en J) hasta que el objeto sea expulsado.

MANIOBRA DE HEIMLICH: TÉCNICA DE DESOBSTRUCCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS



Rojo: Mano Principal (Fuerza de Empuje)/Dirección de Acción, Blanco: Mano Secundaria/Estructuras Pasivas, Líneas Técnicas: Estructuras Anatómicas y Puntos de Referencia.

4. HEMORRAGIAS GRAVES

Presión Directa:

Cubra la herida con una gasa o tela limpia y aplique presión firme con ambas manos sin detenerse.



Uso de Torniquete:

Si la presión no detiene el sangrado en una extremidad o hay una amputación:

- Colocar 5-8 cm por encima de la herida (entre la herida y el corazón).
- Ajustar hasta que el sangrado se detenga.
- Anotar la hora de aplicación. **Nunca aflojar una vez puesto.**

