

Introducción a las EDP para fluidos

Rafa Rodríguez Galván

May 15, 2020

Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP)

Tipos de EDP (lineales y de orden ≤ 2):

- ▶ Ecuaciones **Elípticas**

Ejemplo canónico: *ecuación de Poisson*:

$$\Delta u = f$$

- ▶ Ecuaciones **Parabólicas**

Ejemplo canónico: *ecuación del calor*:

$$u_t - \Delta u = f$$

- ▶ Ecuaciones **Hiperbólicas**

Ejemplo canónico: *ecuación de transporte (o convección)*:

$$u_t + v \nabla u = f, \quad \text{donde } v \text{ es un dato (vector que transporta a } u)$$

Métodos numéricos para resolución aproximada de EDP:

- ▶ **Método de las Diferencias Finitas (MDF)** Usado para ecuaciones Elípticas, Parabólicas e Hiperbólicas
- ▶ **Método de los Volúmenes Finitos (MVF)** Usado para ecuaciones Hiperbólicas
- ▶ **Método de los Elementos Finitos (MEF)** Usado para ecuaciones Elípticas y Parabólicas

Ecuaciones de Navier-Stokes

- Sea Ω un dominio de \mathbb{R}^d , $d = 3$.
- *Incógnitas:*
 - $u = (u, v, w)$: campo de velocidades. u, v y w son funciones $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$
 - p : presión, $p : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$
- *Datos:*
 - $\nu > 0$: coeficiente de viscosidad (cintemática)
 - $f = (f_1, f_2, f_3)$ fuerza externa que actúa sobre el fluido (por ejemplo, gravedad)
- *Ecuaciones de Navier-Stokes:*

$$u_t + u \cdot \nabla u - \nu \Delta u + \partial_x p = f_1 \text{ en } \Omega \quad (1)$$

$$v_t + u \cdot \nabla v - \nu \Delta v + \partial_y p = f_2 \text{ en } \Omega \quad (2)$$

$$w_t + u \cdot \nabla w - \nu \Delta w + \partial_z p = f_3 \text{ en } \Omega \quad (3)$$

$$\nabla \cdot u = 0. \quad (4)$$

Los términos más "delicados" (de convección o transporte no lineal)

$$u \nabla u = (u, v, w) \cdot (\partial_x u, \partial_y u, \partial_z u)^T \quad (5)$$

$$= u \partial_x u + v \partial_y u + w \partial_z u \quad (6)$$

$$u \nabla v = u \partial_x v + v \partial_y v + w \partial_z v \quad (7)$$

$$u \nabla w = u \partial_x w + v \partial_y w + w \partial_z w \quad (8)$$

Flujos potenciales (irrotacionales) e incompresibles

- Suponemos que existe una función potencial, Φ , tal que el flujo se puede obtener como el gradiente de este potencial, es decir

$$u = \Psi_x, \quad v = \Psi_y$$

.

- Entonces, el flujo es **irrotacional**:

$$\text{rot}(u, v, w) = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + (v_x - u_y) \cdot \vec{k} = 0,$$

pues

$$v_x - u_y = (\Psi_y)_x - (\Psi_x)_y = \Psi_{yx} - \Psi_{xy} = \Psi_{xy} - \Psi_{xy} = 0.$$

- Si además el potencial es solución de un problema de Laplace, del tipo

$$-\Delta \Psi = 0 \quad \text{en } \Omega, \tag{9}$$

$$+ \text{ cond. de contorno}, \tag{10}$$

entonces el flujo es **incompresible**:

$$\nabla \cdot (u, v) = u_x + v_y = \Psi_{xx} + \Psi_{yy} = 0.$$

- Así, para determinar un flujo irrotacional e incompresible en cualquier dominio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, basta proceder como sigue:
 1. Resolver el problema (9)–(10), por ejemplo usando el método de los elementos finitos
 2. Tomar el flujo $u = \Psi_x$, $v = \Psi_y$.

Formulación variacional de las ecuaciones de Stokes

Ecuaciones de Stokes estacionarias

Problema de Stokes de estacionario (con condiciones de contorno **Dirichlet**):

- Supongamos dado un dominio (un conjunto abierto con frontera regular) $\Omega \subset \mathbb{R}^3$.
- Consideramos los datos:

$$\nu > 0 \text{ (coeficiente de viscosidad)}, \quad (11)$$

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ (fuerza externa)} \quad (12)$$

- Planteamos: hallar $u = u(x)$, $v = v(x)$, $w = w(x)$ $p = p(x)$, todas ellas funciones definidas en un conjunto abierto Ω y con valores en \mathbb{R} , tales que:

$$-\nu \Delta u + \partial_x p = f_1 \quad (13)$$

$$-\nu \Delta v + \partial_y p = f_2 \quad (14)$$

$$-\nu \Delta w + \partial_z p = f_3 \quad (15)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \partial_x u + \partial_y v + \partial_z w = 0, \quad (16)$$

junto a las condiciones de contorno (para los datos frontera g_1 , g_2 y g_3)

$$u(x, t) = g_1(x), \quad v(x, t) = g_2(x), \quad w(x, t) = g_3(x), \quad \forall x \in \partial\Omega. \quad (17)$$

Ecuaciones de Stokes Estacionarias: Formulación variacional (I)

- ▶ Por simplicidad, consideramos condiciones Dirichlet homogéneas en toda la frontera de Ω .
- ▶ Definimos los espacio $V = H_0^1(\Omega)$ y $Q = L_0^2(\Omega)$. Multiplicamos, respectivamente, a las tres ecuaciones de momentos en el problema de Stokes por funciones test $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V$. Multiplicamos la ecuación de divergencia por otra función test $\bar{q} \in Q$.
- ▶ Integramos por partes cada una de estas ecuaciones, teniendo en cuenta que los términos frontera son cero y, por tanto, desaparecen. Así obtenemos:

$$\int_{\Omega} \nu \nabla u \nabla \bar{u} - \int_{\Omega} p \partial_x \bar{u} = \int_{\Omega} f_1 \bar{u}, \quad \forall \bar{u} \in V,$$

$$\int_{\Omega} \nu \nabla v \nabla \bar{v} - \int_{\Omega} p \partial_y \bar{v} = \int_{\Omega} f_2 \bar{v}, \quad \forall \bar{v} \in V,$$

$$\int_{\Omega} \nu \nabla w \nabla \bar{w} - \int_{\Omega} p \partial_z \bar{w} = \int_{\Omega} f_3 \bar{w}, \quad \forall \bar{w} \in V,$$

$$\int_{\Omega} \bar{p} \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \forall \bar{p} \in Q.$$

Ecuaciones de Stokes Estacionarias: Formulación variacional (II)

- Sumamos las ecuaciones anteriores y planteamos el problema: Hallar $u, v, w \in H_0^1(\Omega)$ y $p \in L_0^2(\Omega)$ tales que

$$\begin{aligned} & \int_{\Omega} \nu \left(\nabla u \nabla \bar{u} + \nabla v \nabla \bar{v} + \nabla w \nabla \bar{w} \right) \\ & - \int_{\Omega} (\partial_x \bar{u} + \partial_y \bar{v} + \partial_z \bar{w}) p \\ & + \int_{\Omega} (\partial_x u + \partial_y v + \partial_z w) \bar{p} \\ & = \int_{\Omega} (f_1 \bar{u} + f_2 \bar{v} + f_3 \bar{w}) \end{aligned}$$

$$\forall \bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V, \forall \bar{p} \in Q.$$

Formulación variacional de sistemas evolutivos

Ecuación del calor

Fijamos un dominio espacial $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ y un **intervalo de tiempo** $[0, T]$.

Planteamos: hallar u solución de

$$\partial_t u - \Delta u = f, \quad (x, t) \text{ en } \Omega \times (0, T), \quad (18)$$

$$u(x, t) = g(x, t) \quad \text{sobre } \partial\Omega \quad (\text{condición de contorno}), \quad (19)$$

$$u(x, 0) = u_0(x) \quad x \in \Omega, (\text{condición inicial}). \quad (20)$$

donde f , u_0 y g son funciones conocidas (datos).

Discretización en tiempo

Consideramos la siguiente partición del **intervalo de tiempo** $[0, T]$:

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_m < t_{m+1} < \cdots < t_M = T.$$

- ▶ Suponemos que $t_{m+1} - t_m = \Delta t$ (constante).
- ▶ Intentaremos hallar ciertos valores $u^m \approx u(t_m)$, para $m = 0, 1, \dots, M$.

Calculamos los valores u^m de la siguiente forma:

- ▶ Inicialización: para $m = 0$: $u^0 = u_0$ (u_0 es el dato inicial).
- ▶ Iteración de tiempo m : conocida la solución en la etapa $m - 1$, hallamos u^m como solución de:

$$\frac{u^m - u^{m-1}}{\Delta t} - \Delta u^m = f^m \quad \text{en } \Omega \tag{21}$$

$$u^m = g^m \quad \text{sobre } \partial\Omega \quad (\text{condición de contorno}), \tag{22}$$

$$\tag{23}$$

donde $f^m(x)$ y $g^m(x)$ denotan respectivamente a $f(x, t^m)$ y $g(x, t^m)$.

- ▶ El problema anterior es estacionario (el tiempo t_m está fijo) y lo podemos resolver mediante el MEF.
- ▶ A este tipo de discretizaciones en tiempo se les llama método de **Euler implícito**.

Ecuaciones de Stokes de evolución

Problema de Stokes de evolución (con condiciones de contorno **Dirichlet**):

- Supongamos dado un dominio (un conjunto abierto con frontera regular) $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ y un intervalo temporal $[0, T]$, siendo $T > 0$ el tiempo final de observación.
- Consideramos los datos:

$$\nu > 0 \text{ (coeficiente de viscosidad),} \quad (24)$$

$$\mathbf{f} = (f_1, f_2, f_3) : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ (fuerza externa)} \quad (25)$$

- Planteamos: hallar $u = u(x, t)$, $v = v(x, t)$, $w = w(x, t)$ $p = p(x, t)$, todas ellas funciones definidas en un conjunto abierto Ω y con valores en \mathbb{R} , tales que:

$$\partial_t u - \nu \Delta u + \partial_x p = f_1 \quad (26)$$

$$\partial_t v - \nu \Delta v + \partial_y p = f_2 \quad (27)$$

$$\partial_t w - \nu \Delta w + \partial_z p = f_3 \quad (28)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \partial_x u + \partial_y v + \partial_z w = 0, \quad (29)$$

junto a las condiciones de contorno (para los datos frontera g_1 , g_2 y g_3)

$$u(x, t) = g_1(x, t), \quad v(x, t) = g_2(x, t), \quad w(x, t) = g_3(x, t), \quad (30)$$

$$\forall x \in \partial\Omega, \quad \forall t \in (0, T) \quad (31)$$

y las condiciones iniciales (para los datos iniciales u_1 , u_2 , u_3)

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad v(x, 0) = v_0(x), \quad w(x, 0) = w_0(x),$$

Discretización del problema de Stokes evolutivo

- Planteamos: hallar $u^m \approx u(x, t_m)$, $v^m \approx v(x, t_m)$, $w^m \approx w(x, t_m)$, $p^m \approx p(x, t_m)$, todas ellas funciones definidas en un conjunto abierto Ω , tales que:

$$\frac{u^m - u^{m-1}}{\Delta t} - \nu \Delta u^m + \partial_x p^m = f_1^m \quad (32)$$

$$\frac{v^m - v^{m-1}}{\Delta t} - \nu \Delta v^m + \partial_y p^m = f_2^m \quad (33)$$

$$\frac{w^m - w^{m-1}}{\Delta t} - \nu \Delta w^m + \partial_z p^m = f_3^m \quad (34)$$

$$\nabla \cdot u^m = \partial_x u^m + \partial_y v^m + \partial_z w^m = 0, \quad (35)$$

junto a las condiciones de contorno (para los datos frontera g_1 , g_2 y g_3)

$$u^m = g_1^m \quad v^m(x, t) = g_2^m \quad w^m(x, t) = g_3^m \quad (36)$$

$$\forall x \in \partial\Omega \quad (37)$$

Ecuaciones de Stokes Evolutivas: Formulación variacional (II)

En la etapa de tiempo m (conocidas u^{m-1} , v^{m-1} , w^{m-1}), hallar u^m , v^m , $w^m \in H_0^1(\Omega)$ y $p^m \in L_0^2(\Omega)$ tales que:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\Delta t} \int_{\Omega} (u^m \bar{u} + v^m \bar{v} + w^m \bar{w}) + \int_{\Omega} \nu (\nabla u^m \nabla \bar{u} + \nabla v^m \nabla \bar{v} + \nabla w^m \nabla \bar{w}) \\ & - \int_{\Omega} (\partial_x \bar{u} + \partial_y \bar{v} + \partial_z \bar{w}) p^m \\ & + \int_{\Omega} (\partial_x u^m + \partial_y v^m + \partial_z w^m) \bar{p} \\ & = \frac{1}{\Delta t} \int_{\Omega} (u^{m-1} \bar{u} + v^{m-1} \bar{v} + w^{m-1} \bar{w}) + \int_{\Omega} (f_1^m \bar{u} + f_2^m \bar{v} + f_3^m \bar{w}) \end{aligned}$$

$\forall \bar{u}, \bar{v}, \bar{w} \in V, \forall \bar{p} \in Q$.