

# 复变函数与积分变换

rrrrrzy

2024 年 10 月 11 日

## 1 复数的基本运算

### 1.1 复数的表示

先定义一个复数为  $z = x + iy$ , 在复平面上表示为  $(x, y)$ , 当  $z \neq 0$  时, 称从正实轴到  $z$  的终边的角的弧度数  $\theta$  为  $z$  的辐角, 记作  $Argz = \theta$ , 此时有  $\tan(Argz) = \frac{y}{x}$ , 因为一个不为零复数有无数个辐角, 如果  $\theta_1$  时其中的一个, 则  $Argz = \theta_1 + 2k\pi (k \in \mathbb{N})$ , 其中满足  $-\pi < \theta_0 \leq \pi$  的角称为  $Argz$  的主值, 记作  $\theta_0 = \arg z$ .

我们规定, 当  $z = 0$  时, 它的辐角不确定.

此外, 一个复数还可以表示为  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ , 这就是复数的三角表示式.

又由欧拉公式:  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ , 有:  $z = re^{i\theta}$ , 这就是复数的指数表示式.

### 1.2 复数的幂与根

$n$  个相同复数  $z$  的乘积记作  $z^n$ , 有:  $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$ , 浅作证明如下:

证明. 已知一个复数的指数表示式为  $z = re^{i\theta}$ , 则它的  $n$  次方为:  $z^n = r^n e^{i \cdot n\theta}$ , 认为  $n\theta$  是一个整体, 展开为三角表示式:  $z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$

□

特别的, 当复数的模  $r = 1$  时, 有 De Moivre 公式:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

下面讨论复数的根:

记复数的  $n$  次根为  $w = \sqrt[n]{z} = r^{\frac{1}{n}}(\cos \frac{\theta+2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta+2k\pi}{n})$ , 简作证明如下

证明. 为了求出根  $w$ , 我们令

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

由 De Moivre 公式有  $\rho^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

于是有  $\rho^n = r$ ,  $\cos n\varphi = \cos \theta$ ,  $\sin n\varphi = \sin \varphi$ , 显然, 后两式成立的充要条件是  $n\varphi = \theta + 2k\pi$ , ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ). 由此有  $\rho = r^{\frac{1}{n}}$ ,  $\varphi = \frac{\theta+2k\pi}{n}$ , 证毕  $\square$

### 1.3 其他重要的定义

**定义 1.1** (曲线光滑的定义). 设曲线  $z(t) = x(t) + iy(t)$  可以表示为  $z = z(t)$ , 那么, 如果在区间  $a \leq t \leq b$  上,  $x'(t), y'(t)$  都是连续的, 且对  $t$  的每一个值都有  $[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \neq 0$ , 则称该曲线是光滑的.

**定义 1.2** (曲线简单和开闭的定义). 设一段曲线自身没有交叉点, 则称它为简单曲线. 如果起点与终点重合, 称它为简单闭曲线

**定义 1.3** (单联通域和多联通域的定义). 复平面上有一区域  $B$ , 如果在其中任作一条简单闭合曲线, 曲线的内部总属于  $B$ , 就称为单联通域. 一个区域如果不是单联通域, 就称为多联通域.

## 2 复变函数的基本操作

### 2.1 复变函数的极限

每个复变函数都可以表示为  $f(z) = u(x) + v(x) \cdot i$ , 则对它求极限有以下几种定理

**定理 2.1** (定理一). 设  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ,  $A = u_0 + iv_0$ ,  $z_0 = x_0 + iy_0$ , 则  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$  的充要条件是

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = u_0 \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = v_0$$

这个定理把求一个复变函数的极限问题转化为了求两个二元实变函数的极限问题.

与此相同, 实变函数中的极限基本运算规律在复变函数中也是适用的

**定理 2.2** (定理二). 如果  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ ,  $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = B$ , 则有

$$\lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \pm g(z)] = A \pm B; \quad (1)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)g(z) = AB; \quad (2)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0) \quad (3)$$

## 2.2 复变函数的导数

### 2.2.1 复变函数导数的定义

**定义 2.1** (复变函数可导的定义). 设函数  $\omega = f(z)$  定义于区域  $D$ .  $z_0$  是  $S$  中一点, 点  $z_0 + \Delta z$  不出  $D$  的范围. 如果极限  $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$  存在, 那么就称  $f(z)$  在  $Dz_0$  可导. 这个极限值就称作  $f(z)$  在  $z_0$  的导数, 记作  $f'(z_0)$

可见, 复变函数导数的定义和一元实变函数的定义类似, 只是  $\Delta z \rightarrow 0$  的方式是任意的, 不再局限于数轴上的双向趋近. 因此, 导数也就没有了左导数和右导数之说, 这一点又和二元实变函数的导数类似.

### 2.2.2 复变函数的连续性

与实变函数相同, 复变函数可导一定连续, 连续不一定可导

### 2.2.3 复变函数的求导法则

与一元实变函数的求导公式在形式上完全一致

### 2.2.4 复变函数的微分

与一元实变函数的微分概念完全一致, 需要特别指出的是: 函数  $\omega = f(z)$  在  $z_0$  处可导与在  $z_0$  处可微是等价的

## 2.3 解析函数

### 2.3.1 解析函数的定义

**定义 2.2.** 如果函数  $f(z)$  在  $z_0$  及  $z_0$  的邻域内处处可导, 那么称  $f(z)$  在  $z_0$  解析. 如果  $f(z)$  在区域  $D$  内每一点解析, 那么称  $f(z)$  在  $D$  内解析, 或称  $f(z)$  是  $D$  内的一个解析函数 (全纯函数或正则函数).

如果  $f(z)$  在  $z_0$  上不解析, 那么称  $z_0$  为  $f(z)$  的奇点.

由此可见, 函数在区域内解析和在区域内可导是等价的, 但函数在一点处可导, 不一定在该点处解析

### 2.3.2 函数解析的充要条件

**定理 2.3** (函数可导的充要条件). 设函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  定义在区域  $D$  内, 则  $f(z)$  在  $D$  内一点  $z = x + iy$  可导的充要条件是  $u(x, y)$  与  $v(x, y)$  在点  $(x, y)$  可微, 并且在该点满足柯西-黎曼方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

特别强调, 复变函数  $z = u + iv$  在一点可导与可微是等价的, 而柯西-黎曼条件是说, 构成这个复变函数的实部和虚部的实函数要可微, 并不是这个复变函数本身可微.

立即的, 从柯西-黎曼方程可以推出函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  在点  $z = x + iy$  的导数公式:

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

根据函数解析的定义及定理 2.3, 得到以下定理

**定理 2.4** (函数在区域  $D$  解析的充要条件). 函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  在定义域  $D$  内解析的充要条件是:  $u(x, y)$  与  $v(x, y)$  在  $D$  内可微, 并且满足柯西-黎曼方程

## 2.4 几个特殊的复变函数

### 2.4.1 指数函数

# 3 复变函数的积分

## 3.1 积分存在的条件及其计算方法

### 3.1.1 积分存在的条件

当  $f(z)$  是连续函数而  $C$  是光滑曲线时, 积分  $\int_C f(z) dz$  是一定存在的

### 3.1.2 积分的几个基本算法

对于普通的线积分:

$$\begin{aligned}\int_C f(z) dz &= \int_C (u + iv)(dx + idy) = \int_C u dx + iv dx + iu dy - v dy \\ &= \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy\end{aligned}$$

对于可以化为参数方程  $z = z(t)$ ,  $\alpha \leq t \leq \beta$  的积分:

$$\int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f[z(t)]z'(t) dt$$

### 3.1.3 一个常用的积分

**例 1.** 计算  $\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}}$ , 其中  $C$  为以  $z_0$  为中心,  $r$  为半径的正向圆周,  $n$  为整数

**解.**  $C$  的方程可以写作  $z = z_0 + re^{i\theta}$ ,  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ , 所以

$$\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^{n+1}} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{i\theta}}{r^{n+1}e^{(n+1)i\theta}} d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{i}{r^n e^{in\theta}} d\theta = \frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} d\theta$$

则当  $n = 0$  时, 结果为:  $i \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi i$ ,

当  $n \neq 0$  时, 结果为:  $\frac{i}{r^n} \int_0^{2\pi} (\cos n\theta - i \sin n\theta) d\theta = 0$ .

因此得到:

$$\oint_C \frac{dz}{(z - z_0)^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

其中,  $C$  只要是包围  $z_0$  的正向简单曲线即可, 它的特点是积分与路线中心和周围半径无关

### 3.2 柯西-古萨基本定理

从对普通线积分的计算可以发现, 一个复变函数的积分被转化为了两个二元实变函数的第二类曲线积分, 要计算它们可以使用格林公式:

$$\begin{aligned} \int_C u dx - v dy &= \iint_D \left( -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy \\ \int_C v dx + u dy &= \iint_D \left( \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy \end{aligned}$$

由定理 2.3 得到的导数公式知:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

这刚好满足积分与路径无关的充要条件:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

因此, 得到柯西-古萨定理

**定理 3.1** (柯西-古萨定理). 如果函数  $f(z)$  在单联通域  $B$  内处处解析, 那么函数  $f(z)$  沿  $B$  内的任何一条封闭曲线  $C$  的积分为零:

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

定理中的  $C$  可以不是简单曲线, 而定理成立的条件之一就是曲线  $C$  要属于区域  $B$ . 另外, 如果  $C$  是区域  $B$  的边界,  $f(z)$  在  $B$  内解析, 在闭区域  $\bar{B}$  上连续, 定理仍然成立

### 3.3 基本定理的推广——复合闭路定理

如果曲线  $C$  的内部不完全包含于  $D$  时, 柯西-古萨定理不一定成立, 这里给出复合闭路定理

**定理 3.2** (复合闭路定理).

设  $C$  是多联通域  $D$  内的一条简单闭曲线,  $C_1, C_2, \dots, C_n$  是在  $C$  内部的简单闭曲线, 它们互不包含也互不相交, 并且以  $C_1, C_2, \dots, C_n$  为边界的区域全含于  $D$ , 如果  $f(z)$  在  $D$  内解析, 那么:

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz, \text{ 其中 } C \text{ 和 } C_k \text{ 均取正方向};$$

$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0$ , 这里  $\Gamma$  为由  $C$  及  $C_k (k = 1, 2, \dots, n)$  所组成的复合闭路 (其方向是:  $C$  按逆时针,  $C_k^n$  按顺时针)

### 3.4 原函数与不定积分

我们知道, 线积分沿封闭曲线的积分为零跟曲线积分与路径无关是两个等价的概念, 因此从柯西-古萨定理有:

**定理 3.3.** 如果函数  $f(z)$  在单联通域  $B$  内处处解析, 那么积分  $\int_C f(z) dz$  与连接起点和终点的路线  $C$  无关

从定理 3.3 有, 解析函数在单联通域内的积分只和起点  $z_0$  及终点  $z_1$  有关, 因此有

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz = \int_{z_0}^{z_1} f(z) dz$$

固定  $z_0$ , 让  $z_1$  在  $B$  内变动, 并令  $z = z_1$ , 则变上限积分  $\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$  在  $B$  内确定了一个单值函数  $F(z)$ , 即

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta.$$

对这个函数, 我们有

**定理 3.4.** 如果  $f(z)$  在单联通域  $B$  内处处解析, 那么函数  $F(z)$  必为  $B$  内的一个解析函数, 并且  $F'(z) = f(z)$

这个定理与一元实变函数的变上限积分的求导定理是完全类似的, 因此也能类似地引入积分基本定理和牛顿-莱布尼兹公式.

**定理 3.5.** 如果  $f(z)$  在单联通域  $B$  内处处解析,  $G(z)$  为  $f(z)$  的一个原函数, 那么

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0),$$

这里的  $z_0, z_1$  为域  $B$  内的两点.

### 3.5 柯西积分公式