## Projeto por alocação de polos

## 25 de outubro de 2022

## 1 Problema

Projete um controlador com ação integral para o sistema

$$G(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{(z+1)(z-0.8)}{z(z-0.9)}$$
(1)

De modo que  $\xi=0.5,\,\omega_n=2.$  Utilize o período de amostragem T=0.1.

## 2 Solução

Controlador:

$$C(z) = \frac{N(z)}{R(z)} \tag{2}$$

onde N e R são polinômios a se determinar.

Suponha que  $n=\operatorname{grau}(N)$  e  $r=\operatorname{grau}(R)$ . Para o controlador ser causal devemos ter  $r\geq n$ .

Em malha fechada:

$$s = -\xi \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \tag{3}$$

$$= -1 \pm j2\sqrt{0.75} \approx -1 \pm j1.73 \tag{4}$$

$$z = \exp(sT) \approx 0.81 \pm j0.15 \tag{5}$$

$$M(z) = (z - 0.81 + j0.15)(z - 0.81 - j0.15)M'(z)$$
(6)

$$= (z^2 - 1.78z + 0.82)M'(z)$$
(7)

Equação de malha:

$$1 + C(z)G(z) = 1 + C(z)\frac{B(z)}{A(z)}$$
(8)

$$= 1 + C(z) \frac{(z+1)(z-0.8)}{z(z-0.9)}$$
 (9)

Proposta:

$$C(z) = \frac{N(z)}{(z - 0.8)(z - 1)R'(z)}$$
(10)

Então:

$$1 + C(z)G(z) = 1 + \frac{N(z)}{(z - 0.8)(z - 1)R'(z)} \frac{(z + 1)(z - 0.8)}{z(z - 0.9)}$$
(11)

$$= \frac{z(z-1)(z-0.9)R'(z) + (z+1)S(z)}{z(z-0.9)(z-1)R'(z)}$$
(12)

Polinômio de malha:

$$z(z-1)(z-0.9)R'(z) + (z+1)N(z) = M(z)$$
(13)

$$z(z-1)(z-0.9)R'(z) + (z+1)N(z) = (z^2 - 1.78z + 0.82)M'(z)$$
(14)

Supondo grau $(R') = r' \ge 0$  e grau $(M') = m' \ge 0$ :

$$\underbrace{z(z-1)(z-0.9)R'(z)}_{3+r'} + \underbrace{(z+1)N(z)}_{1+n} = \underbrace{(z^2-1.78z+0.82)M'(z)}_{2+m'}$$
(15)

Para o controlador ser causal, devemos ter  $r'+2 \geq n$ . Na melhor hipótese n=r'+2. Então:

$$r' + 3 = m' + 2 \tag{16}$$

$$r' = m' - 1 > 0 \tag{17}$$

Logo  $m' \ge 1$ . A situação mais simples (menores graus possíveis) é m' = 1 e r' = 0.  $m' = 1 \Rightarrow$  mais um pólo em malha fechada. Escolhe-se z = 0. Assim:

$$M'(z) = z \tag{18}$$

$$M(z) = (z^2 - 1.78z + 0.82)z (19)$$

 $r'=0 \Rightarrow n=r'+2=2$ . Então:

$$R'(z) = k_1 \tag{20}$$

$$N(z) = k_2 z^2 + k_3 z + k_4 \tag{21}$$

Voltando à equação de malha:

$$z(z-1)(z-0.9)R'(z) + (z+1)N(z) = (z^2 - 1.78z + 0.82)M'(z)$$
 (22)

$$z(z-1)(z-0.9)k_1 + (z+1)(k_2z^2 + k_3z + k_4) = (z^2 - 1.78z + 0.82)z$$
(23)

Então:

$$k_1 + k_2 = 1 (24)$$

$$-1.9k1 + k_2 + k_3 = -1.78 (25)$$

$$0.9k_1 + k_3 + k_4 = 0.82 (26)$$

$$k_4 = 0 \tag{27}$$

Resolvendo obtém-se:  $k_1 = 0.95, k_2 = 0.05, k_3 = -0.03, k_4 = 0$ . Logo:

$$C(z) = \frac{0.05z^2 - 0.03z}{0.95(z - 1)(z - 0.8)}$$
 (28)

$$=\frac{0.055z^2 - 0.034z}{(z-1)(z-0.8)}. (29)$$

Implementação:

$$C(z) = \frac{0.055z^2 - 0.034z}{(z - 1)(z - 0.8)}$$
(30)

$$= \frac{0.055 - 0.034z^{-1}}{1 - 1.8z^{-1} + 0.8z^{-2}}$$
(31)

$$\Rightarrow u[k] = 1.8u[k-1] - 0.8u[k-2] + 0.55e[k] - 0.034e[k-1]$$
(32)