

1 包除原理

数え上げのテクニックの一つ。集合 A が与えられ、その要素を変数とする述語たち $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_n\}$ を考える。 $1 \leq i \leq n$ に対して A の部分集合 A_i を $A_i = \{a \in A \mid P_i(a)\}$ で定めるとき、 $|\bigcup_{i=1}^n A_i|$ を求めるものである。 $\Lambda_n = \{1, \dots, n\}$ とする。

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \subset \Lambda \subseteq \Lambda_n} (-1)^{|\Lambda|-1} \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda} A_i \right|. \quad (1)$$

$$= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \cdot \left(\sum_{|\Lambda|=j} \left| \bigcap_{i \in \Lambda} A_i \right| \right). \quad (2)$$

Λ の要素数を固定したときに $|\bigcap_{i \in \Lambda} A_i|$ の総和を DP などでも求められるなら、式 (2) を用いて計算することができる。また、特に $|\Lambda| = |\Lambda'| \implies |\bigcap_{i \in \Lambda} A_i| = |\bigcap_{i \in \Lambda'} A_i|$ であるなら、 $|\Lambda| = j$ であるような Λ の代表元を Λ^j と書くことにして次のように変形できる。

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \cdot {}_n C_j \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda^j} A_i \right|. \quad (3)$$

式 (1) においては \sum で足される項が $2^n - 1$ 個だったのに対し、式 (2)–(3) では n に減っていてうれしい。

上の議論は、 $|\bigcap_{i \in \Lambda} A_i|$ を計算するのが容易であることを前提としているが、逆に $|\bigcap_{i \in \Lambda} (A \setminus A_i)|$ の計算が容易な状況^{*1}で $|\bigcap_{i=1}^n A_i|$ を求めたいときには以下のようにするとよい。

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n (A \setminus A_i) \right).$$

すなわち、

$$\left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right| = |A| - \left| \bigcup_{i=1}^n (A \setminus A_i) \right|. \quad (4)$$

右辺の第 2 項は、 $A \setminus A_i$ を A_i と置き直すことで式 (1) の枠組みで求められる。

^{*1} 満たす条件を決め打ちするよりも、満たさない条件を決め打ちした方が楽な場合。

1.1 証明

\mathcal{P} の大きさ n に関する帰納法で示す. $n = 2$ の場合は Venn 図などから示される (省略). $n < k$ で成り立っていることを仮定する. まず, $n = 2$ の場合の式を用いて次のように変形する.

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| &= \left| \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \right) \cup A_k \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \right| + |A_k| - \left| \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \right) \cap A_k \right| \\ &= \left| \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \right| + |A_k| - \left| \bigcup_{i=1}^{k-1} (A_i \cap A_k) \right| \end{aligned}$$

さらに, $n = k - 1$ の場合の式を用いて右辺の各項は次のように変形できる.

$$\begin{aligned} \left| \bigcup_{i=1}^{k-1} A_i \right| &= \sum_{\emptyset \subset \Lambda \subseteq \Lambda_{k-1}} (-1)^{|\Lambda|-1} \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda} A_i \right|. \\ |A_k| &= \sum_{\Lambda = \{k\}} (-1)^{1-1} \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda} A_i \right|. \\ - \left| \bigcup_{i=1}^{k-1} (A_i \cap A_k) \right| &= - \sum_{\emptyset \subset \Lambda \subseteq \Lambda_{k-1}} (-1)^{|\Lambda|-1} \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda} (A_i \cap A_k) \right| \\ &= - \sum_{\emptyset \subset \Lambda \subseteq \Lambda_{k-1}} (-1)^{|\Lambda|-1} \cdot \left| \left(\bigcap_{i \in \Lambda} A_i \right) \cap A_k \right| \\ &= \sum_{\emptyset \subset \Lambda \subseteq \Lambda_{k-1}} (-1)^{|\Lambda \cup \{k\}|-1} \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda \cup \{k\}} A_i \right|. \end{aligned}$$

第 1 項は A_k を含まない $k - 1$ 個以下の積集合, 第 2 項は A_k のみからなる集合, 第 3 項は A_k を含む 2 個以上 k 個以下の積集合に関する式になっており, 次のようにまとめることができる.

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{\emptyset \subset \Lambda \subseteq \Lambda_k} (-1)^{|\Lambda|-1} \cdot \left| \bigcap_{i \in \Lambda} A_i \right|. \quad \square$$

1.2 発展

1.2.1 高速ゼータ変換・高速 Möbius 変換

高速ゼータ変換は, 集合 S の部分集合を指数に取る関数 f に対して $g(S) = \sum_{T \subseteq S} f(T)$ を $O(|S| \cdot 2^{|S|})$ 時間で求める. 高速 Möbius 変換はその逆変換に相当し, $f(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|S \setminus T|} \cdot g(T)$ を求める.

```
// fast zeta transformation
for (size_type i = 0; i < n; ++i)
    for (size_type j = 0; j < (1_zu << n); ++j)
        if (j >> i & 1_zu) dp[j] += dp[j ^ (1_zu << i)];
```

```
// fast Moebius transformation
for (size_type i = 0; i < n; ++i)
    for (size_type j = 0; j < (1_zu << n); ++j)
        if (j >> i & 1_zu) dp[j] -= dp[j ^ (1_zu << i)];
```

各 j について $dp[j] = f(j)$ で初期化し、ゼータ変換を施すと $dp[j] = g(j)$ になっている。Möbius 変換についても g と f が逆になること以外は同様である。ここで、 j は部分集合を 2 進数でエンコードしたものである。

たとえば、 Λ_n の各部分集合 S に対して式 (1) の包除原理を行うことを考える。すなわち、各 S に対して $f(S) = \sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|-1} \cdot |\bigcap_{i \in T} A_i|$ を計算する。これは、 $g(\emptyset) = 0$, $g(T) = |\bigcap_{i \in T} A_i|$ として高速 Möbius 変換で得られる $f(S)$ を用いて $(-1)^{|S|} \cdot f(S)$ として計算できる。これにより、愚直には $O(3^{|S|})$ かかる計算を $O(|S| \cdot 2^{|S|})$ で行うことができる^{*2}。

1.2.2 DP

式 (2) より、 j 個の条件を満たす場合の数を求めることを考える。式 (4) を用いて j 個の条件に違反する場合の数を考えることもできる。

$dp[i][j]$ では、 i 番目までの条件を見て、そのうち j 個の条件を満たす場合の数（を求めるための値^{*3}）として定義する。 $dp[i][j]$ から $dp[i+1][j+1]$ への遷移（ i 番目の条件を満たす）と $dp[i+1][j]$ への遷移（ i 番目の条件を考慮しない）をそれぞれがらばって考える。その後、 $dp[n][j]$ から $\sum_{|\Lambda|=j} |\bigcap_{i \in \Lambda} A_i|$ を求めることで式 (2) を計算できる。 $dp[n][j]$ が直接その値を表す場合、（遷移によっては） j を指数部の偶奇を示す $\{0, 1\}$ のみにまとめることができる。

また、式 (4) を用いる場合、 $dp[n][0]$ は「 n 個目までの条件を見て 0 個の条件を考慮する場合」であり、これは集合全体に対応している。すなわち、以下のように簡単にできる（はず）。 f は適当に定義する。

$$\begin{aligned} \left| \bigcap_{i=1}^n A_i \right| &= |\Lambda| - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \cdot \left(\sum_{|\Lambda|=j} \left| \bigcap_{i \in \Lambda} (A \setminus A_i) \right| \right) \\ &= f(0, dp[n][0]) - \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \cdot f(j, dp[n][j]) \\ &= \sum_{j=0}^n (-1)^j \cdot f(j, dp[n][j]). \end{aligned}$$

^{*2} 目安としては、前者が $n \leq 15$ で後者が $n \leq 20$ 程度まで許容できる。

^{*3} 遷移のしやすさと相談するとよさそう。

状態数が $O(n^2)$ になる場合、 $n \leq 5000$ などでは MLE しうるので、一次元配列を使いまわすテクを使うとよい。また、操作回数など別のパラメータが必要になる場合は適宜 DP の次元を増やす必要がある（それはそう）。

1.2.3 約数系包除

ある n について $f(n)$ を求めた後、 $g(n) = f(n) - \sum_{n' \sqsubset n} g(n')$ を求める^{*4}局面が考えられる。典型的な例では、周期が関連する数え上げなどが挙げられる。より具体的には、たとえば周期 4 の数列には周期 2 や 1 の数列も含まれるので、最小周期が 4 の数列を数え上げたい場合にはそれらを取り除く必要がある。

さて、ここで以下の関係式が成り立つ（Möbius の反転公式）。

$$f(n) = \sum_{n' \sqsubseteq n} g(n') \iff g(n) = \sum_{n' \sqsubseteq n} \mu(n/n') \cdot f(n').$$

ここで、 $\mu(n)$ は以下で定義される Möbius 関数である^{*5}。

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 1, \\ 0 & \text{if } \exists m > 1 \text{ s.t. } m^2 \sqsubseteq n, \\ (-1)^k & \text{if } n = \prod_{i=1}^k p_i, \text{ where each } p_i \text{ is prime.} \end{cases}$$

$n' \sqsubseteq n$ である各 n' に対する $\mu(n')$ は、 n の素因数の列挙をしておくことで bit DP で求めることができる。また、 n の上限によっては Eratosthenes の篩を応用して $1 \leq n' \leq n$ に対する $\mu(n')$ を計算しておくこともできる。

1.3 補足

\mathcal{P} の各部分集合 \mathcal{P}' について $|\bigcap_{i \in \mathcal{P}'} A_i|$ を前計算しておくことで、各クエリで与えられる \mathcal{Q} について $|\bigcup_{i \in \mathcal{Q}} A_i|$ を高速に求められたりする。

$n \leq 10^9$ 、 $n \leq 10^{18}$ なら n の持つ素因数の個数はそれぞれ、たかだか 9 個、15 個なので、 n が多少大きくても n の素因数に関する部分集合であれば式 (1) をそのまま計算することができる。

^{*4} $n' \sqsubseteq n$ は n' が n の約数であることを表し、 $n' \sqsubset n$ は n' が n の真の約数である、つまり $n' \sqsubset n \iff n' \sqsubseteq n \wedge n' \neq n$ であることを表す。

^{*5} $g(n)$ を $f(n')$ の足し引きで求める際に、足されるのか引かれるのか、あるいは打ち消されるのかを表す関数である。