

Statistische Inferenz | 02 | Zentraltendenz, Streuung, Standardfehler

Prof. Dr. Roland Schäfer | Germanistische Linguistik FSU Jena

7. November 2024

Hinweis: Wo nicht anders angegeben, runden Sie die Ergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

1 Skalenniveaus

Bestimmen Sie das Skalenniveau von folgenden Messgrößen:

1. Prozentwerte
2. Wortfrequenz-Rang (häufigstes Wort, ..., seltenstes Wort)
3. Kasus
4. Geschwindigkeit
5. Akzentsitz (Erstsilbe, Mittelsilbe, Endsilbe)
6. Satzlänge, gemessen in Wörtern
7. Frequenz eines Wortes im Korpus (absolute Zahl)
8. Höhe über NN
9. DSH-Prüfungsniveau (I – III)
10. Verhältnis Satzlänge in Wörtern zu Wortlänge in Silben in einem Text
11. Wortklasse (= Wortart)
12. Beschleunigung
13. Textniveau (leicht, mittel, schwer)
14. Frequenz eines Wortes im Korpus pro eine Millionen Wörter
15. Textsorte

2 Modus und Median

Ermitteln Sie den Modus und wo möglich den Median für folgende Messreihen von Hand (ohne Software):

1. $x = [\text{Nom, Akk, Akk, Akk, Nom, Dat, Gen, Nom, Nom, Akk, Dat, Dat, Akk, Akk}]$
2. $x = [4, 5, 3, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 1, 3, 2]$
3. $x = [4.3, 5.0, 3.0, 3.3, 3.7, 2.3, 1.3, 2.7, 2.0, 1.0, 5.0, 4.3, 2.0, 2.0, 1.3, 3.0, 2.7]$

3 Mittel und Streuung

Ermitteln Sie von Hand für die untenstehenden Messreihen das arithmetische Mittel, die Varianz und die Standardabweichung:

1. $x = [2.73, 1.85, 21.24, 17.97, 5.49, 18.90, 12.46, 0.97, 6.45, 7.43]$
2. $x = [1.00, 1.91, 3.12, 4.38, 4.72, 5.29, 3.82, 3.25, 2.04, 0.93]$
3. $x = [1.07, 1.06, 0.94, 1.84, 3.04, 3.22, 4.18, 5.27, 6.27, 6.75]$

4 z-Werte und Standardfehler

Ermitteln Sie für die Messreihen aus Aufgabe 3 die z-Werte für die Messpunkte und die Standardfehler von Hand. Formulieren Sie in eigenen Worten (jeweils ein Satz), was z-Werte und Standardfehler angeben.

5 Konfidenzintervalle (Anteilswerte)

5.1 Berechnung des Konfidenzintervalls für Anteilswerte

Berechnen Sie für folgende Anteilswerte (q) die Konfidenzintervalle bei den Stichprobengrößen $n = 10$ und $n = 100$ auf den Konfidenzniveaus $\alpha = 0.9$ und $\alpha = 0.99$ (also je vier Mal den unteren und oberen Wert des Konfidenzintervalls). Die kritischen Werte der Normalverteilung entnehmen Sie bitte der zur Verfügung gestellten Tabelle. Runden Sie auf drei Nachkommastellen.

1. $q = 0.21$
2. $q = 0.49$
3. $q = 0.89$

5.2 Konfidenzintervalle für Mittelwerte

5.2.1 Fehler finden

Warum hätte folgende Tabelle ganz nicht gedruckt werden dürfen? Der Fehler ist ohne nachzurechnen erkennbar?

Measure	M	SD	95% CI	
			Lower	Upper
Age at testing (years)	20.23	2.94	19.59	20.88
Age of onset of L2 learning (years)	5.13	1.78	5.74	5.53

Ingrid Mora-Plaza, Joan C. Mora, Mireia Ortega and Cristina Aliaga-Garcia. Is L2 pronunciation affected by increased task complexity in pronunciation-unfocused speaking tasks? *Studies in Second Language Acquisition*. First View.

<https://doi.org/10.1017/S0272263124000470>

5.2.2 Stichprobengröße (Transfer)

Aus den Zahlen für *Age at testing* können wir den Standardfehler und die Stichprobengröße rekonstruieren **auch ohne in den Originalartikel zu schauen**. Finden Sie zuerst den Standardfehler und dann die Stichprobengröße. Mit der Stichprobengröße können Sie dann das korrekte KI für *Age of onset* berechnen.