

## 확률및통계 3차 과제물

제출일 : 12월 4일 수업 전까지

파일명 : 확률및통계(3차과제\_학번\_이름) ~ 한글, 워드, pdf, 파일 중 하나로 정리하여  
LMS 과제란에 업로드하세요.

### [문제 1]

두 확률변수  $X$ 와  $Y$ 의 결합확률분포가 다음과 같을 때, 다음 물음에 답하라.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{6}{5}(x^2 + y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{그 외에서} \end{cases}$$

- (1) 확률변수  $X$ 의 주변확률밀도함수를 구하라.
- (2) 확률  $P(0 < X < 0.5, 0 < Y < 0.5)$ 을 구하라.
- (3) 두 확률변수의 상관계수를 구하라.
- (4) 두 확률변수는 독립인가? 그 이유는?

solution)

$$\begin{aligned} (1) f(x) &= \int_y f(x, y) dy = \int_0^1 \frac{6}{5}(x^2 + y) dy \\ &= \frac{6}{5} \left[ x^2 y + \frac{1}{2} y^2 \right]_0^1 = \frac{6}{5} x^2 + \frac{3}{5}, \quad 0 < x < 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) P(0 < X < 0.5, 0 < Y < 0.5) &= \int_0^{0.5} \int_0^{0.5} \frac{6}{5}(x^2 + y) dx dy \\ &= \frac{6}{5} \left[ \frac{1}{24} y + \frac{1}{4} y^2 \right]_0^{0.5} \end{aligned}$$

$$(3) f(y) = \int_x f(x, y) dx = \int_0^1 \frac{6}{5}(x^2 + y) dx = \frac{6}{5} \left[ \frac{1}{3} x^3 + xy \right]_0^1 = \frac{6}{5} y + \frac{2}{5}, \quad 0 < y < 1$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x \left( \frac{6}{5} x^2 + \frac{3}{5} \right) dx = \frac{6}{5} \left[ \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{4} x^2 \right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy = \int_0^1 y \left( \frac{6}{5} y + \frac{2}{5} \right) dy = \frac{6}{5} \left[ \frac{1}{3} y^3 + \frac{1}{6} y \right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 \left( \frac{6}{5} x^2 + \frac{3}{5} \right) dx = \frac{6}{5} \left[ \frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{6} x^3 \right]_0^1 = \frac{11}{25}$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 f(y) dy = \int_0^1 y^2 \left( \frac{6}{5} y + \frac{2}{5} \right) dy = \frac{6}{5} \left[ \frac{1}{4} y^4 + \frac{1}{9} y^3 \right]_0^1 = \frac{13}{30}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2}{25}, \quad Var(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{11}{150}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \frac{6}{5} (x^2 + y) dx dy = \frac{7}{20}$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.01$$

$$\rho(X, Y) = Corr(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y} = -0.1306$$

- (4)  $f(x)f(y) = \left( \frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{5} \right) \left( \frac{6}{5}y + \frac{2}{5} \right) \neq f(x, y) = \frac{6}{5}(x^2 + y)$  이므로 두 확률변수  $X, Y$ 는 서로 독립이 아니다.

## [문제 2]

빨간색 공(R) 3개, 파란색 공(B) 4개, 흰색 공(W)이 5개 들어 있는 항아리에서 임의로 두 개의 공을 선택한다. 다음 물음에 답하라.

- (1) 확률변수  $X$ 를 뽑힌 공 가운데 빨간색 공의 수, 확률변수  $Y$ 를 뽑힌 공 가운데 흰색 공의 수라고 할 때, 확률변수  $X$ 와  $Y$ 의 결합확률분포를 구하라.
- (2) (1)의 결과를 이용하여, 확률변수  $X$ 와 확률변수  $Y$ 의 주변확률분포를 구하라.
- (3)  $E(X)$ ,  $E(Y)$ ,  $E(XY)$ 를 구하라.
- (4) 확률변수  $X, Y$ 가 독립인가? 아니라면 공분산을 구하라.

solution)

(1)

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{12}{132}$	$\frac{40}{132}$	$\frac{20}{132}$
1	$\frac{24}{132}$	$\frac{30}{132}$	0
2	$\frac{6}{132}$	0	0

(2)

$X$	0	1	2
$P(X=x)$	$\frac{72}{132}$	$\frac{54}{132}$	$\frac{6}{132}$

$Y$	0	1	2
$P(Y=y)$	$\frac{42}{132}$	$\frac{70}{132}$	$\frac{20}{132}$

$$(4) E(X) = (1 \times \frac{54}{132}) + (2 \times \frac{6}{132}) = \frac{1}{2}, \quad E(Y) = (1 \times \frac{70}{132}) + (2 \times \frac{20}{132}) = \frac{5}{6}$$

$$(5) P(X=0)P(Y=0) = \frac{21}{121} \neq P(X=0, Y=0) = \frac{12}{132} \text{ 이므로 두 확률변수 } X, Y$$

는 서로 독립이 아니다.

### [문제 3]

정규분포  $N(30, 4)$ 를 따르는 모집단으로부터 크기 36인 확률표본을 추출하였다. 이때의 표본평균이  $\bar{X}$ 라고 할 때, 다음에 답하라.

- (1)  $P(\bar{X} \geq 30)$ 의 값은?
- (2)  $P(\bar{X} \geq a) = 0.05$ 를 만족하는  $a$ 의 값은?
- (3)  $P(-b \leq \bar{X} - 30 \leq b) = 0.95$ 를 만족하는  $b$ 의 값은?

solution)

$$(1) P(\bar{X} \geq 30) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{30 - 30}{2/\sqrt{36}}\right) \\ = P(Z \geq 0) = 0.5$$

$$(2) P(\bar{X} \geq a) = P\left(Z \geq \frac{a - 30}{0.33}\right) = 0.05, \quad \frac{a - 30}{0.33} = 1.645 \\ a = 30 + 0.548 = 30.548$$


$$(3) P(-b \leq \bar{X} - 30 \leq b) = 0.95 = P\left(\frac{-b}{0.33} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{b}{0.33}\right) \\ = P\left(|Z| \leq \frac{b}{0.33}\right) = 0.95 \\ \frac{b}{0.33} = 1.96, \quad a = 0.6468$$

### [문제 4]

성인 남자의 고혈압 환자 비율에 대한 조사를 하고자 한다. 신뢰수준 95%하에서 오차한계는 0.02를 넘지 않기 위해서, 다음 각 경우에 대해 얼마나 많은 표본을 추출해야 하는지를 결정하라.

- (1) 실제 고혈압 보유 비율을 알 수 없는 경우
- (2) 예년의 조사에 따라 고혈압 환자 비율이 0.07이라고 판단되는 경우
- (3) (1)과 (2)의 결과에 따라 어떤 결론을 내릴 수 있는가?

solution)

 **해답** (1)  $n \geq \frac{1}{4} \left( \frac{z_{\alpha/2}}{d} \right)^2 = \frac{1}{4} \left( \frac{1.96}{0.02} \right)^2 = 2401$

(2)  $n \geq p^*(1-p^*) \left( \frac{z_{\alpha/2}}{d} \right)^2 = 0.07 \times 0.93 \left( \frac{1.96}{0.02} \right)^2 = 625.22$

즉, 필요한 표본의 크기는 약 626명이다.

(3) 따라서, 아무 정보가 없을 때 더 많은 표본이 필요한 것을 알 수 있다.

### [문제 5]

어떤 TV 방송국에서 특집 프로그램을 방영하고 있는데 시청률이 30%라고 한다. 전국에서 900명을 임의로 추출하여 이 특집 프로그램을 시청하고 있는 비율을 추정하고자 한다.

(1) 표본자료의 비율로 전체 시청률을 추정하고자 할 때 적용되는 표본분포를 구하시오.

(2) 표본비율이 32% 이상일 확률을 구하시오. (비율의 표본분포, 이항분포의 정규 근사방법, 연속성 수정을 각각 이용하여 구하여라)

solution)

(1)  $n=900$ 으로 대표본 CLT,  $np$ 와  $nq > 5$ 로  $\hat{p} \sim$  정규분포를 따른다.

표본비율의 표본분포는  $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) = N(0.3, 0.015)$

(2)  $P(\hat{p} \geq 0.32) = P\left(Z \geq \frac{0.32 - 0.30}{0.015}\right) = P(Z \geq 1.33) = 0.092$

### [문제 6]

베르누이 분포로부터 200개의 표본을 추출하여, 성공 71, 실패 129를 얻었다.

(1) 성공의 확률이 30% 보다 큰가를 알아보하고자 한다. 가설을 설정하라.


(2) 영가설하에서의 검정통계량 값을 계산하라.

(3) 유의수준 5%에서 검정하고 결론을 설명하라.

(4) 유의확률(p-value)을 구하여 검정하고 결론을 설명하라.

(5) 성공의 확률이 30%와 다른가를 알아보하고자 한다면, 가설을 설정하고 신뢰구간을 구하여 검정하라.

solution)

 **해답** (1)  $H_0 : p = 0.3, \quad H_1 : p > 0.3$

$$(2) \quad T_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.355 - 0.3}{\sqrt{\frac{0.3(1-0.3)}{200}}} = 1.697$$

(3)  $C_{0.05} = \{ T_0 > z_{0.05} = 1.645 \} \Rightarrow T_0 > z_{0.05}$ 이면  $H_0$  를 기각

$T_0 \notin C_{0.05}$ 가 되어 영가설을 채택한다. 즉, 유의수준  $\alpha = 0.05$  일 때 모비율이 0.3이다.

(4) P-value  $< 0.05 \rightarrow$  귀무가설 기각

(5) CI 판정 :  $(L, U) \not\ni 0.3 \rightarrow$  귀무가설 기각