

# 1. Третья (основная) формула Грина.

Опционально, 1 и 2 ф-лы Грина: 1) 
$$\iiint_{\Omega} v \Delta u \, d\tau = \iint_S v \frac{\partial u}{\partial n} \, d\sigma - \iiint_{\Omega} (\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) \, d\tau$$

2) 
$$\iint_{\Omega} v \Delta u - u \Delta v \, d\tau = \iint_S (v \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial v}{\partial n}) \, d\sigma$$

Итак, приступим. Нам понадобятся: 2-я формула Грина и фунд. решение ур-я Лапласа.

Используя их, получим 3-ю формулу Грина. 1. Пусть  $u(M) \in C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$  ( $\Omega$  - ограниченная область)

Точка  $M_0 \in \Omega$ ; функция  $v(M, M_0) = \frac{1}{R_{MM_0}}$  имеет особенность в  $M_0 \implies$  сразу применять формулу Грина нельзя

2. Поэтому окружим  $M_0$  шаром  $K(M_0, \varepsilon)$ , ограниченным сферой  $\Sigma(M_0, \varepsilon)$

Тогда можно применить 2-ю формулу Грина:

$$\iiint_{\Omega \setminus K(M_0, \varepsilon)} (u \Delta v - v \Delta u) \, d\tau = \underbrace{\iint_S (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) \, d\sigma}_{(1)} + \underbrace{\iint_{\Sigma(M_0, \varepsilon)} (u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n}) \, d\sigma}_{(2)} \quad (0)$$

3. Вычислим интеграл по сфере, учитывая  $v(P) \Big|_{P \in \Sigma(M_0, \varepsilon)} = \frac{1}{\varepsilon}$  и  $\frac{\partial v(P)}{\partial n} \Big|_{P \in \Sigma(M_0, \varepsilon)} = \frac{1}{\varepsilon^2}$

(2) =  $\iint_{\Sigma} (M_0, \varepsilon) (u(P) \frac{1}{\varepsilon^2} - \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u(P)}{\partial n}) \, d\sigma_P =$  / Воспользуемся теоремой о среднем / =  $/P^*, P^{**} \in \Sigma(M_0, \varepsilon)/ = (\frac{1}{\varepsilon^2} u(P^*) -$

$\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u(P^{**})}{\partial n}) 4\pi \varepsilon^2 = 4\pi u(P^*) - 4\pi \varepsilon \frac{\partial u(P^{**})}{\partial n} =$  /  $(\varepsilon \rightarrow 0)$  / =  $4\pi u(M_0)$   $\left( \frac{\partial u}{\partial n} \text{ - ограниченная; } u \text{ - непрерывная} \right)$

4. Подставим в (0) и выделим  $u(M_0), \varepsilon \rightarrow 0$

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_S (\frac{1}{R_{MM_0}} \frac{\partial u(P)}{\partial n_P} - u(P) \frac{\partial}{\partial n_P} (\frac{1}{R_{MM_0}})) \, d\sigma_P - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u(M)}{R_{MM_0}} \, d\tau_M$$

Мы получили 3-ю формулу Грина, мы восхитительны, ребята я кжеся умерю пишу это сллбещение уле=еле

## 2. Интеграл Пуассона для решения задачи Коши для уравнения теплопроводности

Интеграл Пуассона 
$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x, \xi, t) \varphi(\zeta) \, d\zeta$$

где  $G(x, \xi, t)$  — функция Грина: 
$$G(x, \xi, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi a^2 t}} \exp \frac{-(x-\xi)^2}{4a^2 t}$$