

# Rozdział 1

## Płyn idealny

Naszym celem jest uzasadnienie podstawowych równań ruchu cieczy idealnej.

Niech  $(M, g)$  będzie zwartą, orientowaną  $n$ -rozmaiutością Riemannowską z brzegiem i  $\omega \in \Omega^n(M)$  będzie formą objętości na  $M$ . Przypomnijmy, że  $g$  jest indeksowaną przez  $M$  rodziną iloczynów skalarnych określonych na przestrzeniach stycznych do  $M$ ,  $g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$  dla  $p \in M$  i  $p \mapsto g_p(X_p, Y_p)$ , gdzie  $X$  i  $Y$  są różniczkowalnymi polami wektorowymi na  $M$ .

Niech  $X$  będzie polem wektorowym klasy  $C^r$  na  $M$  i niech  $(U, \varphi) = (U, x^1, x^2, \dots, x^n)$  będzie mapą wokół  $p \in M$ . Wówczas  $X_p = \sum_{j=1}^n a_j(p) \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p$  jest wektorem stycznym w  $p$ , gdzie  $a_j \in C^r(M; \mathbb{R})$ . Funkcję wektorową  $\mathbf{X} : U \ni p \mapsto [a_j(p)]_{j=1}^n \in \mathbb{R}^n$  nazywamy **lokalną reprezentacją**  $X$ .

Przez  $t \in \mathbb{R}$  będziemy na ogół oznaczać zmienną czasową. **Polem wektorowym zależnym od czasu** klasy  $C^r$  na  $M$  nazywamy odwzorowanie  $X : \mathbb{R} \times M \rightarrow TM$  takie, że  $X_t(m) := X(t, m) \in T_m M$  jest wektorem stycznym w  $m$  w chwili  $t$  dla wszystkich par  $(t, m) \in \mathbb{R} \times M$ . Przez  $X_t \in \mathfrak{X}^r(M)$  oznaczamy pole wektorowe na  $M$  w chwili  $t$ , gdzie  $\mathfrak{X}^r(M)$  to zbiór wszystkich pól wektorowych klasy  $C^r$  na  $M$ .

**Przepływem** (także operatorem ewolucji) na  $M$  nazywamy 1-parametrową grupę dyfeomorfizmów  $\varphi_t : M \rightarrow M$  z operacją składania  $\varphi_{t_1} \circ \varphi_{t_2} = \varphi_{t_1+t_2}$  dla  $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ , gdzie  $\varphi_0$  jest elementem neutralnym i  $\varphi_t \circ \varphi_{-t} = \varphi_0$  dla dowolnego  $t \in \mathbb{R}$ .

**Trajektorią** (także: linią przepływu, krzywą całkową) pola wektorowego  $X$  w punkcie  $m \in M$  nazywamy krzywą  $c : \mathbb{R} \supset I \rightarrow M$  o początku w  $m$ , taką, że  $c'(t) = X(c(t))$  dla każdego  $t \in I$ . Jeśli  $(U, \varphi) = (U, x^1, x^2, \dots, x^n)$  jest mapą wokół  $c(0) = p$  i  $[X^1, X^2, \dots, X^n]^T$  jest lokalną reprezentacją  $X$ , funkcja wektorowa  $\mathbf{c} = \varphi \circ c, I \ni t \mapsto [c^i(t)]_{i=1}^n \in \mathbb{R}^n$  jest lokalną reprezentacją krzywej  $c$  oraz spełniony jest układ równań różniczkowych pierwszego rzędu

$$\begin{aligned} \frac{dc^1}{dt}(t) &= X^1(c^1(t), c^2(t), \dots, c^n(t)), \\ \frac{dc^2}{dt}(t) &= X^2(c^1(t), c^2(t), \dots, c^n(t)), \\ &\vdots \\ \frac{dc^n}{dt}(t) &= X^n(c^1(t), c^2(t), \dots, c^n(t)). \end{aligned}$$

Pojęcia pola wektorowego, przepływu i trajektorii wiąże następujące twierdzenie

**Twierdzenie 1.1** (O lokalnym istnieniu trajektorii). *Niech  $p$  będzie dowolnym punktem rozmaiutości  $M$  i  $X_p \in T_p M$  dowolnym wektorem stycznym w  $p$ . Wówczas dla pewnego  $\varepsilon > 0$  istnieje gładka krzywa  $c : ]-\varepsilon, \varepsilon[ \rightarrow M$  o początku w  $p$  taka, że  $c'(0) = X_p$ .*

Wówczas  $u(x, t)$  oznacza prędkość cząsteczki próbnej przechodzącej przez punkt  $x \in M$ .

# Bibliografia