

因此，由CTP制备的实验样品为 Poly C。

三、CTP在啤酒酵母酶系以及PNPase的共同作用下，先减磷生成CDP，然后再聚合成大分子 Poly C 并产生减色效应。比较反应开始时的光吸收 (As) 及反应终止时的光吸收 (Ae)，我们可以求得CTP减磷并聚合成Poly C 的摩尔转化率。计算公式如下：

$$\text{转化率}\% = \frac{A_s - A_e}{A_s} \times 100\%$$

根据多批实验结果，表明CTP摩尔转化率在40%左右，与常规用CDP聚合 Poly C 的转化率相接近。制品的含量达80以上，达到了规定要求(见表二)。

表二

实验批号	反应起始时光吸收 (As)	反应终止时光吸收 (Ae)	转化率 %	含量 %
860601	0.450 × 3000	0.234 × 3000	48.0	82.3
860602	0.416 × 3000	0.232 × 3000	44.4	85.4

四，对两种方法制备得到的 Poly C 聚丙烯酰胺凝胶电泳图谱进行了比较(见图 2)，图谱表明，由CTP制备得到的 Poly C 分子量不低于由CDP制备得到的 Poly C 的分子量。

五，在聚肌胞的制备过程中，底物肌苷二磷酸(IDP)和 CDP 的制备量直接影响 Poly I:C 的产量。目前国内生产聚肌胞，有利用啤酒酵母使CMP(或 AMP)磷酸化成 CDP(或 ADP)，但转化率只有 40% 左右。也有的利用化学合成法制备IDP和CDP，致使成本高，生产周期长。本实验的改进工艺不仅为 Poly C 的制备开辟了一条新途径，解决了 Poly I:C 制备底物来源困难的矛盾，而且为其他多聚




图 2 聚丙烯酰胺凝胶电泳图谱

核苷酸如 Poly A，Poly I 等的制备起到了触类旁通的作用，从而为大量制备 Poly I:C 打下了基础。

参 考 文 献

[1] Field, A. K. et al.: Inducers of interferon and host resistance. Proc. Nat. Acad. Sci. U. S., 58:1004, 1967

[2] “全国聚肌胞专题学术会议纪要”(内部资料), 1985年11月

[3] 韩晓旭等, 抗病毒新药聚肌胞 (Poly I:C) 的实验研究, 浙江药学, 1984年10月

[4] “聚肌胞注射液评议会议纪要”(内部资料), 1985年 6 月

《处方药物相互作用简明手册》即将出版

《处方药物相互作用简明手册》系由胡长鸿、刘昌治、何达康根据国外最新出版十余种有关专著编译而成。全书收载常用药物500余种,按作用增强、减弱和其他相互作用等叙述, 条例简明清晰, 查阅极为方便, 为临床医师提供处方用药和药师开展临床药学以及护师合理给药的必备手册。

本书由浙江科技出版社出版, 预定1987年第一季度由新华书店发行, 全书30万字, 定价2.75元, 如需者可向当地新华书店征订或汇款杭州武林路浙江科技出版社发行科订购(账号: 工商银行杭州市支行6601105, 单位订购加邮挂费10%, 个人购买二本以下加邮挂费0.12元), 1987年2月底截止。