

与他汀类药物相互作用： 常常可预防

• 鲁向楠

他汀类药物可显著降低心脏疾病风险，但是需保持警惕。

近四分之一 40 岁以上成人服用药物治疗高胆固醇，最常使用的是他汀类药物。然而，随着广泛的应用，特别是有其他心血管风险因素的患者使用这个药物，可发生他汀类药物和其他药物之间的有害相互作用。出于这个原因，美国心脏协会最近发布的一项声明有助于医生更好地为患者选择药物。

什么是药物相互作用？

“药物相互作用”这个术语有点令人误解。一般来说，在体内药物之间不会发生化学反应。相反的是，药物、补充剂或食物可影响药物在体内滞留的时间，通常刺激或抑制肝脏或小肠内某些酶的生成（见后文“西柚

汁真相”）。

哈佛附属布莱根妇女医院副教授 Blankstein 博士解释道，在发生药物-药物相互作用的情况下，一种或两种药物的有效性可能降低，因此无法产生理想的治疗效果。或发生相反情况，药物的血药浓度升高至毒性水平。

选择某种他汀类药物

他汀类药物的靶点为参与胆固醇生成的酶。当这种酶受到阻滞时，肝细胞生成较少的胆固醇，并且有害的 LDL 胆固醇血液水平下降。

在选择适合你的他汀类药物时，你的医生会考虑几个因素，包括你的心脏疾病风险。已经有心脏疾病或风险最大者或需要服用较高剂量或药效较强的药物。

有时候，胆固醇水平非常高的人需要服用第二个降胆固醇药物，将LDL控制在可接受范围内。如果有必要采取这一步，则需慎用贝特类家族药物，因为它们具有副作用风险。心脏疾病患者可能也需要服用降低血压的钙通道阻滞剂或控制异常心律的药物。这两类药物中，皆有某些药物可能与他汀类药物发生危险的相互作用。

但是针对这些障碍，还是有解决方法。他汀类药物的分布与代谢方式、范围差异很大。其被吸收的速度和排出时间差异也很大。“这些差异为医生提供了寻找最有益药物的多种方法，或者在某些情况下，可联合副作用最少的药物。”Blankstein博士说道。

做好安全措施

为最大程度降低有害药物相互作用的风险，告知你的初级保健医生你目前正在服用哪些药物，包括非处方药和补充剂。通常，这份清单包含在你的电子病历中，可突出显示潜在的副作用。

此外，在同一个药店配处方药也有帮助。药店记录了所配的所有处方药，但是一个药店可能无法获取另一个药店的记录。此外，如果你有关于新药的问题，不妨告知药师或医生。他们可为你讲解药物如何起作用、可能的副作用以及可与之发生相互作用

的其他药物。另外，需说明的是，大多数服用他汀类药物的患者（约90%）并没有发生副作用。

如果医生为你开了新的处方药，确保你的医师知道你服用的所有药物和补充剂。

西柚汁真相

西柚含有可以改变机体处理他汀类药物的化合物。这些化合物称为呋喃香豆素，可干扰对血液他汀类水平有影响的酶。然而，西柚汁并不是对所有的他汀类药物都有相同的影响。因此，喜欢西柚的人可换成受影响较小的一种他汀类药物。但是，如果你不能换药，专家称喝一小杯并没有什么问题。因为证明其危险作用的研究使用一夸脱或更多西柚汁含有的大量呋喃香豆素。但是，为了安全考虑，请与医生商量，避免与西柚汁一起服用药片。

与西柚汁同服有较大影响的药物

阿托伐他汀(商品名:Lipitor)

洛伐他汀(商品名:Mevacor)

辛伐他汀(商品名:Zocor)

与西柚汁同服很少/无影响的药物

氟伐他汀(商品名:Lescor)

匹伐他汀(商品名:Livalo)

普伐他汀(商品名:Pravachol)

罗苏伐他汀(商品名:Crestor)。