

## 合理用药 “药”你健康

赤峰学院附属医院 马志超

药物是生活乃至临床中的重要一环，小到常见的感冒药，大到抗癌的化学治疗药物，药物在保护我们身体健康的过程中扮演着重要角色。但是，老话说“是药三分毒”，在采用药物治疗疾病的过程中，一定要严格控制药物的适应证和治疗方法，避免因不合理用药导致对身体造成危害。因此，合理用药的必要性和方法不容忽视。

### 遵医嘱用药

医生开具的药方是在大量的专业知识储备和丰富经验的基础上，根据患者的实际病情和身体状况制定的符合身体条件的用药指导方案。严格遵循医嘱进行药物治疗是提高治疗效果的关键。随意改变药物治疗方法，包括停药、更改剂量等，都可能导致治疗效果受到影响，严重时可能会对身体造成损害，甚至危及生命安全。例如，在治疗高血压时，患者需要长期服用降压药物来控制血压。部分患者可能在血压得到控制后就自行停药，导致血压出现反弹，血压的波动明显增加，进而导致心、脑、肾脏等器官受到损害，还可能增加心脑血管疾病的发生风险。值得一提的是，在抗生素治疗感染时，患者一定要根据医嘱进行严格用药，保证病菌彻底清除。如擅自停药，病菌未能完全清除，残余的病菌可能出现耐药性，导致后续治疗难度增加。

### 掌握药物使用方法

不同的药物的使用方法和使用时间存在明显差异，通过掌握药物特性能够影响药物的吸收和治疗效果。很多药物说明书上会对使用要求进行详细说明，但患者在使用过程中极易忽视这些重要信息。例如，治疗胃酸的质子泵抑制剂往往需要空腹服用，空腹服药能够使药物快速发挥抑酸作用；而促进消化的药物需要在饭前服用，以便食物可以加速消化；非甾体类抗炎药等往往对胃黏膜具有刺激作用，需要饭后服用以减少药物和胃黏膜的接触，避免发生胃肠道不良反应。同时，药物剂型和服药方法也直接相关。胶囊剂型需整粒吞服，切勿拆开，以免影响药物的释放和吸收。

### 警惕药物的相互作用

随着我们健康意识的不断提高，很多人在患有多种疾病时会使用多种药物，但不同药物之间可能会产生药物相互作用，导致药物的效果改变，增加不良反应的发生风险。常见的案例是他汀类降脂药物与大环内酯类抗生素同服时，大环内酯类抗生素会抑制他汀类药物的代谢，导致体内药物浓度水平增加，提高肌肉和肝脏损伤的可能性。因此，在就诊时，患者需要向医生说明自身正在使用的药物，包括保健品、非处方药及处方药等，使医生能够准确评估药物的相互作用。如果必须同时使用多种药物，应该根据以上建议合理用药，避免药物相互作用的发生。

### 理性看待药物不良反应

所谓的药物不良反应是指在正常合格药物的科学用法用量下出现的与药物治疗目的无关的有害反应。几乎所有的药物均可能产生不良反应，只是药物的不良反应类型和严重程度存在差异。多数药物不良反应较为轻微，例如感冒药可能出现的嗜睡、头晕等，患者在停药后即可缓解。但部分情况下也可能出现严重不良反应。例如，部分过敏患者在服用青霉素类药物时会诱发过敏性休克，导致患者生命安全受到威胁，需要立即展开急救。因此，患者在用药过程中出现不适感时需要及时告知医生，医生会根据实际情况判定是否为药物不良反应，并给予对应的处理措施，包括更换药物、改变药物剂量等。同时，患者也需要端正自身的心态，避免因担心药物不良反应而拒绝药物治疗。医生在开药物时会全面考虑药物的治疗效果和安全性，确保该药物是现阶段最适合患者的，能够在一定程度上控制不良反应的发生。

合理用药是保障健康的重要环节。我们每个人都应该增强合理用药的意识，了解基本的用药知识，遵循医生的建议，正确使用药物。只有这样，我们才能让药物发挥最大的治疗作用，同时减少不必要的风险，真正实现“药”到病除，享受健康美好的生活。希望大家都能重视合理用药，为自己和家人的健康负责。让我们从现在开始，用正确的方式使用药物，为健康保驾护航。