

癫痫发作史者应慎用。儿童、孕妇尽量不用。

喹诺酮类与其它药物相互作用

李和柏 吴春萍

(四川省达川地区人民医院 635000)

喹诺酮类是近年迅速发展起来的一类合成抗菌药,国产有:吡哌酸、氟哌酸、甲氧哌酸、氟嗟酸、氟啶酸、环丙氟哌酸等是目前常用药物。它的抗菌谱广、抗菌活性强、吸收完全、组织体液内浓度高、半衰期长、使用方便;口服、注射、外用、眼用等,临床应用日益广泛。因此,喹诺酮类与其它药物在临床上应用的机会增多,本文就其配伍用药作一简述。

1. 协同作用:

1) 吡哌酸与含有机酸的中药。

2) 吡哌酸与酸性中成药。

3) 环丙氟哌酸与其它抗生素联用。

4) 吡哌酸与乌洛托品合用,由于吡哌酸为酸性药物,乌洛托品在酸性环境中分解出甲醛发挥抗菌作用,因此,两药合用有协同作用。

5) 环丙氟哌酸与西米替丁合用,前者可使后者血药浓度升高,临床实验证明,两药合用,能加速溃疡愈合。

2. 疗效减弱

1) 吡哌酸与碱性药物合用。

2) 吡哌酸与乳酶生合用。

3) 环丙氟哌酸与苯妥英钠合用。

4) 环丙氟哌酸与含钙、镁、锌、铝等多价阳离子药物合用,因阳离子能与环丙氟哌酸结构中的 4-酮氧基 3-羧基产生螯合作用,减少了二药的吸收,降低了二药的生物利用度。

3. 增加毒付反应

1) 与布洛芬同用,因布洛芬的主要代谢产物为双苯乙酸,当喹诺酮类药物与双苯乙酸联用时,可促使喹诺酮类药物诱发惊厥、癫痫。因此,当非甾体消炎药布洛芬与氟啶酸等合用时,应警惕可能发生抽搐。

2) 甲基黄嘌呤类药物与喹诺酮类合用,因喹诺酮类可抑制肝微粒体细胞色素 P_{450} 同功酶,引起甲基黄嘌呤类药物(茶碱)代谢减慢,使茶碱血药浓度升高而中毒。老年人尤易发生。

3) 与丙磺舒合用,丙磺舒能阻滞肾小管的分泌,从而减少喹诺酮类某些药物的肾清除。