

- caused by *Mycobacterium abscessus*[J]. AJR AM J Roentgenol, 2003, 181 (2): 513-517.
- [38] FUJITA J, OHTSUKI Y, SUEMITSU I, et al. Pathological and radiological changes in resected lung specimens in *Mycobacterium avium* intracellulare complex disease[J]. Eur Respir J, 1999, 13 (3): 535-540.
- [39] ROSSMAN MD. Colonization with *Mycobacterium avium* complex—an outdated concept[J]. Eur Respir J, 1999, 13 (3): 479-479.
- [40] OLIVIER KN, YANKASKAS JR, KNOWLES MR. Nontuberculous mycobacterial pulmonary disease in cystic fibrosis[J]. Semin Respir Infect, 1996, 11 (4): 272-284.
- [41] GRIFFITH DE, AKSAMIT T, BROWN-ELLIOTT BA, et al. An official ATS/IDSA statement : diagnosis, treatment, and prevention of nontuberculous mycobacterial diseases[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2007, 175 (4): 367-416.
- [42] MEHTA M, MARRAS TK. Impaired health-related quality of life in pulmonary nontuberculous mycobacterial disease[J]. Respir Med, 2011, 105 (11): 1718-1725.
- 收稿日期 : 2015-02-25 修回日期 : 2015-06-17

· 信息交流 ·

抗丙型肝炎药物的药物相互作用导致 Gilead 公司股价下跌

Gilead shares dip after warning about hepatitis C drug interaction

2015 年 3 月 23 日, 在向外界通报新型抗丙肝药与抗心律失常药胺碘酮合用可能出现严重不良反应后, Gilead 公司股价当日下跌 2%。

Gilead 公司表示, 已于上周五向医疗机构发送警告邮件, 报告 9 例患者因合用胺碘酮和抗丙肝药 Harvoni 或 Sovaldi 而出现心动过缓, 其中包括 1 例死亡, 7 例患者同时服用 β 受体阻滞剂。9 例患者中有 6 例在合用上述药物后即出现心动过缓症状, 3 例患者需植入心脏起搏器。

目前 Gilead 公司新型抗丙肝药已加注警告标示, 提醒患者避免同时服用胺碘酮, 特别是正在服用 β 受体阻滞剂的患者。AbbVie 公司抗丙肝药物 Viekira Pak 也已加注类似的警告标示。

胺碘酮是一个治疗严重心律失常的老药, 如室性心动过速和室颤不良反应多, 毒性大。新型抗丙肝药物是病毒性肝炎治疗领域的一个重大突破, 不仅对 90% 以上的丙肝患者有效, 而且相比

于传统治疗方案, 不良反应明显减少。

一份研究报告指出, Gilead 公司的通告并不会对抗丙肝药 Harvoni 及 Sovaldi 的销量造成太大影响。因为使用胺碘酮的患者数量相对偏少, 且无确切证据表明丙肝病毒感染者使用胺碘酮的概率会出现大幅上升, 所以排除需要合用胺碘酮药物的患者并不会对抗丙肝药物的市场需求造成太大影响。

Sovaldi 在 2014 年第四季度的销售额为 17 亿美元, 而包含 Sovaldi 的新型复方药物 Harvoni 的同期份额高达 21 亿美元。Gilead 公司在一份声明中表示, 相信 Sovaldi 和 Harvoni 的安全性, 并不会与医疗机构积极合作监测抗丙肝病毒药物的用药安全。

News. gilead shares dip after warning about hepatitis C drug interaction. Clin Infect Dis, 2015, 60 (15 May).

沈 震摘译 王明贵审校

收稿日期 : 2015-09-22