

# 注意三普红景天胶囊药物相互作用

青海医学院附属医院 魏建民

三普红景天胶囊是青海三普药业股份有限公司制药厂,利用青海省地道地产药材,红景天、沙棘、枸杞三味中藏药配伍研制而成。采用现代药物剂型——胶囊剂,近期已在西宁上市,开始用于临床。

该药具有抗缺氧、抗疲劳和延缓衰老作用,还有增强体力、增加记忆、降低血液粘稠度,改善微循环作用。尤其是在提高体内超氧化物歧化酶(SOD)的活性,加快消除体内氧化自由基,保护体内器官和组织,免遭自由基氧化损害作用方面具有突破性进展。在为临床医生治疗心血管系统疾病,如心肌缺血、冠心病、肺心病和红细胞增多症等疾病提供一个可以选择的新药。因刚上市,临床上应用的时间还很短,尚未见到临床上对该药应用的不良反应加病例疗效的报道资料。所以具体评价该药的效果如何还为时尚早。

笔者在阅读厂家印发的三普红景天胶囊介绍资料及有关资料时,发现胶囊中的三味中藏药:红景天、沙棘和枸杞中约含有铜(Cu)、铁(Fe)、锌(Zn)、锰(Mn)、钙(Ca)等多种金属元素和多种维生素,尤其是维生素C含量最高,这就涉及到药物间的相互作用问题。因为临床医生目前很少开单味药处方治疗疾病,多采用两种或两种以上药物联合应用。有许多患者即看西医同时还看中医,中西药同时服用的机率很多,有的患者还自行买药应用。所以联合用药中存在药物相互影响,可使药效增强,也可使药效降低或消失。

## 1 该药与四环素类抗生素相互作用:

例如:四环素或土霉素、甲烯土霉素等,若分别与三普红景天胶囊同时口服,两药在胃肠道内相遇,则前者与胶囊药物中含的金属离子相遇形成不能吸收的络合物,使四环素等药物在胃肠中的吸收量减少,血药浓度降低,抗菌作

用减弱。有报道40mg的 $Fe^{2+}$ 能使500mg四环素的最高血药浓度2900 $\mu g/L$ ,降低40~50%,使500mg土霉素的最高血药浓度2300 $\mu g/L$ 下降50~60%,使300mg甲烯土霉素的血药浓度2400 $\mu g/L$ 下降80~85%。所以四环素类抗生素不宜与含这些金属离子的药物,包括三普红景天胶囊同时服用。应将两类药物服用时间分开,间隔2h,使之不在胃肠相遇,即保证了四环素类抗生素的吸收量<sup>[1]</sup>。

## 2 与氟喹诺酮类药物相互作用:

氟喹诺酮类药物是近十几年发展很快的一类抗菌药物,临床应用的品种很多,用量很大。因化学结构中的4-酮氧基3-羟基也能与上述金属离子形成络合物,影响喹诺酮类药物的吸收,生物利用度降低,AUC减小,抗菌作用减弱。所以氟喹诺酮类抗菌药物也不宜与该胶囊同时服用,两类药物一旦遇到联用时,应将服药时间错开2小时,不影响前者的吸收量<sup>[2]</sup>。

## 3 该胶囊与铁剂合用相互作用<sup>[3]</sup>:

因胶囊中的药物含维生素C的量较高,维生素C是属还原性物质。铁剂中的铁以2价铁( $Fe^{2+}$ )容易吸收, $Fe^{3+}$ 不宜吸收。维生素C有助于使 $Fe^{3+}$ 还原成 $Fe^{2+}$ ,利于吸收。所以该胶囊与铁剂,如枸橼酸铁胺,蛋白琥珀酸铁,硫酸亚铁等合并应用,可提高铁的吸收量,提高疗效。

总之药物之间的相互作用是一个非常复杂的问题,特别是体内的相互作用又比较隐蔽,易被人忽略。这里对三普红景天胶囊这个新药提出几点,供应用时参考。

## 参 考 文 献

1. 赵德华,赵更生,主编. 高等临床药理学教程. 第二版. 西安:陕西人民教育出版社,1995:51~52.
2. 邓万俊. 氟喹诺酮类药物的相互作用. 中国医院药学杂志 1993;13(10):449.
3. 江明性,主编. 药理学. 第四版. 北京:人民卫生出版社,1996:213.