

医药咨询

021 甲氰咪胍与苯二氮革类药是否存在药物相互作用?

甲氰咪胍(西米替丁)适用于短期(8周)治疗十二指肠溃疡、病理性胃酸分泌过多和预防十二指肠溃疡的复发或需行外科手术者。由于甲氰咪胍可抑制微粒体酶的代谢,故可和一切经肝脏代谢的药物发生药物相互作用。

Desmond 等给 8 名研究对象在用甲氰咪胍治疗的 1 周前后,分别测定了利眠宁的分布和其消除。作者认为服用正常剂量甲氰咪胍后可能干扰利眠宁在身体内的消除。

Klotz 和 Reimann 给 6 名志愿者使用甲氰咪胍和安定后表明,使用甲氰咪胍治疗时,安定的消除率有所降低。另外,对其中 5 例患者具有较一般大得多的镇静作用。

Patwardham 等对 8 名志愿者先用治疗量的甲氰咪胍 7 天后,研究了氯羟安定(lorazepam)和羟基安定(oxazepam)的消除作用。结果表明,上述两药的消除未受甲氰咪胍的影响。

总之,甲氰咪胍可能会使肝脏代谢的苯二氮革类的消除推迟,从而延长了这类药物的药理作用。但因氯羟安定和羟基安定不需经过肝脏代谢,因而不致受到甲氰咪胍的影响。所以,如果甲氰咪胍需和苯二氮革类合并使用时,氯羟安定和羟基安定是首选的药物。

(张建华)

022 关节炎患者是否可用炎痛喜康?其疗效如何?

Pfizer 发现炎痛喜康(piroxicam)是一种新型非甾体抗炎药物(NSAID),商品名为 Feldene。这一新型药物在结构上与目前使用的 NSAID 不同。Ginsberg 等在治疗 16 例骨关节炎或类风湿关节炎时,以本品 20mg

每日一次给患者使用。骨关节炎患者服用后,病情有明显好转(经统计学处理);虽然一些类风湿关节炎患者的病情也有好转,但无统计学意义。

Aderounmu 等给 34 例骨关节炎患者每日服用炎痛喜康 20mg,对疼痛、肿胀等症状取得显著改善,经 12 周的治疗后全身症状也有好转。作者认为炎痛喜康对骨关节炎的治疗是有效的。

Abruzzo 等给 31 例骨关节炎患者用炎痛喜康或阿司匹林作对照治疗,发现前者比后者更为有效,副作用也较少。

Pisko 等在治疗 45 例类风湿关节炎患者时,每天使用炎痛喜康 20—40mg 达 946 天。虽有 13 例因剂量过大而发生消化道溃疡,结果表明,炎痛喜康仍是治疗类风湿关节炎的可靠药物。

在治疗骨关节炎与类风湿关节炎方面,其他研究者也表明炎痛喜康较其他 NSAID(消炎痛和保泰松)为佳。

用本品治疗中,偶可产生一些副作用,如眩晕、胃肠道刺激、消化道溃疡、消化不良、皮疹和头痛。还可有倦睡、下肢无力和气胀等。副作用的出现与次数,似乎较目前常用的同类药物为少。

总之,炎痛喜康为一种新型非甾体抗炎药,临床疗效较目前常用药物的效果稍佳。尚具有半衰期长,每日只须给药一次的优点。

(张建华)

023 熊去氧胆酸治疗胆囊结石的疗效是否优于鹅去氧胆酸?

据美国胆囊结石协作研究所报道,鹅去氧胆酸(CDCA)对某些胆结石病人有一定效果,但有 3% 病人可发生明显肝脏毒性、85% 病人的血胆固醇升高、还有腹泻副作用。每天应用 CDCA 750mg,治疗 2 年后仅有