

抗菌药物是临床上最常用的药物品种,滥用现象也最为常见。一是病毒感染(如感冒)用抗菌药,在门诊病人及患者自主用药中这种例子实在太多。二是抗菌药的适应症问题,任何抗菌药都有其各自的抗菌谱。并不是越“高级”效果就一定越好。

## 2 糖皮质激素使用问题

在近些年的临床实际用药中,糖皮质激素的滥用现象也不容忽视。不少临床医生给普通感冒或流感高热病人用糖皮质激素以求迅速退热,结果削落了人体

的自身抗病毒能力,是感冒症状迁延不愈。这方面的例子可以说不胜枚举。

## 3 一分为二来看待新药

多数新药比起相应老药疗效好,不良反应少。但老药因“久经考验”,发生意想不到的危险机会小。

## 4 注意药物的毒副反应

近些年来药物的不良反应发生越来越多,也越来越严重。大力宣传有关药物不良反应的知识至关重要,刻不容缓。

# 浅谈高血压病的治疗

刘 萍 (四川省宜宾卫校)

高血压的治疗是世界性的医学难题,发病率高,是造成心血管疾病死亡的主要原因之一,根据临床实践显示,结合高血压病的病因分析,合理选用药物,配合病人的饮食疗法对高血压病的医治起着关键性的作用。

目前,医治高血压病药物的种类繁多,如何合理选用药物,达到最好的疗效,最小的不良反应,应该从以下三方面考虑:

- 1 根据病情的轻重选用;
- 2 根据病人的并发症选择药物;
- 3 治疗剂量个体化;

高血压病人的饮食疗法:

饮食疗法是中医传统中独具特色的一种治疗方法,在当今日益高涨的回归自然呼声中更显出不同寻常的魅力。唐代名医孙思邈说过:“为医者,当须晓病

源,知其所犯,以食治之,食疗不愈,然后命药”。说明了饮食疗法的重要性,现推荐简单易制的饮食处方 20 例。鲜芹菜汤、醋泡花生米、西红柿拌白糖、冰糖水熬山楂、洋葱煮、炒、煎、炸、开水泡海带、香蕉皮煎水、鲜猕猴桃、柿饼煎汤、桃仁糯米粥、冰糖熬木耳、鲜胡萝卜梗米粥、鲜茄子鲜芹菜汤、醋熬蜂蜜、芹菜苦瓜汤、芹菜红枣汤、柠檬荸荠汤、夏枯草瘦肉汤、菊花梗米冰糖汤、天麻汁煮鸡蛋。

在饮食疗法中,还应注意控制钠(不超过 100mmol/d),控制饮酒量(不超过乙醇 30ml/d),食取适量的钾保持(90mmol/d),并且肉食以鱼类为主。

综上所述,高血压病患者在明确病因的前提下,做到合理用药,配合正确的饮食习惯,对其疾病的医疗有着重要的意义。

# 药物相互作用与临床用药监护

朱晓雯 (云南省大理卫校)

由于药物种类日益增多,临床合并用药的机会和种类也越来越多,且常常忽视因药物相互作用而使疗效降低,甚至出现严重不良反应的情况;加上在用药中具体的执行和操作者是护士,她们不但要知道有关药物的相互作用,还在治疗中应进行用药的监护,及时发现问题、及时报告医生,做到及时进行处理,对在校的护士进行药理学教学的过程中,强调药物相互作用与临床用药监护是十分重要的。

药物相互作用与用药监护主要以下两个方面:(1)药物在体外的相互作用:如药液的 pH 值,药物溶剂的改变,药物混合先后顺序的影响及配伍药物时的监护等问题。(2)药物在体内的相互作用:包括药动学的相互作用:如胃肠道吸收、与血浆蛋白的结合、生物转化、排泄过程等药物的相互作用和药效学的相互作用:如协同作用、敏感化现象、拮抗作用等及用药当中应注意的监护问题。