



药物相互作用汇集表 (续完)

激 素

雄 性 激 素

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
甲基雄烯醇酮	口服抗凝药	抗凝作用增强
	羟基保泰松	可使羟基保泰松的血浆浓度增高
去甲乙基睾酮；睾丸素	口服抗凝药	抗凝作用增强
	苯巴比妥	睾丸素可因酶促作用而减弱

皮 质 激 素

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
皮质激素	制酸药	皮质激素可引起胃酸过多或消化性溃疡，如长期应用皮质激素应以制酸药预防
	口服抗凝药	可引起抗凝药的效应改变
	抗结核药	皮质激素常禁用于结核病患者，但在某些病例，如与抗结核药合用时可挽救生命
	巴比妥盐类	皮质激素的作用可因酶促作用而减弱
	苯妥英钠	已证实，苯妥英钠可引起酶促作用，从而促进皮质激素的代谢
	利尿药	由于皮质激素和利尿药均可引起低钾血症，故可出现钾的大量丢失
	降血糖药	皮质激素可提高血糖浓度，降血糖药的剂量需增大
	碘酊	皮质激素可促进病毒感染的扩散，除非绝对需要，一般不宜与碘酊同时服用
	水杨酸盐类	合并用药于治疗关节炎患者时必须谨慎，因有增加胃肠道溃疡的危险

雌 性 激 素

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
雌激素和孕激素合剂（口服避孕药）	抗凝药	口服避孕药可减弱抗凝药的作用，抗凝药的剂量需增大
	降血糖药	可提高血糖浓度，降血糖药的剂量需增大

甲 状 腺 素

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
甲状腺制剂 (Thyroid preparations)	右旋甲状腺素	甲状腺制剂的剂量宜加调整
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药和甲状腺的效应均可增强

降 血 糖 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
胰岛素，降糖灵 (Phenformin, DBF)，磺酰脲类 [乙酰己酰胺，氯磺丙脲 Tolazamide (Tolinase) 和 甲苯磺丁脲]	皮质激素；右旋甲状腺素；利尿药（噻嗪类，氢噻酮，利尿酸，速尿灵） 雌激素 菸酸（大剂量） 口服避孕药	这些药物均可提高血糖浓度，降血糖药的剂量需增大
	醇	反应不能预测，曾报导，在与磺酰脲合用时出现双硫醒样反应；报导指出，嗜酒患者的甲苯磺丁脲代谢增加可能与酒量有关，而与是否是慢性嗜酒者无关
	单胺氧化酶抑制剂	降血糖作用增强
	心得安	可引起低血糖。由于心得安阻碍急性低血糖的前兆体征和症状表现，故其潜在危险性也增大

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
磺酰脲	口服抗凝药	已证实, 香豆素抗凝药可抑制磺酰脲的代谢, 而增强降血糖作用
	巴比妥盐类 (及其它镇静药和催眠药)	磺酰脲可延长这些中枢神经抑制药的作用
	安妥明	对糖尿病人给予安妥明治疗必须注意观察, 有篇报告指出, 安妥明可增强苯磺丁脲的降血糖作用
	胰岛素	降血糖作用增强
	羟基保泰松 保泰松	降血糖作用增强, 曾报导保泰松干扰乙酰己酰胺的活性代谢物的排泄; 在这些相互反应中也有蛋白质的置换反应参与
	降糖灵 Phenylramidol (Analexin)	降血糖作用增强 降血糖效应可因代谢受抑制而增强
	羧苯磺胺	曾报导, 降血糖效应增强; 但也有报导指出羧苯磺胺对甲苯磺丁脲的代谢影响很小
	水杨酸盐	降血糖效应增加, 部分原因由于蛋白结合部位被置换所致
	磺胺吡啶二酮	降血糖作用增强
	磺胺	降血糖效应可能由于蛋白结合部位被置换而增强; 多数肯定的资料是研究磺胺苯吡啶和甲苯磺丁脲的应用问题

降 压 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
全部降压药	麻醉药	降压作用增强
	利尿药 (噻嗪类等) 其他降压药, 吩噻嗪类, 单胺氧化酶抑制剂, 三环抗抑郁药 血管扩张药	这些药物也可引起血压下降, 从而增强降压作用; 故降压药物的剂量常须减少

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
胍乙啶	醇	醇可加重体位性低血压，这在用胍乙啶治疗时常可遇见
	苯丙胺 麻醉药	可减弱胍乙啶的降压作用 手术前二周内不宜服用胍乙啶，以免在麻醉过程中可能发生血管性虚脱
	洋地黄	此二药均可减慢心率
	麻黄碱 利他林	可减弱胍乙啶的降压作用
	单胺氧化酶抑制剂	胍乙啶不宜与单胺氧化酶抑制剂同时服用，或至少在其停药一周后才可服用
	去甲肾上腺素	使去甲肾上腺素的效应增加；嗜铬细胞瘤患者不宜用胍乙啶
	萝芙木生物碱	同时服用可增加体位性低血压，心动过缓和精神抑郁
	三环抗抑郁药	胍乙啶的降压作用可被拮抗
	血管加压药	发生心律不齐的机会增多
胍苯达嗪 (Hydralazine, Apresoline)	肾上腺素	肾上腺素的升压效应减弱
Mebutamate(Capla)	醇 中枢神经抑制药	Mebutamate 可增强这些药物的作用
美加明 (Mecamylamine, Inversine)	尿道酸化剂	美加明的作用可能因排泄率的增加而减弱
	尿道碱化剂	美加明的作用可能因排泄率的减慢而增大
甲基多巴	苯丙胺	降压作用减弱
	利尿药（如噻嗪类）	降压作用增强；利尿药还可对抗甲基多巴治疗中出现的体重增加和水肿
	单胺氧化酶抑制剂	可出现头痛、高血压以及类似症状，应避免合并用药
	去甲肾上腺素	去甲肾上腺素的作用增强
	三环抗抑郁药	降压作用减弱

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
优降宁（见抗郁药项下的单胺氧化酶抑制剂） 萝芙木生物碱：[萝芙木蛇根碱 (Rauwolfia Serpentina, Raudixin), 利血平, 去甲氧利血平(Deserpidine) 桂皮利血胺 (Rescinnamine, Moderil) 和 Syrosingopine (Singsorp)]	麻醉药	在手术前应停用萝芙木碱衍生物二周，以免麻醉时出现血压过低
	镇惊药	可下降敏感病人的惊厥阈，因此须增大镇惊药的剂量
	洋地黄	因会出现心律不齐，故合并用药必须谨慎
	胍乙啶	同时服用可增加体位性低血压，心动过缓和精神抑郁
	单胺氧化酶抑制剂 (MAOI)	MAOI 可抑制由萝芙木碱从组织贮存部位释放出的色胺的破坏，在用优降宁时或用药一周内不宜注射利血平
	去甲肾上腺素	可增加去甲肾上腺素的动脉效应
	心得安	附加的儿茶酚胺阻断作用可明显降低休止交感神经的活性
	奎尼丁	会出现心律不齐，故合并用药必须谨慎
藜芦生物碱	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药可阻断或逆转利血平的抑制作用
	洋地黄	病人如同时服用洋地黄极易发生心律不齐
	吗啡 (Morphine)	藜芦碱的心搏徐缓作用与吗啡及有关药所产生的作用起加和作用
	奎尼丁	在同时服用时应注意观察

肌 肉 松 弛 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
抗震颤麻醉药	单胺氧化酶抑制剂	曾报导，同时服用会出现严重反应，故必须谨慎
	卤吐醇 吩噻嗪类 萝芙木生物碱 硫杂蒺类	与抗震颤麻醉药常合并用于控制锥体外系症状

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
麦酚生 (Mephensin, Tolserol)	巴比妥盐类	合并用药可引起明显的镇静和呼吸抑制作用
Orphenadrine (Disipal, Norflex)	达丰 (丙氧芬)	曾报导, 患者在同时服用时出现精神错乱, 焦虑及震颤
司可林, 十烃季铵, [去极化肌肉松弛药 (Depolarizing muscle relaxants)]	抗胆碱酯酶 [Echothiopate (Phospholineiodide), Edrophonium (Tensilon), 溴化六苄 (Hexafluorenum, Mylaxen), 新斯的明, 磷杀虫药等]	琥珀酰胆碱和十烃季铵的作用均增强
	抗菌素 [粘菌素 (抗敌素), 卡那霉素, 新霉素, 多粘菌素 B, 链霉素, 双氢链霉素和杆菌肽 (可能已有作用)]	这些抗菌素可干扰神经肌接合部位的神经传递作用, 肌肉松弛药的作用加强
	泛醇 (Dexpanthanol, Ilopan)	在琥珀酰胆碱服用后的一小时内不宜给予泛醇
	甲氧异丁噻	与琥珀酰胆碱合用时可出现血压下降和中枢神经作用加强
	普鲁卡因	静脉注射普鲁卡因可强化琥珀酰胆碱的作用,
	奎尼丁	肌肉松弛作用增强
筒箭毒碱 (非去极化肌肉松弛药)	麻醉药 [乙醚, 环丙烷, 三氟乙基乙烯醚 (Fluoroxene, Fluoromar), 卤烷 (氟烷), 甲氧氟烷 (Methoxyflurane, Penthrane)]	筒箭毒碱作用增强, 剂量应减少
	抗菌素 [粘菌素, 卡那霉素, 新霉素, 多粘菌素 B, 链霉素, 双氢链霉素和杆菌肽 (有可能)]	这些抗菌素可干扰神经肌接合部位神经传递作用, 可强化肌肉松弛药的作用
	抗胆碱酯酶药 (Edrophonium, 新斯的明等) 利尿药 (噻嗪类等) 奎尼丁	这些药物可拮抗筒箭毒碱的作用 利尿药可增强筒箭毒碱的作用 筒箭毒碱作用可增强

拟副交感神经兴奋药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
拟副交感神经兴奋药	泛醇	在服用拟副交感神经兴奋药后十二小时内不宜用泛醇, 否则将出现蠕动过度
抗胆碱酯酶药 [阿苯铵 (Ambenonium, Mytelase), Echothiophate (Phospholine iodide), 杀虫剂, 新斯的明, Pyridostigmine (Mestinon) 等]	琥珀酰胆碱 十烃季铵	琥珀酰胆碱和十烃季铵的作用均后增强
	筒箭毒碱	拮抗筒箭毒碱的作用
	相互之间以及和其他拟副交感神经兴奋药	作用增强
Echthiophate	毛果碱 (Pilocarpine)	初步报告表明, 预先用毛果碱对采用 Echthiophate 治疗晶状体有保护作用
新斯的明	抗胆碱能药	抗胆碱能药可延缓肠蠕动, 影响口服新斯的明的吸收
	卡那霉素, 新霉素, 链霉素	新斯的明可用于消除这些抗菌素所引起的呼吸抑制作用

镇 静 - 催 眠 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
全部镇静、催眠药	中枢神经抑制药 (醇, 麻醉药, 安定药, 其它镇静、催眠药等)	镇静作用增强
巴比妥盐类	醇	镇静作用增强
	口服抗凝药	抗凝作用可因酶促作用而减弱; 因此抗凝药的剂量需增大
	抗组织胺药	抗组织胺作用因酶促作用而减弱
	Diphenoxylate (Lomotil) 制剂 (含本品)	巴比妥盐类作用可增强
	苯妥英钠	苯巴比妥可因酶促作用而使苯妥英钠的作用减弱; 由于苯巴比妥也具有镇静作用故上述情况无临床意义
	灰黄霉素	灰黄霉素的作用可因酶促作用而减弱
	安眠药	镇静作用可能增强, 但催眠药的代谢可因酶促作用而加速

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
巴比妥盐类	氯化杀虫药	巴比妥盐类的作用可因酶促作用而减弱
	麦酚生	合并用药可引起明显的镇静和呼吸抑制作用
	单胺氧化酶抑制剂	巴比妥盐类的作用可增强，剂量应减少
	甾体激素	甾体激素的作用可因酶促作用而减弱
	磺酰脲	巴比妥盐类的作用延长
	三环抗抑郁药	动物试验表明，三环抗抑郁药可增强巴比妥盐类作用
水合氯醛	口服抗凝药	抗凝药作用可因酶促作用而减弱
	单胺氧化酶抑制剂	水合氯醛的作用可增强，剂量应减少
Ethchlorvynol(Placidyl)	阿密替林	曾报导，合并用药或可出现一过性谵妄
	口服抗凝药	曾报导，抗凝药可能因酶促作用而减弱
	单胺氧化酶抑制剂	镇静作用增强，Ethchlorvynol 的剂量应减少
导眠能	口服抗凝药	抗凝作用可因酶促作用而减弱
安眠酮 (Methaqualone, Quaalude)	甲基苄苄胺 (Methscopolamine, Pamine)	甲基苄苄胺作用延长

拟交感神经兴奋药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
拟交感神经兴奋药	Doxapram	升压作用增强
	单胺氧化酶抑制剂	合用时会出现严重高血压，不宜同服
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药和拟交感神经兴奋药的活性均增强
	黄嘌呤制剂	会出现中枢神经过度兴奋
苯丙胺衍生物	尿道碱化剂	苯丙胺的活性可因排泄率下降而增强
	胍乙啶	胍乙啶的降压作用减弱
	甲基多巴	降压作用减弱
肾上腺素	氯仿；环丙烷和卤烷-氟烷	这些麻醉药可使心肌对肾上腺素的作用增敏，合并用药可出现室性心动过速或纤维性颤动

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
肾上腺素	右旋甲状腺素	冠心病患者注射肾上腺素可促进冠状动脉机能不全；服用右旋甲状腺素的患者亦可能出现同样的情况
	卤吡醇；吩噻嗪类；硫杂蒴类	肾上腺素不宜用于治疗由这些药物引起的低血压症，否则它们将逆转肾上腺素的作用使血压进一步下降
异丙肾上腺素 (Isoproterenol, Isuprel)	洋地黄	异丙肾上腺素禁忌用于由于洋地黄中毒而引起心动过速的患者
	肾上腺素	这类药物不宜同时应用，因二者可对心脏有直接兴奋作用，合并应用会出现心律不齐，但可交替作用
	其他拟交感神经兴奋药	其他药物的剂量应当减少，以免引起过度反应
去甲肾上腺素 (Norepinephrine, Levophed)	氯仿，环丙烷，卤烷-氟烷	这些麻醉药可增敏心肌对去甲肾上腺素的作用；合并用药可能发生室性心动过速或纤维性颤动
	利尿药（噻嗪类等）	可减弱去甲肾上腺素的动脉效应
	胍乙啶	增加去甲肾上腺素的效应
	甲基多巴	去甲肾上腺素的作用增强
	萝芙木生物碱	可增加去甲肾上腺素的动脉效应
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药可增加去甲肾上腺素的升压作用

安 定 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
所有安定药	中枢神经抑制药（醇，巴比妥盐类麻醉药，镇静催眠药以及其它中枢神经抑制药）	镇静作用增强；增强的程度取决于各个安定药
	单胺氧化酶抑制剂	单胺氧化酶抑制剂可增强安定药的作用；如与吩噻嗪合用有加和降压作用
利眠宁	口服抗凝药	曾报导，抗凝作用会发生不同的改变
安 定	镇惊药	安定如用作辅助药治疗惊厥疾患时，基础镇惊药的剂量需增大
卤吡醇	麻醉药	麻醉作用增强

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
卤吡醇	口服抗凝药	曾报导, 卤吡醇有拮抗苯萘二酮(Phenindione)的作用
	镇惊药	在开始用卤吡醇治疗时, 镇惊药的剂量可不变, 但随后应酌情调整
	抗震颤麻痹药	可与卤吡醇合用控制锥外系症状
	肾上腺素	肾上腺素不宜用于纠正卤吡醇所引起的低血压, 因后者可阻断其血管收缩作用
眠尔通 吩噻嗪类和硫杂蒽类[氯丙 硫新(泰尔登Chlorprothix- ene, Taractan,)Thiothixene (Navane)]	口服抗凝药	抗凝作用因酶促作用而减弱
	全身麻醉药	麻醉作用增强
	抗胆碱能药(阿托品等) 镇惊药	抗胆碱能作用增强 吩噻嗪和硫杂蒽可降低敏感患者的惊厥阈; 镇惊药的 剂量需增大
	抗震颤麻痹药	吩噻嗪和硫杂蒽常合用于控制锥体外系症状
	安乃近	安乃近不宜与氯丙嗪合用; 因退热作用的加强可能引 起体温严重下降
	肾上腺素	肾上腺素不宜用于治疗吩噻嗪或硫杂蒽所引起的低血 压, 因这些药物可逆转肾上腺素的作用, 导致血压进一 步下降
	降压药(包括利尿药)	降压作用加强
	杀虫药(磷化合物)	杀虫药作用可增强
	戊四氮 (Pentylentetrazol) 印防己毒素(Picrotoxin)	作为兴奋药, 不宜应用过量, 否则会引起惊厥
	哌嗪(驱蛔灵)(Pipera- zine, Antepar)	吩噻嗪和一种吩噻嗪同服时, 将增大锥体外系作用
	三环抗抑郁药	三环抗抑郁药和吩噻嗪常合并用于治疗躁狂型抑郁症

利 尿 酸 尿 药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
利尿酸尿药	利尿药 噻嗪类等	利尿药可降低尿酸的肾排泄, 故利尿酸尿药的剂量需 加大

药名	同服药名	可能产生的相互作用
羧苯磺胺	尿道碱化剂	酸性尿易析出尿酸盐结晶；碱化小便可减少尿酸结石的形成
	对氨基水杨酸	羧苯磺胺可减少对氨基水杨酸的尿排泄，从而提高血浆浓度
	红霉素	动物试验证实，羧苯磺胺可抑制红霉素在肾小管的再吸收
	消炎痛	羧苯磺胺干扰消炎痛的肾排泄，但羧苯磺胺的利尿酸尿作用不被阻断
	青霉素类	由于羧苯磺胺干扰青霉素的肾小管排泄和减少其分布量，从而使青霉素类的作用增强
	水杨酸盐类	水杨酸盐可对抗羧苯磺胺的利尿酸尿的活性
	磺胺类	羧苯磺胺可提高磺胺的总血浆浓度
	磺酰脲	曾报导，降血糖效应可增强，但也有研究指出，羧苯磺胺对甲苯磺丁脲的代谢影响甚少
磺胺吡啶二酮	枸橼酸盐、水杨酸盐	磺胺吡啶二酮作用可被对抗
	胰岛素、磺酰脲	降血糖作用可增强
	磺胺	磺胺作用可增强

子 宫 药

药名	同服药名	可能产生的相互作用
催产药：[催产素，麦角新碱 (Ergonovine, Ergotrate) 甲基麦角新碱 (Methyle- rgonovine, Methergine)]	升压药	可引起过度的血压升高
催产素	硫酸金雀花碱(司巴丁)	硫酸金雀花碱和催产素的协同作用可引起子宫的强直性收缩；故在硫酸金雀花碱末次给药后数小时方可应用催产素

血 管 扩 张 药

冠状血管扩张药

药名	同服药名	可能产生的相互作用
硝酸盐	醇	醇可增敏这类药物的降压作用

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
硝酸盐	乙酰胆碱, 组织胺, 去甲肾上腺素	硝酸盐对这类药物有生理拮抗作用
	降压药	强力降压药应谨慎用药, 因如与硝酸盐合用可发生严重的低血压
硝酸脱水山梨醇酯	心得安	曾报导, 用于治疗心绞痛时有协同作用; 但对这些药物合并应用的益处尚有争论
潘生丁	毛地黄	有人认为潘生丁可增强洋地黄的作用, 但这种论点尚有疑问

周围血管扩张药

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
α -肾上腺素能阻断剂 [苯氧苯沙明 (Phenoxybenzamine, Dibenzylamine) 妥拉苏林 (Tolazoline, Priscoline) 等]	肾上腺素	肾上腺素不宜过量应用, 否则会使血压进一步下降 (肾上腺素逆转作用)
	心得安	这类药物可与心得安同时用于治疗嗜铬细胞瘤, 以防止血压急剧上升

维 生 素 类

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
对氨基苯甲酸	金治疗剂 (Gold therapy)	与金制剂合用治疗关节炎可引起皮炎和/或发热的机会增多
	磺胺类	由于磺胺与对氨基苯甲酸有竞争作用, 因此是有效的抗菌药; 对氨基苯甲酸的浓度如增大可减弱磺胺的活性
泛醇及泛酸盐	拟副交感神经兴奋药	在应用拟副交感神经兴奋药后十二小时内不宜服泛醇, 否则会出现过度蠕动
	司可林	在司可林服用后一小时内不宜应用泛醇
脂溶性维生素 A、D、E、K	去胆固醇树脂	这类维生素的吸收可受影响
	矿物油	长期服用矿物油可妨碍这些维生素的吸收

其 他

药 名	同 服 药 名	可 能 产 生 的 相 互 作 用
别嘌呤醇	硫唑嘌呤 巯基嘌呤	别嘌呤醇可抑制这些药物的代谢, 故这些药物的剂量应减少 $1/3$ 至 $1/4$
	铁盐	动物试验报导, 合并用药可增高肝铁浓度, 故应避免合用
	利尿酸尿药	合并用药对羟基嘌呤的尿排泄量要比别嘌呤醇单独服用时的排泄为少; 但是合并用药可保证许多患者收到良好的控制效果
谷氨酰精氨酸 (Arginine glutamate, Modumate)	其他药物	许多药物包括巴比妥、麻醉药以及利尿药等均可产生氨或干扰谷氨酰精氨酸的排泄
甲氨乙吡啶	抗组织胺药	甲氨乙吡啶为组织胺样药物, 故不主张与抗组织胺合用
去胆固醇树脂	其他药物	去胆固醇树脂在胃肠道内可与其他药物结合而影响其吸收; 去胆固醇树脂对酸性药物有很大的亲和性, 并有轻度的吸收中性和碱性药物的作用, 因此去胆固醇树脂和其他药物的给药间隔期应尽量延长
	脂溶性维生素	可影响这些维生素的吸收
双硫醒	醇	双硫醒可干扰醇的降解, 导致乙醛浓度的增加而出现明显的症状
	口服抗凝药	可增强抗凝药的作用
	苯妥英钠	苯妥英钠的作用可因代谢受抑制而增强
	灭滴灵 (Metronidazole, Flagyl)	合并用药可引起急性精神病或精神错乱
	三聚乙醛 (Paraldehyde)	不宜同服

译自 [Remington's: 《Pharmaceutical Science》 14th Ed., 1970, p. 1835~1846]

(王振钱译 戴兰复校)