

庆大霉素滴耳液的耳毒性

在咨询了加拿大卫生部后,加拿大先灵公司已向医务人员发出劝告:鼓膜穿孔的患者局部使用庆大霉素硫酸盐滴耳液有耳毒性的危险。这一劝告的根据是药物上市后的监测报告中,鼓膜穿孔的患者使用庆大霉素滴耳液后,出现罕见的耳毒性(听力

丧失、耳鸣、眩晕、共济失调或振动幻视)。考虑其耳毒性,医务人员应对患者常规监测,并于开始治疗 5~7 天后,重新评估是否有需要继续使用。

(迟丹怡摘译 王大猷校)

葡萄柚汁与药物相互作用的可能性

加拿大卫生部告诫公众食用葡萄柚或其果汁时,不要服用某些药物,因为葡萄柚汁中的一些物质可能会干扰药物的代谢,导致血药浓度增高,发生严重甚至威胁生命的不良反应。受影响的是一些(但不仅仅是)用于治疗如咽峡炎、焦虑、癌症、惊厥、抑郁、勃起障碍、胃肠返流、高血

压、高胆固醇、HIV/AIDS、感染、心律失常、器官移植排异及精神疾病的药物。一小杯葡萄柚汁就能导致血药浓度的升高,而且此效应可持续 3 天以上。加拿大卫生部正与有关药厂合作,确保在药品的说明书中含有相应的信息。

(迟丹怡摘译 王大猷校)

米非司酮致异位妊娠等不良反应

Danco Laboratories 公司与美国 FDA 联合致信医务人员,提供米非司酮(mifepristone, Mifeprex)新的安全信息。信中指出,已经收到几份异位妊娠破裂的报告,其中 1 例出血致死。处方者应注意异位妊娠是使用米非司酮的禁忌证,应警惕米非司酮治疗期间异位妊娠的可能性。此外,有 2

例合用米非司酮与米索前列醇后出现全身严重细菌感染,其中 1 例导致死亡。还有 1 例 21 岁女性患者合用米非司酮与米索前列醇 3 天后,出现心肌梗死的报告。该信指出,上述不良事件与米索前列醇的关联性尚未确定。

(迟丹怡摘译 王大猷校)

MIGLUSTAT 致可疑认知功能障碍而暂停使用

Oxford Glyco Sciences 公司暂时停止了用于治疗 I 型戈谢病的新药 miglustat (OGT918, Vevesca) 在以色列的使用,原因是一位 66 岁的老者使用此药后出现了不明原因的认知功能障碍,这位患者在 miglustat 临床试验期间以及在随后的扩大试验方案中连续使用,直至 2001 年 10 月停药。公司

指出,此患者正在接受调查。目前该药暂停使用。

(迟丹怡摘译 王大猷校)

(以上资料源于 WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 3, 2002)