

质子泵抑制剂药物的不良反应与药物相互作用

钟秋红(江苏省苏州市吴江区中医院第二人民医院 苏州 215221)

摘要 :目的:了解质子泵抑制剂(PPI)不良反应及与其他药物相互作用,掌握配伍禁忌,促进临床合理用药。方法:检索 2010 年 1 月~2012 年 1 月国内外医学期刊公开发表的 PPI 不良反应报道,对不良反应类型进行统计分析,最后对合并用药中与 PPI 具有相互作用药物进行研究分析。结果:PPI 不良反应主要集中在消化系统,其次是神经内分泌系统、过敏反应、感染、视力伤害等。结论:质子泵抑制剂作为胃酸分泌抑制剂在临床应用广泛,但长期应用潜在不良反应。临床应加强对 PPI 不良反应的监测研究,尤其是与合用药间的配伍使用研究,以促进合理用药,减少不良反应。

关键词 :质子泵抑制剂(PPI) 不良反应 药物相互作用

中图分类号 :R96

文献标识码 :B

文章编号 :1672- 8351(2014)05- 0102- 01

质子泵抑制剂(PPI)是治疗诸如消化性溃疡、反流性食管炎等酸相关性疾病的常用药物,近年来在临床上得到广泛应用,疗效被证实。代表性药物有奥美拉唑、泮托拉唑、兰索拉唑等。然而,随着临床广泛和长期使用,PPI 不良反应的报道陆续见诸报端,引起人们关注。对此,本文就 PPI 不良反应及其与药物相互作用进行了回顾性分析,为临床合理应用 PPI 药物提供指导。

1 资料与方法

1.1 一般资料 检索 2010 年 1 月~2012 年 1 月国内外医学期刊公开发表的 PPI 不良反应报道 254 例,其中男性 132 例,女性 122 例,年龄 11~78 岁,平均年龄(58.2±11.7)岁。

1.2 方法 采用我院病历检索管理系统,筛选出质子泵抑制剂类药物文献报道,对其中发生不良反应事件进行归类,分析其中因合用药与质子泵抑制剂发生相互作用而导致不良反应的报道。

1.3 统计学方法 资料采用 SPSS 11.0 软件进行分析,应用 Excel 表格进行统计,χ² 检验。

2 结果

质子泵抑制剂药物种类较多,代表性的有奥美拉唑、兰索拉唑、雷贝拉唑、泮托拉唑等,种类的增多带来药物的大量使用以及不良反应的增多。本组消化系统不良反应 82 例(占 32.3%),神经内分泌系统 53 例(占 20.9%),过敏反应 50 例(占 19.7%),感染 41 例(占 16.1%),其他 28 例(占 11%)。

3 结论

3.1 质子泵抑制剂药物不良反应分析 质子泵抑制剂作为强效抑酸剂广泛应用于酸相关性疾病,消化系统是其不良反应的集中区域。胃酸降低是胃肠道不良反应的主要表现,长期服用 PPI 患者胃酸降低率普遍高于未使用或短期使用 PPI 患者,原因可能是 PPI 作为强酸抑制剂能抬高胃内 pH 值,从而改变胃内环境,当 pH 值超过 3.5 时胃内环境不仅易引起胃肠道病原菌感染,导致腹泻,而且影响胃肠道吸收功能。神经内分泌失调是仅次于神经消化系统的不良反应高发系统部位。神经内

分泌系统不良反应主要体现为神经方面的头痛、头晕、激惹、疲惫等,以及内分泌系统的月经量异常、男性乳房发育等。有跟踪研究发现,奥美拉唑还会导致意识障碍。龙恩武等报道,一名呕吐患者口服雷贝拉唑胶囊 7 日后出现神志恍惚、感觉迟钝、重影、步态蹒跚等神经性反应,经查患者并无颅内疾病和脑血管疾病,停药后明显好转。内分泌失调主要是男性患者乳房发育和女性月经量增多,报道多见于使用奥美拉唑之后出现以上反应,停药后均恢复正常。过敏反应亦是典型的不良反应表现,主要为皮肤过敏,如皮疹、全身瘙痒,严重的还发生过敏性休克。本组资料 50 例有皮肤过敏反应,占统计例数的 19.7%。此外,胃肠道、肺部感染、肌病、视力损害等亦是 PPI 不良反应表现,近年来有增多趋势,临床应加强对以上不良反应的监测。

3.2 质子泵抑制剂与其他药物相互作用分析 PPI 依赖多种 p450 同工酶如 cyp2c19 或 cyp3a4 进行肝脏代谢,因此上述两种同工酶可能与 PPI 发生相互作用,当其影响到治疗窗窄的药物血药浓度时可能就会出现毒副作用。另有报道,奥美拉唑与氯氮平合用会显著抬高氯氮平血药浓度,引起不良反应,临床应加强对合用时血药浓度的监测。David W 等对 35 例严重横纹肌溶解患者病因分析发现,其中 12 例系与他汀类药物合用所致,而他汀类药物是通过 cyp3a4 酶代谢,若合用则会大大增加他汀类血药浓度。另外,关于泮托拉唑与甲氨蝶呤联用导致严重肌痛报道近两年有增多趋势,值得关注。

综上所述,质子泵抑制剂药物总体不良反应率较低,但一些不良反应可能致病,因此临床应加强对使用过程中的监测,掌握联合用药的配伍禁忌,减少不良反应。

参考文献

- [1]杨艳,李耀芳.质子泵抑制剂的不良反应与药物相互作用[J].深圳中西医结合杂志,2009,17(5):324-328.
- [2]龙恩武.雷贝拉唑钠肠溶胶囊致严重精神神经系统不良反应 1 例[J].中国药物警戒,2009,6(9):563-565.

真核翻译起始因子 4E 对宫颈癌细胞增殖迁移的作用研究[△]

王 森 高 敏 庞天云 姚运红 胡新荣*(广东医学院肿瘤研究所 东莞 523808)

摘要 :目的:探讨 eIF4E 对宫颈癌细胞增殖迁移的调控作用。方法:eIF4E 表达质粒转染 C33a 细胞。Real-time PCR 检测 eIF4E mRNA 表达,CCK-8 法、Transwell 实验分别检测细胞增殖以及迁移。结果:eIF4E 质粒转染 C33a 细胞后,eIF4E 的 mRNA 表达水平升高约 52%($P<0.01$),细胞增殖中与 NC 组相比,eIF4E 组细胞增殖在 24h、48h、72h 分别增加了 20.2%、67.7%、54.3%($P<0.05$)。而细胞侵袭数目在 24h、48h、72h 分别增加了 23.7%、35.7%、42.7%($P<0.05$)。结论:eIF4E 能够促进宫颈癌 C33a 的增殖侵袭能力,是宫颈癌防治的潜在靶点。

关键词 :宫颈癌 真核细胞翻译起始因子 4E(eIF4E)

中图分类号 :R737.33

文献标识码 :B

文章编号 :1672- 8351(2014)05- 0102- 02

真核细胞翻译起始因子 4E (eukaryotic translation initiation factor 4E, eIF4E)是新近发现的原癌基因,与肿瘤的发生发展密

切相关。本研究探讨了真核细胞翻译起始因子 4E 对宫颈癌 C33a 细胞增殖迁移的调控作用,为宫颈癌诊断和治疗提供新靶点。