

● 社区特殊人群的营养

痤疮和黄褐斑病人的营养与膳食

在社区各种皮肤疾病是比较常见的健康问题,其中青年人常见的是痤疮,而中老年人常见的是黄褐斑,这讲将介绍与之相关的营养与膳食。

痤疮病人的营养与膳食

痤疮,也称“粉刺”、“青春痘”、“暗疮”,是一种常见的炎症性皮肤病,青春期更常见。

患者宜吃清凉、去热的食物。患者大多有内热、饮食中应多选用清凉、祛热、生津、润燥的食物,如瘦猪肉、兔肉、鸭肉、蘑菇、黑木耳、菠菜、黄瓜、豆腐、豆芽等。

患者宜吃清淡的食物,如绿豆芽、马齿芥、空心菜、白菜、莴苣、茭白、白萝卜、胡萝卜、冬瓜、苦瓜、丝瓜等蔬菜和梨、柿子、檀

子、柚子、苹果、香蕉、枇杷、桑葚、西瓜、菱角等水果。

患者宜吃高蛋白食物。全天供给 100~200 g 蛋白质,高蛋白质膳食有利于保持正常皮肤角化代谢,保持毛囊皮脂腺腺口畅通、减少皮肤脓包的产生。

患者宜吃含锌丰富的食物,如核桃、鱼、花生、瘦猪肉、动物肝、苹果、栗子等。

患者宜吃含维生素 A 丰富的食物。如胡萝卜、豆及其制品,

鸡肝、鸡蛋、牛奶等。维生素 A 不仅能抑制上皮细胞增生和毛囊的过度角化、还可以调节汗腺分泌、减少酸性代谢产物对表皮的侵蚀、有助于皮肤健康,故应常吃。

患者宜吃富含维生素 B₂、维生素 B₆ 的食物,如新鲜蔬菜、水果、动物肝、牛奶、鸡蛋、猪瘦肉等。维生素 B₂、维生素 B₆ 能促进细胞的生物氧化,参与糖类、蛋白质和脂肪的代谢,并有助于粉刺的恢复,故应多食。

黄褐斑病人的营养与膳食

黄褐斑是一种常见的色素沉着性皮肤病,又名肝斑,是发生于面部的黄褐或深褐色斑片。黄褐斑大小不定,形状不规则,边界清楚,基本对称,常分布于额、颧、颈、鼻或口周,无任何自觉症状,但影响美观。

患者宜多吃冬瓜、丝瓜、西红柿、土豆、卷心菜、花菜、鲜枣、山楂、橘子、柠檬、豆制品和动物肝脏等,因这些食物对消除黄褐斑有一定的辅助作用。

患者宜多吃直接或间接合成谷胱甘肽的食物,如西红柿、洋葱、大蒜等宜多食。因这些食物能

抑制酪氨酸酶的活性,阻碍酪氨酸形成多巴琨,不仅可减少黄褐色素的合成和沉积,而且可使沉着的色素减退和消失。含硒丰富的食物有蚕蛹、鸡蛋白、海产品、动物肝脏、葡萄干等。硒是谷胱甘肽过氧化物酶的重要成分,不仅有预防和治疗蝴蝶斑的功能,而且还有抗癌作用,宜多食。

患者宜吃富含维生素 C 的食物。另外,富含维生素 E 的食物,如卷心菜、花菜、海藻、豆类、芝麻等,由于维生素 E 可阻碍过氧化脂质的形成,从而可抑制蝴蝶斑的发展,延缓皮肤的衰老,故宜常食。

● 专家点评

部分危及生命的药物相互作用(五)

▲352100 福建省宁德人民医院 李枝端

甲氧蝶呤 + 复方磺胺甲噁唑

甲氧蝶呤适应证 各型急性白血病,特别是急性淋巴细胞白血病 恶性淋巴瘤,非何杰金淋巴瘤和蕈样肉芽肿,多发性骨髓病;恶性葡萄胎、绒毛膜上皮癌、乳腺癌、卵巢癌、宫颈癌、睾丸癌 头颈部癌、支气管肺癌、各种软组织肉瘤 高剂量用于骨肉瘤,鞘内注射可用于预防和治疗脑膜白血病以及恶性淋巴瘤的神经侵犯。

复方磺胺甲噁唑适应证 近年来由于许多临床常见病原菌对本品常呈现耐药,故治疗细菌感染需参考药敏结果,本品的主要

适应证为敏感菌株所致的下列感染。大肠埃希杆菌、克雷伯菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌、普通变形杆菌和莫根菌属敏感菌株所致的尿路感染,肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致 >2 岁小儿急性中耳炎,肺炎链球菌或流感嗜血杆菌所致的成人慢性支气管炎急性发作,由福氏或宋氏志贺菌敏感菌株所致的肠道感染、志贺菌感染,治疗卡氏肺孢子虫肺炎,本品系首选。卡氏肺孢子虫肺炎的预防,可用已有卡氏肺孢子虫病至少一次发作史的患者,或 HIV 成人

感染者,其 CD4 淋巴细胞计数≤ 200 个/mm³ 或少于总淋巴细胞数的 20%。由产肠毒素大肠埃希杆菌(ETEC)所致旅游者腹泻。

相互作用 甲氧蝶呤与保泰松和磺胺类药物同用后,因与蛋白质结合的竞争,可能会引起本品血清浓度的增高而导致毒性反应的出现。甲氧苄啶不宜与抗肿瘤药、2,4- 二氨基嘧啶类药物同时应用,也不宜在应用其他叶酸拮抗药物治疗的疗程之间应用本品。因为有产生骨髓再生不良或巨幼红细胞贫血的可能。

美托洛尔 + 氟西汀

美托洛尔适应证 用于治疗高血压、心绞痛、心肌梗死、肥厚型心肌病、主动脉夹层、心律失常、甲状腺功能亢进、心脏神经官能症等。近年来尚用于心力衰竭的治疗,此时应在有经验的医师指导下使用。

氟西汀适应证 各种抑郁性

精神障碍、包括轻性或重度抑郁症、双相情感性精神障碍的抑郁症,心因性抑郁及抑郁性神经症。

相互作用 氟西汀可引起美托洛尔的血药浓度升高,毒性增大,故应注意监测,必要时减少美托洛尔的用量。

诺氟沙星 + 茶碱

诺氟沙星适应证 适用于敏感菌所致的尿路感染、淋病、前列腺炎、肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染。

茶碱适应证 适用于支气管哮喘、喘息型支气管炎、阻塞性肺气肿等缓解喘息症状,也可用于心力衰竭时喘息。

相互作用 诺氟沙星与茶碱类合用时可能由于与细胞色素 P₄₅₀ 结合部位的竞争性抑制,导致茶碱类的肝清除明显减少,血消除半衰期延长,血药浓度升高,出现茶碱中毒症状,如恶心、呕吐、抽搐、心悸等,故合用时应测定茶碱类血药浓度和调整剂量。

硝苯地平 + 硫酸镁

硝苯地平适应证 心绞痛,包括变异型心绞痛、不稳定型心绞痛、慢性稳定型心绞痛 高血压(单独或与其他降压药合用)。

硫酸镁注射液适应证 可作为抗惊厥药。常用于妊娠高血压。

降低血压,治疗先兆子痫和子病,也用于治疗早产。

相互作用 镁剂用于早产治疗时,如与本品合用可引起显著的低血压和神经肌肉阻滞。合用时应密切监测血压。

链霉素 + 泮库溴铵

链霉素适应证 本品主要与其他抗结核药联合用于结核分枝杆菌所致各种结核病的初治病例,或其他敏感分枝杆菌感染。

本品可单用于治疗土拉菌病,或与其他抗菌药物联合用于鼠疫、腹股沟肉芽肿、布鲁菌病、鼠咬热等的治疗。

本品亦可与青霉素或氨苄西林联合治疗草绿色链球菌或肠球菌所致的心内膜炎。

泮库溴铵适应证 用于气管插管、术中肌肉松弛维持。

相互作用 链霉素与神经肌肉阻滞剂联合使用,可加重神经肌肉阻滞作用,导致肌肉软弱、呼吸抑制或呼吸麻痹(呼吸暂停)。

咪达唑仑 + 舒芬太尼

咪达唑仑适应证 麻醉前给药,全麻醉诱导和维持,椎管内麻醉及局部麻醉时辅助用药,诊断或治疗性操作(如心血管造影、心律转复、支气管镜检查、消化道内镜检查等)时病人镇静,ICU 病人镇静。

舒芬太尼适应证 用于气管内插管,使用人工呼吸的全身麻

醉作为复合麻醉的镇痛用药,作为全身麻醉大手术的麻醉诱导和维持用药。

相互作用 咪达唑仑与芬太尼或舒芬太尼联合使用,可引起严重呼吸抑制及突发低血压,因而这些药合用时应严密监测血药浓度,并且适当减少剂量。

罗红霉素 + 地高辛

罗红霉素适应证 本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎,敏感菌所致的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作,肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎;沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎;敏感细菌引起的皮肤软组织感染。

地高辛适应证 用于高血压、瓣膜性心脏病、先天性心脏病等急性和慢性心功能不全。尤其适用于伴有快速心室率的心房颤动的心功能不全;对于肺源性心

脏病、心肌严重缺血、活动性心肌炎及心外因素如严重贫血、甲状腺功能低下及维生素 B₁ 缺乏症的心功能不全疗效差;用于控制伴有快速心室率的心房颤动、心房扑动患者的心室率及室上性心动过速。

相互作用 罗红霉素与地高辛同用,可清除肠道中能灭活地高辛的菌群,导致体内地高辛降解减少,使地高辛血药浓度升高而发生毒性反应,两者合用时应监测心电图和血清强心苷水平。