

肝脾未扪及, 未见杵状指。化验: RBC $3.6 \times 10^{12}/L$, Hb 90g/L, WBC $11 \times 10^9/L$, N 0.62, L 0.28, E 0.10。胸透正常。抽取静脉血外观呈蓝褐色, 加入抗凝剂置空气中振摇放置24小时后不变色。以静脉血作分光镜检查, 在波长620nm处有一特异性吸收光带, 加入1% 氰化钾后不变色。临床诊断为: 硫血红蛋白症。每日给维生素C 1g加 50%GS 静注, 紫绀无明显减轻。住院1周, 家属自动要求出院。出院后继续保持通讯联系, 6周后紫绀渐消。

硫血红蛋白 (SHb) 是一种 Hb 与硫相结合之稳定化合物, 其结构至今未明。正常人 Hb 中约有 0~2% SHb 存在, 5g/L 的 SHb 就可产生一定程度紫绀, 但 SHb 即使高至 100g/L 也不一定有明显症状, 生命多不受威胁。SHb 一旦生成, 在 RBC 内即不易破坏, 不能逆转为 Hb。本症无特效疗法, 需待含有 SHb 的 RBC 破坏后, 异常的 Hb 才能消失。本病发病机理未明, 有关文献记载, 某些硫血红蛋白症患者, RBC 内还原型谷胱甘肽浓度常有增高, 至于增高的原因及其与本症的关系未明。

(收稿: 1987.3.27 修回: 1987.6.7

定稿: 1987.12.19 编辑: 王 珏)

安乃近针剂滴鼻 造成注射针头误吞 1 例

合川县人民医院 张圣安

患儿女, 1 $\frac{3}{12}$ 岁。因发热用安乃近液滴鼻, 操作过程中发生注射针头脱落于口腔内造成误吞。当时患儿无异常表现, X线透视见针头已达胃内, 观察18小时后, 针头随大便排出。因此在应用滴鼻剂时, 应将药液装入清洁小眼药瓶中使用, 确保操作安全。

(收稿: 1987.9.20 定稿: 1987.12.19

编辑: 王 珏)

· 简 讯 ·

重庆市肿瘤研究所微机药物相互作用检索系统的特点

本系统根据药物交互的数学关系, 找出了相互

作用的原因、结果、临床用药指导与临床用药监护之间的关系, 其特点是:

1. 本系统通过屏幕以药物相互作用的原因及结果作以回答。

2. 本系统对并用几种药, 可显示 $\frac{n(n-1)}{2}$ 组交互。

3. 本系统通过屏幕向使用者提示, 指导临床用药的 A—禁用或慎用, B—按病情及用药情况灵活处理, C—可合理地安全使用, D—有争议或未明等四种情况。使用者可选择性的要求屏幕仅显示其中任何一种、二种、或三种。此时, 对几种药物的交互就仅显示所选择的情况, 而未选择的则不显示, 交互组少于 $\frac{n(n-1)}{2}$ 。

4. 本系统可在 IBM—PC 及其兼容机上实现汉字的输入、输出工作。在苹果机上用代码或拼音输入、输出。

5. 本系统将200种药物相互作用结果, 200种药物与55种病理、生理状态之间的相关性及3万多个数据和整个系统全部输入一张软盘内, 操作简单方便, 检索快而准确。

(张 媛 董莲芳)

· 读者·作者·编者 ·

《重庆医药》编辑部:

拜读贵刊2年来, 认为贵刊与其他刊物比较, 有以下特色:

1. 在审稿、用稿上, 重稿件质量, 认稿不认人, 不轻率退稿, 退稿不退人, 大力发展作者队伍。除组织撰稿经验交流会, 进行专题辅导, 在刊物增设写作知识专栏外, 在稿件邮费上涨后, 仍坚持退稿, 认真负责地向作者指出退稿原因, 热情帮助作者提高刊用稿件质量和撰稿能力。这将有助于提高来稿质量, 减少刊用稿件回修率和缩短出版周期; 有利于巩固和发展作者队伍, 从众多的来稿中, 以数量求质量, 以质量求生存。

2. 版面设计合理, 文稿逻辑严谨, 文字精炼。从综述文稿上即能明显看出, 贵刊往往能以更精炼的文字, 将所引观点加以表达。积极为作者、读者着想, 让有限的版面发挥出更大的作用。

3. 栏目众多, 内容丰富、新颖, 注重实用。如综述所占版面比例较大, 解决了读者无法订阅大量期刊和熟练阅读外文资料的困难, 更为读者节约

(下转55页)