

管石榴在中东、伊朗和印度民间医学中已广泛应用,但尚需进行更多的研究以证实其效果,同时,消费者要想获得这种保健效果也需要长期食用。(梅 洁)

393 枸橼酸钙较碳酸钙更易吸收

美国得克萨斯大学西南医学中心的三项研究表明枸橼酸钙较碳酸钙更易于吸收,从而能够更好地预防妇女绝经早期骨质疏松的发生。三项研究中有二项研究对两种钙剂的吸收率进行了比较,另一项则对枸橼酸钙防止绝经早期骨质丢失作用与安慰剂进行了比较。由 Khashayar Sakhaee 进行的第 1 项研究对以往发表的 15 个随机化试验进行了分析,结果发现不论空腹时或进餐时服用,枸橼酸钙比碳酸钙吸收率均高出 22%~27%。由 Howard Heller 领导的第 2 项研究则对市售的两种非处方用钙剂 Citracal (枸橼酸钙) 和 Os-Cal (碳酸钙) 的吸收率进行了比较,结果认为前者有较好的生物利用度。持续了 2 年的第 3 项研究追踪观察了 57 例绝经早期和 6 例绝经中期妇女,这些受试者每天服用 800mg 枸橼酸钙或安慰剂。结果服用钙剂者脊柱、前臂及股骨头骨密度稳定,防止了骨质丢失,而服用安慰剂者脊柱、前臂有明显的骨密度下降,但股骨头骨密度没有显著下降。(梅 洁)

394 CVS 药品连锁店推出药品相互作用保护计划

CVS 公司最近宣布将开展一项新的服务,即为消费者提供关于处方药和非处方保健产品共同使用时可能出现的相互作用

的信息。在 CVS 每个药店及公司的网页上通过使用计算机数据库,药剂师及消费者可以了解某一处方药与草药、食品补充剂或非处方药结合使用是否会产生不良作用。药店还为消费者提供有关草药、维生素、矿物质和营养剂的专题文章。每个顾客可填写一张问卷,说明他们正在服用何种补充剂,有关信息将贮存在该顾客在 CVS 系统的个人文件中。一旦该顾客购买处方药,计算机将产生一份关于该处方与补充剂共用可能产生的相互作用的详细报告。研究发现约有半数的美国人服用营养性补充剂而不告知其医生, CVS 此举将架起信息沟通的桥梁,从而避免处方药与非处方药及补充剂共用而可能产生的危险的相互作用。(李春梅)

395 饮酒少于 100ml 使脑卒中与心脏疾患的危险率降低

在日本第 20 次酒精医学生物学会研究会学术讨论会上,日本筑波大学社会医学系的矶博康(研究脑卒中与饮酒的关系等)就饮酒与发病的危险性进行了演讲。在对居住在农村的 40~69 岁的 2985 名男性以及在大城市企业工作的 40~59 岁的 8000 名男性进行调查时发现,每日饮日本酒 300ml 以上者脑卒中的发病率为不饮酒者的 2 倍,但少量饮酒脑卒中及缺血性心脏病的发病率降低。根据调查结果矶博康认为,为了安全,每日饮酒少于 100ml 更为适宜。(怡 悦)

396 成年后吸烟及幼年时被动吸烟与急性阑尾炎的关系

据《The Lancet》杂志报道,在一项名