



电子报告查询



广东省检迅检测科技有限公司 功效测试报告

报告编号	2462808
评价项目	紧致、除皱功效
样品名称	重组三型胶原蛋白
送检单位	美尔健（深圳）生物科技有限公司
检测类型	委托测试

2024年10月29日



声明

- 一、本报告仅对送检样品负责。
- 二、本报告涂改增删无效，未加盖本公司“检验检测专用章”无效，复印件无效（完整复印除外）。
- 三、本报告有异议，可在收到报告之日起 10 日内提出，逾期不予受理。
- 四、本报告及我单位名称不得用于非法活动，不得私自涂改，变造报告形式及内容。
- 五、本报告相关数据由分包方提供。
- 六、未加盖 CMA 标识的报告，仅用作科研、教学、内部质量控制等用途。

广东省检迅检测科技有限公司

联系地址：东莞市长安镇长盛社区振安东路 249 号 906-912 室

邮政编码：523841

联系电话：0769-85330800

广东省检迅检测科技有限公司
测试报告

报告编号: 2462805

第 1 页 / 共 4 页

样品名称	重组三型胶原蛋白	样品数量及规格	9 瓶, 10g/瓶
进口产品外文名称	/	生产日期或批号	/
颜色和物态	无色透明液体	保质期或限期使用日期	2 年
受理日期	2024-10-24	检验完成日期	2024-10-29
检验项目	紧致、抗皱功效评估		
检验依据	JYT-SOP-JC-02《化妆品抗皱、抗衰、抗氧化和紧致功效验证检测细则》		
送检单位	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
生产企业	美尔健(深圳)生物科技有限公司		
地址	深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区金业大道 140 号生命科学产业园 A23 栋 201		
境内责任人	/		
地址	/		

【试验结论】

按照 JYT-SOP-JC-02《化妆品抗皱、抗衰、抗氧化和紧致功效验证检测细则》的测试方法,对重组三型胶原蛋白的紧致、抗皱功效进行实验室方法测试,测试结果表明:测试样品的弹性蛋白酶抑制率为 64.32%,说明测试样品组的酶含量显著性低于阴性对照,经 SPSS 软件分析,采取双尾检验,显著性因子 $P < 0.05$,说明样品“重组三型胶原蛋白”具有紧致、抗皱功效。

编制:

周方梅

审核:

覃东霞

批准:

郭海

日期: 2024 年 10 月 29 日



广东省检迅检测科技有限公司

测试报告

报告编号: 2462805

第 2 页 / 共 4 页

【测试报告】

一、实验原理和依据

弹性蛋白酶作为具有极高选择性和专一性的蛋白分解酶,对许多氨基酸如甘氨酸、亮氨酸、丙氨酸、缬氨酸等含羧基的多肽键具有催化水解的作用,可以使结缔组织蛋白质中的弹性蛋白分解。在构成真皮的蛋白质组织纤维中,弹性蛋白具有维持皮肤张力的作用,决定着皮肤弹性。紫外线等外界刺激可促进真皮细胞中弹性蛋白酶增多,导致皮肤中弹性蛋白分解流失,造成皮肤松弛现象。具有抑制弹性蛋白酶活性的物质能够有效减慢弹性蛋白的降解速度,从而帮助维持皮肤弹性,达到紧致、抗皱的效果。

本试验按照JYT-SOP-JC-02《化妆品抗皱、抗衰、抗氧化和紧致功效验证检测细则》的检测方法对样品的弹性蛋白酶的抑制率进行测定,通过与阴性对照进行比对,来判定样品是否具有紧致、抗皱效果。

二、实验步骤

- 2.1 准确称取样品,将样品稀释成 1%水溶液进行检测;
- 2.2 预处理后的样品与弹性蛋白酶溶液反应,同时设阴性对照与空白对照;
- 2.3 按检测试剂盒操作,测 OD 值;
- 2.4 根据标准曲线得出弹性蛋白酶的含量;
- 2.5 计算弹性蛋白酶抑制率。

三、实验指标与抗皱、紧致功效的相关性

$$\text{抑制率}(\%) = \left(1 - \frac{T}{C}\right) \times 100$$

T-样品溶液的弹性蛋白酶含量

C-阴性对照弹性蛋白酶含量

本试验结果表征为样品对弹性蛋白酶的抑制率,如果测试样品组与阴性对照相比有抑制作用,且测试样品与阴性对照相比具有显著性差异,均说明受试产品具有抗皱、紧致效果。

显著性差异经 SPSS 软件统计分析,当显著性因子 $P < 0.05$ 认为具有显著差异。

广东省检迅检测科技有限公司
测试报告

报告编号：2462805第 3 页 / 共 4 页

四、实验结果及统计分析

对试验样品和阴性对照进行双平行实验，并对分析结果进行显著性差异的分析，统计分析结果如下：

抑制率显著性分析表

名称	弹性蛋白酶含量 (ng/ml)	抑制率 (%)	P 值
空白/溶剂对照	15.00 ± 0.25		/
阴性对照	396.62 ± 4.90		/
重组三型胶原蛋白	141.53 ± 4.02	64.32	<0.05

五、酶抑制率对比图



广东省检迅检测科技有限公司

测试报告

报告编号: 2462805

第 4 页 / 共 4 页

六、实验结论

按照 JYT-SOP-JC-02 《化妆品抗皱、抗衰、抗氧化和紧致功效验证检测细则》的测试方法,对重组三型胶原蛋白的紧致、抗皱功效进行实验室方法测试,测试结果表明:测试样品的弹性蛋白酶抑制率为 64.32%,说明测试样品组的酶含量显著性低于阴性对照,经 SPSS 软件分析,采取双尾检验,显著性因子 $P < 0.05$,说明样品“重组三型胶原蛋白”具有紧致、抗皱功效。

七、参考文献

- [1] 刘洋, 邓影妹, 赵华. 化妆品抗皱功效评价方法[J]. 日用化学科学. 2015,38 (04)
- [2] Ji-Young Moon, Eun-Young Yim, Gwanpil Song. Screening of elastase and tyrosinase inhibitory activity from Jeju Island plants [J]. Eurasian Journal of BioSciences, 2010, 4: 41-53.
- [3] Tagon Kim, Hee Jin Kim, Sung Ki Cho. Nelumbo nucifera extracts as whitening and anti-wrinkle cosmetic agent [J]. Korean Journal of Chemical Engineering, 2011, 28(1): 424-427.
- [4] 龚盛昭, 何远伦 芦丁在抗衰老化妆品中的应用研究<期刊>·工程科技 I 辑·一般化学工业

-----报告结束-----



美尔健生物
MELLEN BIOTECH

WEB: <http://WWW.mellgen.com>

ADD: 深圳市大鹏新区深圳国际生物谷生命科学产业园A23栋